

Chapitre 3.

Les solutions

3.1. Introduction

L'eau n'est pas un simple liquide; elle est la source de la vie et le théâtre de la chimie.⁽³⁰⁾ Imaginez un instant la complexité et la beauté des processus qui nous maintiennent en vie : le sang qui circule dans nos veines, transportant l'oxygène et les nutriments; les influx nerveux qui parcourent notre cerveau à une vitesse vertigineuse; l'absorption des médicaments qui nous guérissent; ou encore la synthèse de l'ADN qui encode notre existence. Tous ces phénomènes, sans exception, ont un point commun fondamental : ils se déroulent en solution aqueuse.

La chimie des solutions est bien plus qu'une simple discipline académique. Elle est le langage universel qui nous permet de décrire, de prédire et de comprendre les interactions moléculaires à l'œuvre dans le monde qui nous entoure et au sein même de notre organisme. Maîtriser ce langage, c'est acquérir les clés pour comprendre le fonctionnement intime de la matière vivante.

Ce manuel a été conçu spécifiquement pour vous, futurs professionnels de la santé et scientifiques. Son objectif est double :

Vous fournir une base théorique solide et intuitive sur le comportement des espèces chimiques en solution, en dépassant le simple cadre mathématique pour privilégier la compréhension conceptuelle.

Vous montrer le lien direct et constant entre ces concepts abstraits et vos futures pratiques, que vous soyez amenés à interpréter une gazométrie sanguine, à formuler un médicament stable, à comprendre le mode d'action d'un antiseptique ou à analyser la qualité d'une eau.

Au cœur de cet ouvrage se trouvent deux piliers fondamentaux : l'équilibre acidobasique et l'oxydoréduction.

Nous avons structuré ce livre autour des deux types de réactions en solution les plus critiques pour vos domaines d'études :

- Les équilibres acido-basiques : Ils gouvernent le **pH**, une grandeur dont la régulation est si cruciale que notre organisme y consacre des systèmes tampons entier. Un déséquilibre de quelques dixièmes d'unité **pH** peut être le signe d'une acidose ou d'une alcalose potentiellement fatale. Vous découvrirez comment prévoir le **pH** d'une solution, concevoir un tampon pharmacologique ou interpréter un diagramme de prédominance pour prédire la forme sous laquelle se trouve une molécule (et donc sa capacité à traverser une membrane cellulaire).
- Les équilibres d'oxydo-réduction (redox) : Ils sont la manifestation d'échanges d'électrons, c'est-à-dire de transferts d'énergie. La respiration cellulaire, le stress oxydatif, l'action de désinfectants comme l'eau de Javel ou le permanganate, le fonctionnement des piles dans nos appareils médicaux : tout ceci relève des réactions redox. Vous apprendrez à équilibrer ces réactions, à calculer leur potentiel et à comprendre leur spontanéité.

Préparez-vous à un voyage au cœur de la matière, de l'échelle macroscopique que nous observons à l'échelle microscopique où tout se joue. Tournez la page et plongez dans l'univers fascinant de la chimie des solutions : une science essentielle, vivante, et au centre de votre future pratique.

L'Urgence Clinique des Équilibres en Solution

Pour vous, futurs cliniciens, la maîtrise de la chimie des solutions n'est pas un exercice académique abstrait : c'est une condition indispensable pour comprendre le langage du corps humain et l'action des outils thérapeutiques.

Les concepts que vous allez acquérir dans cet ouvrage sont les fondements immédiats de votre pratique quotidienne future :

L'équilibre acido-basique est la pierre angulaire de l'homéostasie (la capacité du corps à maintenir un environnement interne stable et constant). Le **pH** sanguin est rigide et maintenu autour de 7,4. Une variation de seulement 0,3 unité peut induire un coma acidotique (sang trop acide) ou alcalotique (trop basique), engageant le pronostic vital. Vous apprendrez à interpréter une gazométrie artérielle (une mesure précise de l'équilibre acide-base du sang et l'efficacité de la respiration) non pas comme un chiffre, mais comme le reflet de processus physiologiques complexes faisant intervenir les tampons bicarbonate et l'hémoglobine.

L'action des médicaments dépend de leur forme ionisée. L'aspirine (acide acétylsalicylique) est absorbée dans l'estomac précisément parce que le **pH** acide la maintient sous sa forme neutre, liposoluble, lui permettant de traverser les membranes cellulaires. À l'inverse, l'oméprazole (un inhibiteur de la pompe à protons) est une base faible activée dans l'environnement acide des canalicules pariétaux de l'estomac. Prescrire sans comprendre le **pKa**, c'est ignorer la pharmacocinétique fondamentale.

La désinfection et l'asepsie reposent sur la chimie redox. L'eau de Javel (ions hypochlorite, ClO^-), le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) ou le permanganate de potassium (KMnO_4) sont de puissants agents oxydants qui détruisent les parois cellulaires des pathogènes et dénaturent leurs protéines par transfert d'électrons. Choisir un antiseptique, c'est choisir une réaction redox.

L'énergie cellulaire est une réaction redox géante. La respiration mitochondriale n'est rien d'autre qu'un transfert d'électrons du glucose (réducteur) au dioxygène (oxydant) via la chaîne respiratoire. Le potentiel redox standard (E°) de

chaque complexe mitochondrial détermine le flux énergétique de la cellule. L'**ATP** est la monnaie énergétique de la vie, et elle est frappée dans l'atelier des réactions d'oxydoréduction.

Cet ouvrage a donc pour ambition de faire le pont entre l'équation chimique et le chevet du patient, entre la constante d'équilibre et l'ordonnance, entre le potentiel standard et le diagnostic. feuillotez les pages pour acquérir les outils qui feront de vous des professionnels non pas simplement utilisateurs de protocoles, mais véritables comprendeurs des mécanismes du vivant.

3.2. La Solution Aqueuse (Le Milieu de la Vie)

Le corps humain est un monde aquatique. Le plasma sanguin, la lymphe, le liquide cérébro-spinal, le cytoplasme de nos cellules... tous sont des solutions aqueuses complexes où les réactions essentielles à la vie prennent place. Pour le futur clinicien, le pharmacien ou le biologiste, maîtriser la composition de ce milieu n'est pas une abstraction chimique, mais une nécessité pour comprendre l'équilibre physiologique (homéostasie), interpréter une analyse sanguine, ou calculer la posologie d'un médicament. Ce chapitre est le premier pas dans cette maîtrise.

3.2.1. Concentrations (Du Diagnostic au Remède)

Objectif de la section : Savoir traduire la quantité d'une substance en solution dans le langage universel de la chimie et de la biologie. Comprendre pourquoi le pharmacien et le biologiste utilisent des unités différentes de celles du chimiste, et surtout, savoir passer de l'une à l'autre.

3.2.1.1. La Concentration Massique (C_m)

C'est la grandeur la plus intuitive et la plus répandue en biologie clinique (c'est l'unité du Biologiste et du Clinicien), Lorsque vous lisez une analyse sanguine (ionogramme, glycémie, cholestérolémie), les résultats sont presque toujours donnés en masse par volume **g/L**, **mg/dL**, **mg/L**, **μg/mL**.

Définition

La concentration massique est une grandeur qui mesure la masse d'une substance dissoute (le soluté) présente dans un volume unitaire de solution finale.⁽⁶⁾

En termes simples, elle répond à la question : "Combien de grammes (ou de **mg**, **μg**, etc.) de produit actif ai-je par litre (ou **mL**, etc.) de la solution que je tiens dans mon bécher ou ma seringue ?"

C'est une notion extrêmement courante en biologie, pharmacologie, et donc en médecine dentaire, car elle permet de doser précisément des principes actifs, des protéines, des ions, ou tout autre analyte dans un liquide.

Formule :

$$C_m = \frac{m}{V}$$

- C_m : Concentration massique en grammes par litre (**g/L**)
- m : Masse de soluté en grammes (**g**)
- V : Volume de la solution en litres (**L**)

3.2.1.2. La Concentration Molaire ou Molarité (C)

Plus pertinente chimiquement⁽³⁰⁾ :

Définition

La concentration molaire, souvent notée C est la quantité de matière d'une substance (le soluté) dissoute dans un litre de solution. (Imaginez que vous comptez le nombre de molécules que vous avez dans chaque litre de votre liquide.)

Pour les Futurs Médecins, Dentistes et Pharmaciens, Pensez à une perfusion ou à un sirop médicamenté. Le solvant (le liquide de base), c'est comme la solution saline (sérum physiologique) de la perfusion. C'est le liquide qui va dissoudre le produit. Le soluté (la substance active), c'est le médicament que vous ajoutez à la perfusion (par exemple, un antibiotique ou un antalgique comme le paracétamol). La concentration molaire (C), c'est le dosage de ce médicament. Elle vous dit combien de molécules de votre principe actif sont présentes par litre de perfusion ou de sirop. Pourquoi c'est crucial ? Parce que l'effet d'un médicament dépend directement du nombre de ses molécules qui atteignent leur cible. Trop peu, il est inefficace. Trop, il devient toxique. La molarité est un outil de précision pour doser.

Formule :

$$C = \frac{n}{V}$$

- C : Concentration en mole par litre (**mol/L**)
- n : Quantité de matière de soluté en mole (**mol**)
- V : Volume de la solution en litres (**L**) ,Attention ! C'est le volume total du mélange (solvant + soluté), pas seulement le volume de solvant utilisé.

3.2.1.3. La Molalité (m ou b)

Définition

C'est la quantité de matière de soluté dissoute dans un kilogramme de solvant. (Imaginez que vous comptez le nombre de paquets de molécules que vous ajoutez à chaque kilogramme du liquide pur (solvant) que vous utilisez.)

il y a une certaine analogie avec la molarité, pour cette dernière on se préoccupe du volume final de la perfusion (solvant + médicament), par contre pour la molalité on se préoccupe uniquement de la masse du solvant (la solution saline) avant d'y ajouter le médicament. Pourquoi cette différence ? La masse ne change pas avec la température, contrairement au volume (qui se dilate ou se contracte). La molalité est donc utilisée pour les mesures très précises où la température peut varier (comme en cryoscopie ou ébullioscopie).

Formule :

$$b = \frac{n}{m}$$

- b : Molalité avec l'unité unité de mole par kilogramme (**mol/kg**)
- n : Quantité de matière de soluté en mole (**mol**)
- m : Masse du solvant seul (**kg**) . Attention ! Ce n'est pas la masse de la solution finale.

3.2.1.4. Normalité (N)

Définition

La normalité est le nombre d'équivalents grammes de soluté par litre de solution. (Imaginez que vous ne comptez pas les "paquets de molécules", mais les "paquets de réactivité" d'une molécule, c'est-à-dire sa capacité à participer à une réaction acide-base ou d'oxydo-réduction.)

L'Analogie Médicale (Le Pouvoir Réactif) Pensez à un antiacide. Son efficacité ne dépend pas seulement du nombre de molécules, mais de sa capacité à neutraliser l'acide. Une molécule qui peut neutraliser 2 ions (H^+) (comme le $(\text{Mg}(\text{OH})_2)$) est 2 fois plus "puissante" qu'une molécule qui n'en neutralise qu'un (comme le (NaOH)) pour le même nombre de moles. La normalité prend en compte ce pouvoir réactif. Une solution d'antiacide à 1 **N** aura le même pouvoir neutralisant, qu'elle soit à base de (NaOH) ou de $(\text{Mg}(\text{OH})_2)$.

Formule :

$$N = \frac{n_e}{V} = C \cdot f$$

- N : Normalité (son unité est l'équivalent gramme par litre (**éq/L** ou **N**))
- n_e : Nombre d'équivalents de soluté
- V : Volume de solution (**L**)
- C : Concentration molaire (**mol/L**)
- f : Facteur d'équivalence. C'est lui qui traduit le "pouvoir réactif".

Pour un acide ou une base : f est le nombre de H^+ donnés (acide) ou acceptés (base). par exemple (HCl) (acide qui donne 1 (H^+)) donc $f = 1$, et $f = 2$ pour un diacide comme H_2SO_4 , Pour un oxydant/réducteur f égal aux nombre d'électrons échangés.

3.2.1.5. Fraction Molaire (X_i ou Y_i)

Définition

La fraction molaire est une grandeur intensive et sans unité qui représente la proportion d'un constituant i dans un mélange par rapport au nombre total de moles de l'ensemble des constituants. On la note X_i pour les phases liquide ou solide et Y_i pour la phase gazeuse.

L'Analogie Culinaire (La Recette) Imaginons que vous prépariez un mélange de noix. La fraction molaire d'un type de noix (ex : les noix de cajou) correspond au **pourcentage en nombre** de noix de cajou par rapport au nombre total de noix dans le mélange. Peu importe que vous fassiez un petit ou un gros bol, ce pourcentage reste le même. C'est une mesure de la **composition intrinsèque** du mélange.

Définition Mathématique : La fraction molaire du constituant i est définie par la relation :

$$X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} = \frac{n_i}{\sum_{j=1}^N n_j}$$

où :

- X_i : Fraction molaire du constituant i (sans unité).
- n_i : Quantité de matière du constituant i (mol).
- n_{total} : Quantité de matière totale du mélange (mol).
- N : est le nombre total de constituants différents dans le mélange.

Propriétés Fondamentales : La fraction molaire possède deux propriétés essentielles :

1. **Comprise entre 0 et 1** : Pour tout constituant, $0 \leq X_i \leq 1$.
 - $X_i = 0$: Le constituant i est absent du mélange.
 - $X_i = 1$: Le mélange est un corps pur, constitué uniquement de i .
2. **Somme égale à 1** : La somme des fractions molaires de tous les constituants d'un mélange est toujours égale à l'unité.

$$\sum_{i=1}^N X_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_N = 1$$

Cette propriété est très utile pour vérifier des calculs ou trouver une fraction molaire inconnue.

Exemple d'Application : Un mélange gazeux est préparé en mélangeant :

- 3.0 mol de diazote (N_2)
- 1.0 mol de dioxygène (O_2)
- 0.5 mol d'argon (Ar)

La quantité de matière totale est :

$$n_{\text{total}} = n_{N_2} + n_{O_2} + n_{Ar} = 3.0 + 1.0 + 0.5 = 4.5 \text{ mol}$$

Les fractions molaires de chaque gaz sont donc :

$$\begin{cases} X_{N_2} = \frac{3.0}{4.5} \approx 0.667 \\ X_{O_2} = \frac{1.0}{4.5} \approx 0.222 \\ X_{Ar} = \frac{0.5}{4.5} \approx 0.111 \end{cases}$$

On vérifie la propriété fondamentale :

$$X_{N_2} + X_{O_2} + X_{Ar} \approx 0.667 + 0.222 + 0.111 = 1.000$$

Utilité : La fraction molaire est cruciale pour décrire les mélanges gazeux (Loi de Dalton), la composition des phases en équilibre et est souvent utilisée en thermodynamique car elle est indépendante de la température et de la pression.

3.2.1.6. Les unités des concentrations infimes

Les **ppm** (parties par million) et **ppb** (parties par milliard) sont des unités de mesure utilisées pour exprimer des concentrations extrêmement faibles, là où les unités classiques comme la molarité deviennent imprécises. Elles représentent respectivement une partie de soluté pour un million de parties de solution et une partie de soluté pour un milliard de parties de solution. Ce sont des concentrations en parties par notation (sans dimension), Elles expriment un rapport de proportion plutôt qu'une quantité absolue, Particulièrement utiles pour mesurer des traces (substances présentes en quantités infinitésimales mais biologiquement actives) Leur importance en santé, on trouve les **ppm** pour les minéraux, électrolytes et les polluants courants, et les **ppb** pour les hormones, médicaments, toxines et les marqueurs biologiques, Ces unités sont essentielles pour comprendre les seuils toxicologiques, les dosages pharmacologiques et les normes environnementales en médecine et pharmacie.

3.3. L'Eau, Le Solvant de la Vie


Bienvenue dans l'exploration du solvant le plus extraordinaire de l'univers : l'eau. Si la chimie des solutions est la langue universelle des processus biologiques, l'eau en est l'alphabet. Pour vous, futurs médecins, pharmaciens et dentistes, comprendre l'eau n'est pas une option, c'est une nécessité. Elle constitue 60 à 70 % du corps humain, est le milieu de toutes les réactions métaboliques, le vecteur des médicaments, et le composant majeur de la salive et du plasma sanguin. Cette section décortiquera les propriétés uniques de l'eau qui en font le solvant indispensable à la vie et à la pratique biomédicale.

3.3.1. Structure Moléculaire et Liaison Hydrogène : Les Fondements


Toutes les propriétés exceptionnelles de l'eau découlent de sa structure moléculaire simple mais géniale.

3.3.1.1. Structure polaire de la molécule d'eau

La molécule d'eau (H_2O) présente une géométrie coudée avec un angle de liaison de $104,5^\circ$. Formée d'un atome d'oxygène fortement électronégatif (3,44) lié à deux atomes d'hydrogène moins électronégatifs (2,20), cette différence d'électronégativité crée une asymétrie électronique responsable de son caractère polaire. Il en résulte un **dipôle permanent** : la région de l'oxygène porte une charge partielle négative (δ^-), tandis que les hydrogènes portent une charge partielle positive (δ^+).



AX₂E₂



Forme Coudée


Définition

Un **dipôle électrique** est une molécule qui présente une séparation de charges électriques avec un pôle positif et un pôle négatif. Le **moment dipolaire** de l'eau est de 1,85 D, ce qui est élevé comparé à d'autres solvants.

3.3.1.2. Conséquences de la polarité : solubilité et interactions

La polarité confère à l'eau des propriétés solvatantes exceptionnelles :

- **Solvant des composés ioniques** : Les molécules d'eau s'orientent autour des ions grâce aux interactions **ion-dipôle**.




- **Solvant des composés polaires** : Formation de **ponts hydrogène** (pont : type spécifique de liaison hydrogène qui relie deux groupements différents) avec les alcools, cétones, acides, etc.
- **Non-solvant des composés apolaires** : Effet **hydrophobe** qui drive l'assemblage des membranes biologiques.

Exemple


Le chlorure de sodium (NaCl) se dissout dans l'eau car l'énergie libérée par l'hydratation des ions (Na⁺ et Cl⁻) compense l'énergie nécessaire à la destruction du réseau cristallin.

3.3.1.3. La Liaison Hydrogène : Le Lien de Vie

Cette polarité permet à une molécule d'eau de former une attraction électrostatique entre l'hydrogène δ⁺ d'une molécule et l'oxygène δ⁻ d'une molécule voisine. C'est la **liaison hydrogène**. Bien que beaucoup plus faible qu'une liaison covalente, la capacité de chaque molécule d'eau à former jusqu'à quatre liaisons hydrogène crée un réseau dynamique et extrêmement cohésif (force cohésive : La force d'attraction mutuelle qui existe entre les molécules d'eau elles-mêmes).



Liaison Covalente



Liaison Hydrogène

Important

Analogie pour les Biomédicaux : Imaginez les liaisons hydrogène comme une poignée de main temporaire mais incessante entre des milliards de molécules. C'est cette "poignée de main" qui donne à l'eau sa cohésion et explique pourquoi il faut autant d'énergie pour la chauffer (la fièvre est un combat contre ces liaisons) ou pour l'évaporer (la transpiration refroidit le corps en brisant ces liaisons).

3.3.2. Propriétés Physico-chimiques Clés et Leurs implications Biomédicales

Les liaisons hydrogène confèrent à l'eau un ensemble de propriétés uniques.

- Propriété 1 : Capacité Thermique Massique Élevée** : L'eau absorbe une grande quantité de chaleur sans que sa température n'augmente fortement. C'est un **tampon thermique**.
Implication : Cela permet au corps humain de maintenir une température constante (environ 37 °C) malgré les variations de l'environnement et la production de chaleur métabolique.
- Propriété 2 : Chaleur Latente de Vaporisation Élevée** : Beaucoup d'énergie est nécessaire pour évaporer l'eau (briser toutes les liaisons H).
Implication : Le mécanisme principal de refroidissement du corps est la transpiration. L'évaporation de la sueur à la surface de la peau consomme une quantité massive de chaleur corporelle.
- Propriété 3 : Tension Superficielle Élevée** : La cohésion entre les molécules d'eau à la surface crée une "peau" résistante.
Implication : Ce phénomène est crucial pour le phénomène de **capillarité**, permettant la montée de la sève dans les plantes et, surtout, la **remontée du plasma sanguin** dans les micro-vaisseaux (capillaires) les plus étroits du corps.
- Propriété 4 : Densité Anormale** : L'eau est l'un des seuls composés où le solide (glace) est moins dense que le liquide. La glace flotte.
Implication : Cette propriété isolante de la glace permet la vie dans les milieux aquatiques sous les climats froids.

3.3.3. L'Eau en Tant que Solvant

L'eau est un solvant remarquablement efficace, ce qui lui vaut le surnom de "solvant universel". Sa polarité est la clé.

Dissolution des Composés Ioniques (ex : NaCl - Sel de table)

- Les molécules d'eau polaires s'orientent autour des ions.
- Les oxygènes δ^- s'approchent des ions Na^+ .
- Les hydrogènes δ^+ s'approchent des ions Cl^- .
- L'**hydratation** des ions (la formation de cette "sphère" d'eau autour d'eux) affaiblit la force attractive du réseau cristallin et les ions se dispersent. Le sel est dissous.

Dissolution des Composés Polaires (ex : Glucose, Urée)

Les molécules d'eau forment des liaisons hydrogène avec les groupes polaires de ces molécules (groupes $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $\text{C}=\text{O}$), les entourant et les séparant les unes des autres.

Dissolution des Gaz (ex : O_2 , CO_2)

Les gaz sont faiblement solubles dans l'eau. Leur solubilité dépend de la **pression partielle** (Loi de Henry). C'est fondamental pour :

- **La Respiration** : L'oxygène (O_2) se dissout dans le plasma sanguin au niveau des alvéoles pulmonaires.
- **L'Équilibre Acido-Basique** : Le dioxyde de carbone (CO_2) se dissout et réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique (H_2CO_3), un tampon essentiel du sang.


Exemple

Centre d'intérêt en Pharmacie : La Solubilité des Principes Actifs

La capacité d'un médicament à se dissoudre dans l'eau (hydrophilie) ou dans les lipides (lipophilie) est cruciale pour sa **biodisponibilité**. Elle détermine son absorption par le tube digestif, sa distribution dans le sang (milieu aqueux) et son passage à travers les membranes cellulaires (lipophiles). La conception de molécules pharmacologiques vise souvent à trouver un équilibre optimal entre ces deux propriétés.

3.3.4. L'Autoprotolyse de l'eau et le pH : "L'importance du milieu"

L'eau pure est bien plus qu'un simple liquide inerte; elle participe activement à son propre équilibre chimique. Deux molécules d'eau peuvent échanger un proton (H^+).



Cette réaction est à l'origine des ions **hydronium** (H_3O^+) et **hydroxyde** (OH^-). Le produit ionique de l'eau (K_e) à 25 °C, $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$. C'est une constante fondamentale. Dans l'eau pure, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ M}$. Le milieu est **neutre**.

3.3.4.1. Notion de pH et échelle acido-basique

Le **pH** est défini comme le cologarithme décimal de la concentration en ions H_3O^+ :^{(31),(32)}

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$$

- Solution neutre : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$ donc $\text{pH} = 7,0$
- Solution acide : $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ donc $\text{pH} < 7,0$
- Solution basique : $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$ donc $\text{pH} > 7,0$

Important

Focus Médecine/Dentaire : L'Homéostasie du pH

Le sang humain maintient un pH incroyablement stable entre **7,35 et 7,45**.⁽³²⁾ Une déviation en dehors de cette fourchette étroite, appelée **acidose** ($\text{pH} < 7,35$) ou **alcalose** ($\text{pH} > 7,45$), peut dénaturer les protéines, perturber les fonctions enzymatiques et être fatale. La salive possède également un système tampon pour neutraliser les acides produits par les bactéries et prévenir la **déminéralisation de l'émail dentaire** (caries).

3.3.5. Pourquoi l'eau est-elle le solvant universel de la biologie ?

L'eau dans le corps n'est pas de l'eau pure. C'est une solution complexe d'électrolytes (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^- , HCO_3^-), de nutriments, de gaz et de macromolécules.

Osmolarité et Pression Osmotique

Le mouvement de l'eau à travers une membrane semi-perméable (comme une membrane cellulaire) depuis un milieu dilué vers un milieu concentré est l'**osmose**. La force qui drive ce mouvement est la **pression osmotique**.

Implication Critique : L'administration de solutions intraveineuses doit être **isotonique** (même osmolarité que le plasma, ex : sérum physiologique à 0,9 % NaCl) pour éviter que les globules rouges n'éclatent (**hémolyse**) dans un milieu hypotonique ou ne se ratatinent (**crénation**) dans un milieu hypertonique.

Plusieurs propriétés cruciales expliquent ce statut unique :

Important

- **Capacité solvatante exceptionnelle** : Dissout la majorité des biomolécules (ions, sucres, acides aminés).
- **Stabilité thermique** : Température d'ébullition élevée grâce aux ponts hydrogène.
- **Capacité calorifique élevée** : 4,18 J/(g · K) permet la régulation thermique.
- **Tension superficielle élevée** : Essentielle pour la circulation sanguine et la structure cellulaire.
- **Transparence** : Permet la photosynthèse et la vision.
- **Densité anormale** : La glace flotte, préservant la vie aquatique.

Tableau 3.1 Propriétés physico-chimiques remarquables de l'eau.

Propriété	Valeur à 25 °C
Moment dipolaire (μ)	1,85 D
Constante diélectrique (ϵ_r)	78,5
Produit ionique (K_e)	10^{-14}
pH de l'eau pure	7,0
Capacité calorifique massique	4,18 J/(g · K)

3.3.6. Implications biologiques

La polarité de l'eau influence directement la structure et la fonction des biomolécules :

- **Repliement des protéines** : Les parties hydrophobes se regroupent à l'intérieur.
- **Formation des membranes** : Double couche lipidique avec tête polaire vers l'eau.
- **Transport actif** : Gradient ionique à travers les membranes.
- **Reconnaissance moléculaire** : Interactions spécifiques médiées par l'eau.

Pour vous, futurs cliniciens et pharmaciens, comprendre l'eau n'est pas une option académique : c'est maîtriser le milieu dans lequel se déroulent tous les processus que vous étudierez et traiterez. Le sang qui circule dans les veines, les influx nerveux qui parcourent le système nerveux, l'absorption des médicaments que vous prescrirez, la réplication de l'ADN que vous analyserez tous ces phénomènes ont pour théâtre commun l'eau.

Implications cliniques directes

Définition

L'**homéostasie hydrique** est l'équilibre dynamique des entrées et sorties d'eau dans l'organisme. Sa perturbation peut entraîner des états pathologiques graves : déshydratation, œdèmes, ou déséquilibres électrolytiques.

Exemple

L'administration de solutés physiologiques (0,9 % NaCl) ou glucosés (5 % glucose) en perfusion intraveineuse repose sur une compréhension fine de la pression osmotique et de la compatibilité avec le plasma sanguin.

De la biochimie à la thérapeutique

Votre pratique quotidienne sera constamment confrontée à l'importance de l'eau :

- En **pharmacie** : La solubilité d'un principe actif détermine sa formulation galénique et sa biodisponibilité.
- En **médecine** : L'équilibre acido-basique du sang ($\text{pH} = 7,4$) est une constante physiologique vitale.
- En **chirurgie dentaire** : Les propriétés tensioactives des solutions irriguent les canaux dentaires.
- En **biochimie** : Les interactions hydrophobes pilotent la reconnaissance moléculaire anticorps-antigène.

Important

Maîtriser la chimie des solutions aqueuses, c'est acquérir les clés pour comprendre :

- La pharmacocinétique des médicaments
- La physiopathologie des déséquilibres ioniques
- Le mécanisme d'action des agents thérapeutiques
- Les principes des diagnostics biologiques

3.3.7. Donc , l'eau

Dans cette section, nous explorerons comment les propriétés moléculaires de l'eau déterminent ses fonctions macroscopiques dans l'organisme. Nous verrons comment un simple angle de liaison de $104,5^\circ$ au sein de la molécule H_2O influence le transport membranaire, la distribution médicamenteuse, et l'équilibre physiologique.

Plongez dans l'exploration de ce solvant extraordinaire, non pas comme une simple substance chimique, mais comme la matrice active de tous les processus vitaux que vous serez amenés à soigner. L'eau, par sa structure dipolaire et sa capacité à former des liaisons hydrogène, est bien plus qu'un simple solvant inerte. Elle est un acteur chimique dynamique, un régulateur thermique, un transporteur et un tampon essentiel. Maîtriser sa chimie, c'est comprendre le milieu dans lequel se déroulent toutes les réactions du corps humain, depuis l'action d'un enzyme jusqu'à l'effet d'un médicament. Cette connaissance est le fondement sur lequel nous construirons les concepts d'équilibres acido-basiques, de tampons physiologiques et de solubilité, piliers de votre pratique future.

3.4. Les Réactions en Solution - Constantes d'Équilibre

3.4.1. Principe de Le Chatelier


Définition

Le **principe de Le Chatelier** (1884) énonce que :

Lorsqu'un système à l'équilibre est soumis à une perturbation (changement de concentration, température, ou pression), il évolue de manière à s'opposer partiellement à cette perturbation et à rétablir un nouvel état d'équilibre.

3.4.1.1. Perturbations et réponses du système

Changement de concentration Pour une réaction générale :



- **Ajout de réactif** : L'équilibre se déplace dans le sens **direct** ($\rightarrow$) pour consommer le réactif ajouté
- **Retrait de produit** : L'équilibre se déplace dans le sens **direct** ($\rightarrow$) pour reformer le produit retiré
- **Ajout de produit** : L'équilibre se déplace dans le sens **inverse** ($\leftarrow$) pour consommer le produit ajouté
- **Retrait de réactif** : L'équilibre se déplace dans le sens **inverse** ($\leftarrow$) pour reformer le réactif retiré

Changement de température

- **Réaction endothermique** ($\Delta H > 0$) : Lorsque la température augmente, l'équilibre se déplace vers la formation des produits.
- **Réaction exothermique** ($\Delta H < 0$) : Lorsque la température augmente, l'équilibre se déplace vers la formation des réactifs.

Changement de pression (pour les gaz)

- Quand on augmente la pression : Le système cherche à diminuer cette pression. Pour cela, il déplace l'équilibre vers le côté de la réaction qui contient le moins de molécules de gaz (moins de volume donc moins de pression).

- Quand on diminue la pression : Le système cherche à l'augmenter. L'équilibre se déplace alors vers le côté qui contient le plus de molécules de gaz (plus de volume donc plus de pression).

Exemple

Synthèse de l'ammoniac (procédé Haber-Bosch) :




Côté gauche : 1 + 3 = 4 moles de gaz, Côté droit : 2 moles de gaz

- **Augmentation de pression** : Déplacement dans le sens de 4 moles gaz vers 2 moles gaz
- **Diminution de pression** : Déplacement dans le sens 2 moles gaz vers 4 moles gaz
- **Ajout de N₂ ou H₂** : Déplacement vers 2 moles de gaz

3.4.1.2. Application : hyperventilation et alcalose respiratoire

L'équilibre acido-basique sanguin est gouverné par le système tampon bicarbonate/CO₂ :




Important

Hyperventilation : Ventilation pulmonaire excessive entraînant une élimination accrue de CO₂.

Mécanisme physiopathologique :

- Perturbation** : Élimination excessive de CO₂ par hyperventilation
- Application de Le Chatelier** :



- Déplacement d'équilibre** : ← (sens inverse) pour compenser la perte de CO₂
- Conséquence** :
 - Diminution de [H⁺] **Augmentation du pH sanguin**
 - Diminution de [H₂CO₃] et [HCO₃⁻]
- Diagnostic** : **Alcalose respiratoire** (pH > 7,45, pCO₂ < 35 mmHg)

Exemple

Causes d'hyperventilation :

- Anxiété, attaque de panique
- Douleur intense
- Hypoxie (altitude)
- Sepsis, encéphalopathie
- Surdosage en salicylés (aspirine)

Compensation métabolique : L'organisme compense l'alcalose respiratoire par :

- **Excrétion rénale** de HCO₃⁻
- **Rétention** d'ions H⁺
- **Diminution** de la réabsorption des bicarbonates

Important

Signes cliniques de l'alcalose respiratoire :


- Paresthésies (picotements) péri-orales et des extrémités
- Tétanie, spasmes carpopédaux
- Vertiges, confusion
- Palpitations, douleur thoracique

3.4.1.3. Les Réactions en Solution - Constantes d'Équilibre

En biochimie et en physiologie, de nombreuses réactions chimiques se déroulent en solution aqueuse (dans l'eau, qui est le milieu biologique par excellence). Ces réactions ne vont pas toujours jusqu'à épuisement des réactifs : elles atteignent souvent un équilibre dynamique, où la vitesse de la réaction directe égale la vitesse de la réaction inverse. Exemple biologique :

- La liaison de l'oxygène (O₂) à l'hémoglobine est un équilibre.
- Les réactions enzymatiques (Michaelis-Menten) dépendent aussi de constantes d'équilibre.
- Les tampons biologiques (système bicarbonate CO₂) reposent sur ce concept.

Pour une réaction générale à l'équilibre :



- A et B : réactifs
- C et D : produits
- a, b, c, d : coefficients stœchiométriques

Définition

La **constante d'équilibre** K (les concentrations sont exprimées en mol/L à l'équilibre) :

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

- $K > 1$: Équilibre favorise les **produits**
- $K \approx 1$: Concentrations comparables de réactifs et produits
- $K < 1$: Équilibre favorise les **réactifs**

3.4.1.4. Sens physique de la constante d'équilibre

Relation avec l'énergie libre de Gibbs :

Définition

La constante d'équilibre est reliée à la variation d'énergie libre standard ΔG° par :

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

où :

- R : Constante des gaz parfaits (8,314 J/(mol · K))
- T : Température en Kelvin
- K : Constante d'équilibre

- $\Delta G^\circ < 0 \Rightarrow K > 1$: Réaction **exergonique** – libération d'énergie ;
- $\Delta G^\circ = 0 \Rightarrow K = 1$: État d'équilibre ;
- $\Delta G^\circ > 0 \Rightarrow K < 1$: Réaction **endergonique** – absorption d'énergie.

Interprétation thermodynamique

Tableau 3.2 Interprétation qualitative de la constante d'équilibre.

Valeur de K	Position équilibre	Tendance réactionnelle
$K > 10^3$	Fortement déplacé (à droite)	Réaction quasi complète
$10^{-3} < K < 10^3$	Équilibre	Réaction partielle
$K < 10^{-3}$	Fortement déplacé (à gauche)	Réaction très limitée

3.4.1.5. Applications médicales des constantes d'équilibre

Constante de dissociation acide (K_a)

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

- **pH sanguin** : Le système tampon H_2CO_3/HCO_3^- maintient le pH à 7,4. Son efficacité vient du fait que le pKa de ce couple (environ 6,1) est proche du pH physiologique, ce qui lui permet de neutraliser aussi bien les acides que les bases ajoutés.
- **Pharmacologie** : Le pKa d'un médicament détermine sa capacité à traverser les membranes biologiques. La forme non ionisée (lipophile) passe facilement, contrairement à la forme ionisée (hydrophile). Selon le pH local (estomac, sang), la proportion de ces formes change, influençant l'absorption et la distribution du médicament.
- **Enzymologie** : L'activité de nombreuses enzymes est optimale à un pH spécifique, lié à l'état d'ionisation des acides aminés de leur site actif.

3.4.1.6. Constante de solubilité (K_s)

$$K_s(AgCl) = [Ag^+][Cl^-] = 1,8 \cdot 10^{-10} \text{ mol}^2/\text{L}^2$$

Exemple

Lithiase rénale : La formation de calculs de phosphate de calcium ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) survient lorsque les concentrations en ions dans l'urine augmentent. Le produit ionique $[\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2$ dépasse alors la constante de solubilité K_s . Selon le principe de Le Chatelier, la réaction est déplacée vers la droite, provoquant la précipitation des cristaux solides.

$$K_s(\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2) = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2 = 2,0 \cdot 10^{-29} \text{ mol}^5/\text{L}^5$$

Constantes de formation des complexes (K_f)

- **Chélation :** Traitement des intoxications métalliques. Des molécules comme l'EDTA forment des complexes très stables (K_f élevé) avec des ions toxiques (plomb, mercure), les rendant solubles et éliminables par les reins.
- **Transport de l'oxygène :** L'oxygène se lie de manière réversible au centre fer de l'hème dans l'hémoglobine, un exemple de complexation essentielle à la vie.
- **Enzymes métalloprotéiques :** Des ions métalliques (Zn^{2+} , Fe^{2+} , Mg^{2+}) sont des cofacteurs indispensables au site actif de nombreuses enzymes, leur permettant de catalyser les réactions.

Important

Importance clinique :

- **Diagnostic :** Les dosages biologiques (gaz du sang, ionogramme sanguin) exploitent directement ces principes d'équilibre pour évaluer l'état d'un patient.
- **Traitement :** La compréhension de ces équilibres guide le choix des médicaments et l'optimisation des posologies pour atteindre la concentration efficace au bon endroit.
- **Prévention :** Comprendre la formation des calculs ou les précipitations pathologiques permet de mettre en place des stratégies préventives (hydratation, régime alimentaire).

Le principe de Le Chatelier et les constantes d'équilibre ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont les fondements de la physiologie et de la pharmacologie. Leur maîtrise est essentielle pour :

- Comprendre la régulation acido-basique et ses perturbations (acidose, alcalose).
- Prévoir le comportement d'un médicament dans l'organisme.
- Interpréter un bilan biologique de manière critique.

Ces concepts sont des outils quotidiens de votre future pratique clinique.

Transition

Ainsi, après avoir exploré les différentes solutions aqueuses et leurs propriétés chimiques, notamment leur capacité à conduire le courant ou à réagir avec d'autres espèces, il apparaît essentiel de s'intéresser à un comportement particulier de certaines d'entre elles : celui lié aux échanges de protons. En effet, parmi les solutions rencontrées, certaines sont capables de libérer ou de capter des ions H^+ , modifiant ainsi leur pH. Cette propriété fondamentale est au cœur de l'équilibre acido-basique, que nous allons désormais étudier en détail.

Chapitre 4.

L'équilibre acido-basique

4.1. Les réactions acido-basiques

Il existe des acides et des bases couramment utilisés, par exemple l'aspirine c'est de l'acide acétylsalicylique et le lait de magnésie est de l'hydroxyde de magnésium (une base). En plus de constituer les substances de base de nombreux produits médicaux et domestiques, les acides et les bases jouent un rôle important dans certains procédés industriels et sont essentiels au bon fonctionnement des organismes vivants. Avant d'étudier les réactions acido-basiques, il faut d'abord comprendre leur nature.

4.1.1. Les propriétés générales des acides et des bases

Définition Empirique et Historique

- **Acide** : Les acides ont un goût aigre (latin **acidus**), piquant ; par exemple, le vinaigre doit son goût à l'acide acétique, et les citrons et les autres agrumes doivent le leur à l'acide citrique, qui provoque la transition chromique (changement de couleur) du tournesol du bleu au rouge, réagit avec les métaux en dégageant du dihydrogène, et neutralise les bases.
- **Base** : Substance de saveur **amère**, gluante au toucher (savonneuse), qui provoque la transition chromique du tournesol du rouge au bleu., et neutralise les acides.

L'acide par définition c'est une substance (moléculaire ou ionique, organique ou inorganique) qui s'ionise dans l'eau pour donner des ions H^+ , et une base comme une substance qui s'ionise dans l'eau pour donner des ions OH^- . C'est le chimiste suédois **Svante Arrhenius** qui, à la fin du 19^{ème} siècle, formula ces définitions dans le but de classer des substances dont les propriétés en solution aqueuse étaient bien connues. A nos jours il y a trois définitions :

Définition Selon la théorie d'Arrhenius (1884) avec prix Nobel en 1903

- **Acide** Substance qui libère des ions H^+ en solution aqueuse :
 $HA \longrightarrow H^+ + A^-$
- **Base** Substance qui libère des ions OH^- en solution aqueuse :
 $BOH \longrightarrow B^+ + OH^-$
- **Neutralisation** : $H^+ + OH^- \longrightarrow H_2O$ ($\Delta H = -57,1 \text{ kJ/mol}$)
- Exemple : $HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$; $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$



Svante Arrhenius

Avantages :

- Première définition simple et intuitive.
- Efficace pour expliquer l'acidité et la basicité en chimie aqueuse (biochimie clinique).

Limites :

- Limitée aux solutions aqueuses.
- Ne prend pas en compte les réactions acide-base sans H^+ ou OH^-
- N'explique pas la basicité de NH_3 , Na_2CO_3 , etc.
- Ignore le rôle du solvant dans la dissociation

Définition Selon la théorie de Brønsted & Lowry (1923)

- **Acide** : Espèce capable de céder un ou plusieurs ions (H^+) en solution aqueuse : $AH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$
- **Base** : Espèce capable de capter un ou plusieurs ions (H^+) en solution aqueuse : $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$
- **Couple acide/base conjugué** : $Acide \rightleftharpoons Base + H^+$
- Exemple : $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.



Brønsted & Lowry

En 1923, **Johannes Brønsted**, un chimiste danois, et **Thomas Martin Lowry**, un chimiste anglais, proposèrent de manière indépendante des définitions élargies qui décrivaient un acide comme un donneur de protons (H^+ ou H_3O^+) et une base comme un accepteur de protons. On appelle maintenant les substances qui réagissent de cette façon des acides de **Brønsted-Lowry** et des bases de **Brønsted-Lowry**. Il est à noter que ces définitions ne nécessitent pas que les acides ou les bases soient en solution aqueuse.

Avantages :

- Généralisable à tout solvant protique (il est capable de donner un proton).
- Explique la basicité des amines, anions, etc.
- Introduction du concept d'**ampholyte**
- Définition plus générale, indépendante du solvant.
- Introduit la notion de couples acide-base conjugués (très utile en biologie).


Limitations :

- Reste limitée aux transferts de protons.
- Ne décrit pas les réactions acide-base sans hydrogène.

Couple acido-Basique : Le concept de couple acide-base conjugués émerge directement de la définition de Brønsted-Lowry. Il décrit la relation réciproque entre un acide et la base formée lorsqu'il perd un proton, ou entre une base et l'acide formé lorsqu'elle gagne un proton. Chaque acide génère ainsi sa base conjuguée, et chaque base son acide conjugué, créant des paires indissociables comme HCl/Cl^- , H_3O^+/H_2O ou CH_3COOH/CH_3COO^- . Cette relation duale structure toute la réactivité acide-base.

Définition Selon la théorie de Lewis (1924)

- **Acide** : Espèce accepteur de **paire d'électrons** (déficiente en électrons)
- **Base** : Espèce donneur de **paire d'électrons** (riche en électrons)
- **Liaison coordinative** : Formation d'un adduit par partage de la paire électronique
- **Acide** : Espèce capable d'accepter une paire d'électrons.
- **Base** : Espèce capable de donner une paire d'électrons.
- Exemple : $\square BF_3 + :NH_3 \longrightarrow F_3B-NH_3$



Gilbert Newton Lewis

Pour le chimiste américain **Gilbert Newton Lewis**, une base de Lewis est une substance qui peut donner un doublet d'électrons, et un acide de Lewis est une substance qui peut recevoir un doublet d'électrons. Par exemple, dans la protonation de l'ammoniac, NH_3 agit comme une base de Lewis en acceptant ce doublet. Une réaction acido-basique de Lewis est donc une réaction dans laquelle il y a transfert d'un doublet d'électrons d'une espèce à une autre. Une telle réaction ne produit pas nécessairement de sel ni d'eau. Ce qui rend la définition de Lewis importante, c'est qu'elle est beaucoup plus générale que celles données par ses prédécesseurs, elle inclut dans les réactions acido-basiques beaucoup de réactions dont l'acide n'est pas un acide de Brønsted-Lowry. Soit, par exemple, la réaction entre le trifluorure de bore (BF_3) et l'ammoniac NH_3 . L'atome de B dans BF_3 est à l'état d'hybridation sp^2 . L'orbitale $2p$ non hybridée et inoccupée reçoit le doublet d'électrons de NH_3 . Ainsi, BF_3 agit comme un acide selon la définition de Lewis, même s'il ne contient aucun proton ionisable. Il faut noter qu'une liaison covalente de coordinence s'est formée entre les atomes de B et de N.

Avantages :

- Très générale : inclut toutes les réactions où il y a transfert d'électrons.
- Explique la formation de complexes, utile en bio-inorganique et enzymologie.

Limitations :

- Plus abstraite et moins intuitive.
- Ne met pas en avant la notion de proton, pourtant centrale en physiologie.

Exemples :

- **Acides de Lewis** : AlCl_3 , BF_3 , Fe^{3+} , H^+ , carbocations
- **Bases de Lewis** : NH_3 , H_2O , OH^- , amines, anions
- **Application** : Catalyse acide, complexes métalliques, réactions organiques

Attention

Bien que la définition simplifiée parle de "donneur de H^+ ", il est crucial de comprendre que le proton H^+ n'existe pas à l'état libre en solution aqueuse. Il est immédiatement hydraté par les molécules d'eau pour former l'ion hydronium H_3O^+ . La notation " H^+ " est une convention et une simplification d'écriture, mais l'espèce chimique réellement présente et active c'est l'ion H_3O^+ .


Pourquoi H^+ n'existe pas seul ? Un proton (H^+) est extrêmement petit et possède une très forte densité de charge positive. Il serait immédiatement attiré par les doublets non liants des molécules d'eau, qui sont polaires.

4.2. Principe de Classification des Acides et des Bases

4.2.1. Classification Selon la Force

Définition Acides Forts

Un **acide fort** est un acide qui se dissocie complètement en solution aqueuse :

**Caractéristiques :**

- Dissociation quantitative (>99%)
- Conductivité électrique élevée
- pH faible même à faible concentration
- Réaction exothermique avec l'eau

Exemples courants :

- **Acides minéraux** : HCl (chlorhydrique), H_2SO_4 (sulfurique), HNO_3 (nitrique), HClO_4 (perchlorique)
- **Acides halogénés** : HCl , HBr , HI ($\text{p}K_a < 0$)
- **Superacides** : HSO_3F (acide fluorosulfurique), $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ (acide triflique)

Définition Acides Faibles

Un **acide faible** est un acide qui ne se dissocie que partiellement en solution aqueuse, établissant un équilibre :

**Caractéristiques :**

- Dissociation partielle (1-10%)
- Équilibre dynamique réversible
- Conductivité modérée
- Solutions tampons possibles

Exemples courants :

- **Acides carboxyliques** : CH_3COOH (acétique, $\text{p}K_a=4,8$), HCOOH (formique, $\text{p}K_a=3,8$)
- **Acides minéraux faibles** : H_2CO_3 (carbonique), H_3PO_4 (phosphorique)
- **Phénols** : $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ (phénol, $\text{p}K_a=10,0$)
- **Acides aminés** : Forme zwitterionique

Définition Bases Fortes

Une **base forte** est une base qui s'hydrolyse complètement en solution aqueuse :

**Caractéristiques :**

- Hydrolyse quantitative
- pH élevé même à faible concentration
- Hydroxydes métalliques solubles
- Réaction souvent exothermique

Exemples courants :

- **Hydroxydes alcalins** : NaOH , KOH , LiOH

- **Hydroxydes alcalino-terreux** : $\text{Ca}(\text{OH})_2$, $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- **Oxydes basiques** : Na_2O , CaO (avec hydrolyse)

Définition Bases Faibles

Une **base faible** est une base qui ne s'hydrolyse que partiellement en solution aqueuse :



Caractéristiques :

- Hydrolyse partielle
- Équilibre dynamique
- pH modérément basique
- Capacité tampon

Exemples courants :

- **Amines** : NH_3 (ammoniac), CH_3NH_2 (méthylamine)
- **Anions** : CO_3^{2-} , CH_3COO^- , PO_4^{3-}
- **Hétérocycles azotés** : Pyridine, imidazole

4.2.2. Classification Selon la Nature Chimique

La diversité structurale des acides et des bases en biochimie et pharmacologie est à l'origine de la variété de leurs propriétés fondamentales. Le classement selon la nature chimique offre une grille de lecture pertinente pour distinguer les composés d'après leur squelette moléculaire, leurs groupements fonctionnels et les caractéristiques physico-chimiques qui en découlent. Depuis les acides minéraux forts jusqu'aux amines hétérocycliques faibles, chaque famille présente des propriétés spécifiques, solubilité, réactivité et toxicité qui gouvernent à la fois leur comportement dans les environnements biologiques et leurs applications thérapeutiques ou analytiques.


Tableau 4.1 Classification des acides et bases selon leur nature chimique.

Type	Exemples caractéristiques	Propriétés
Acides minéraux	HCl , H_2SO_4 , HNO_3	Forts, corrosifs, hydrosolubles
Acides organiques	CH_3COOH , $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	Faibles, souvent solubles
Acides carboxyliques	$\text{R}-\text{COOH}$	$\text{p}K_a \approx 4-5$, dimérisation
Phénols	$\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$, catéchols	$\text{p}K_a \approx 10$, chromophores
Thiols	$\text{R}-\text{SH}$, glutathion	$\text{p}K_a \approx 8-9$, nucléophiles
Bases minérales	NaOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$	Fortes, hygroscopiques
Amines aliphatiques	NH_3 , RNH_2	Faibles, odeur caractéristique
Amines aromatiques	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, aniline	Moins basiques, toxiques
Hétérocycles	Pyridine, purines	Basicité variable

4.2.3. Classification Selon le Nombre de Protons

Définition Acides Monoprotiques (monoacides)


Acide monoprotique : Acide capable de céder un seul proton.



Exemples : HCl , CH_3COOH , HNO_3 , HCN

Définition Acides Polyprotiques (polyacides)

Acide polyprotique : Acide capable de céder plusieurs protons successivement.



Chaque étape est caractérisée par une constante d'acidité propre (K_{a1} , K_{a2} , ...), avec généralement $K_{a1} > K_{a2} > \dots$

Exemples :

- **Diacides** : H_2SO_4 , H_2CO_3 , H_2S
- **Triacides** : H_3PO_4 , H_3AsO_4 , acide citrique
- **Tétracides** : H_4EDTA , acide éthylènediaminetétraacétique

Particularités :

- Constantes d'acidité décroissantes : $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$
- Zones de tamponnement multiples
- Courbes de titrage complexes

4.2.4. Applications des Différentes Classes

Les acides et bases se classent selon leur force (complète ou partielle dissociation en solution aqueuse, mesurée par le pK_a ou pK_b) et leur nature (minéraux ou organiques), déterminant leurs applications variées en chimie industrielle, pharmacie et biologie, mais aussi leurs risques toxicologiques. Le tableau 4.2 résume ces aspects essentiels, en distinguant acides forts/faibles, bases fortes/faibles, et sous-catégories organiques/minérales, pour guider l'enseignement sécuritaire et pratique.

Tableau 4.2 Applications et précautions selon le type d'acide ou base.

Type	Applications	Précautions
Acides forts	Décapage métaux, synthèse	Corrosifs, brûlures
Acides faibles	Conservation alimentaire, pharmacie	Irritants
Bases fortes	Savons, dégraissants, pH élevé	Caustiques, hydrolyse
Bases faibles	Médicaments, tampons physiologiques	Toxicité variable
Acides organiques	Additifs alimentaires, cosmétiques	Allergènes potentiels
Acides minéraux	Industrie chimique, batteries	Manipulation dangereuse

La classification des acides et bases n'est pas rigide mais représente un continuum de propriétés chimiques et physiques. La compréhension de ces principes de classification est essentielle pour prédire le comportement chimique, les applications potentielles et les précautions de manipulation.

Tableau 4.3 Classification des acides et des bases conjuguées en fonction du pK_a

pK_a	Force de l'acide	Force de la base conjuguée	Exemples d'acides	Exemples de bases
< -1,7	Acide fort	Base ultra-faible	HCl, H ₂ SO ₄ , HNO ₃	Cl ⁻ , HSO ₄ ⁻ , NO ₃ ⁻
-1,7 à 4	Acide modéré	Base très faible	H ₃ O ⁺ , CH ₃ COOH	H ₂ O, CH ₃ COO ⁻
4 à 9	Acide faible	Base faible	H ₂ CO ₃ , NH ₄ ⁺	HCO ₃ ⁻ , NH ₃
9 à 16	Acide très faible	Base forte	H ₂ O, CH ₃ OH	OH ⁻ , CH ₃ O ⁻
> 16	Acide ultra-faible	Base très forte	CH ₄ , NH ₃	CH ₃ ⁻ , NH ₂ ⁻

Attention

À retenir :

- Un pK_a plus **petit** signifie un acide plus **fort** (il libère plus facilement H⁺)
- Un pK_a plus **grand** signifie une base conjuguée plus **forte** (elle capte plus facilement H⁺)
- Pour les hydracides d'un même groupe : en descendant dans le tableau périodique, l'acidité **augmente**
- À période donnée : plus l'atome lié à H est **électronégatif**, plus l'acidité **augmente**

Le classement par pK_a n'est pas arbitraire. Il est une mesure quantitative directe et universelle de la force acide, dérivée d'une constante d'équilibre thermodynamique (K_a). Il permet de prédire le sens et l'étendue des réactions acide-base, ce qui en fait l'outil le plus puissant et le plus utilisé pour classer et comprendre le comportement des acides et des bases.

Tableau 4.4 Classification des acides et bases selon leur force.

Type	Caractéristiques	Exemples Biologiques
Acides forts	Dissociation complète $K_a > 10^3$, $pK_a < 0$	HCl (estomac), H ₂ SO ₄
Acides faibles	Équilibre de dissociation $K_a = 10^{-2}$ à 10^{-10}	Acides carboxyliques, H ₂ CO ₃ , NH ₄ ⁺
Acides très faibles	Dissociation négligeable $K_a < 10^{-10}$	Alcanes, aromatiques
Bases fortes	Hydrolyse complète	OH ⁻ , NH ₂ ⁻
Bases faibles	Équilibre de protonation	Amines, anions carboxylates

4.2.5. Ampholyte et Zwitterions

Définition

Un **ampholyte** est une espèce capable de se comporter comme un acide et une base. Un **zwitterion** est une molécule électriquement neutre mais portant des charges formelles positives et négatives.

Exemples biologiques cruciaux :


- **Eau** : H₂O + H₂O $\rightleftharpoons$ H₃O⁺ + OH⁻ ($K_e = 10^{-14}$)
- **Ion bicarbonate** : HCO₃⁻ (un amphotère : base vis-à-vis de H⁺, acide vis-à-vis de OH⁻)

- **Acides aminés** : Forme zwitterionique à pH physiologique.
exemple : sur Formation du zwitterion : $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH} \longrightarrow \text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COO}^-$
- **Protéines** : Groupes ionisables multiples créant un comportement amphotère

4.2.6. Constantes d'Acidité K_a et $\text{p}K_a$: Signification Physico-Chimique

4.2.6.1. Définition Rigoureuse de K_a

Avant d'aborder les applications biologiques et cliniques des équilibres acido-basiques, il est essentiel de revenir sur la définition thermodynamique précise de la constante d'acidité K_a . Cette rigueur permet de comprendre les limites de l'approximation par les concentrations et l'importance des conditions expérimentales dans la détermination des valeurs de $\text{p}K_a$ présentées tout au long de ce chapitre. Pour la réaction :



Définition

$$K_a = \frac{a(\text{H}_3\text{O}^+) \cdot a(\text{A}^-)}{a(\text{HA})} \quad (\text{Activités})$$

$$\approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad (\text{Concentrations diluées})$$

La constante **thermodynamique** K_a dépend de la température :

$$\frac{d(\ln K_a)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

4.2.6.2. Échelle $\text{p}K_a$ et Relations Utiles

Définition

$$\text{p}K_a = -\log_{10} K_a$$

$$K_a = 10^{-\text{p}K_a}$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_a = 2.303RT \cdot \text{p}K_a$$

- ΔG° variation d'énergie libre standard de dissociation
- Relation linéaire entre $\text{p}K_a$ et ΔG° à température constante
- $\text{p}K_a = \text{pH}$ lorsque $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$ (d'après Henderson-Hasselbalch)

4.2.6.3. Force Acide-Base et Structure Moléculaire

La force d'un acide ou d'une base ne dépend pas uniquement de la nature du groupement fonctionnel, mais également de son environnement moléculaire. Des effets électroniques, inductifs et mésomères, ainsi que des facteurs stériques et de solvation modulent considérablement la stabilité de la base conjuguée, et donc la valeur du $\text{p}K_a$. Comprendre ces influences permet d'expliquer pourquoi des composés de structure proche peuvent présenter des acidités très différentes, et d'interpréter le comportement des biomolécules dans leur micro-environnement protéique ou membranaire. Le tableau ci-dessous résume les principaux effets structuraux rencontrés en contexte biologique.

Tableau 4.5 Effets électroniques et structuraux sur la force acide.

Effet	Impact sur $\text{p}K_a$	Exemple Biologique
Effet inductif groupe attracteur (-I)	$\downarrow \text{p}K_a$ (acide plus fort)	Acide trifluoroacétique ($\text{p}K_a = 0,5$) par rapport l'acide acétique (4,76). Les groupes F^- attirent les électrons et stabilisent l'anion.
Effet inductif groupe donneur (+I)	$\uparrow \text{p}K_a$ (acide plus faible)	Acide acétique (4,76) par rapport propanoïque (4,87). Le groupe méthyle donne des électrons, affaiblissant l'acide.
Mésomérie	Stabilisation de l'anion $\downarrow \text{p}K_a$	Phénols ($\text{p}K_a \approx 10$) par rapport l'alcools ($\text{p}K_a \approx 16$). La délocalisation de la charge sur le cycle aromatique stabilise l'anion.
Solvatation	Meilleure solvation de l'anion $\downarrow \text{p}K_a$	Anions carboxylates (RCOO^-) sont mieux solvatés par l'eau que les ions phénolate (PhO^-).

4.2.6.4. pK_a des Groupes Fonctionnels Biomoléculaires

Tableau Complet des pK_a Biologiquement Pertinents

Les propriétés acido-basiques des biomolécules sont fondamentales pour comprendre leur fonction dans les processus cellulaires. Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs de pK_a des principaux groupements fonctionnels rencontrés en biochimie. Ces valeurs, présentées avec leurs variations physiologiques (ΔpK_a), tiennent compte de l'influence de l'environnement moléculaire local (micro-environnement, effet inductif, interactions électrostatiques) qui peut significativement moduler l'acidité d'un groupement fonctionnel selon le contexte protéique ou membranaire.

Tableau 4.6 pK_a des groupes fonctionnels en contexte biologique avec variations physiologiques.

Groupe fonctionnel	Structure	pK_a	ΔpK_a	Contexte Biologique
Carboxylique	$-\text{COOH}$	3.5-4.5	± 1.0	Acides aminés, acides gras
Ammonium aliphatique	$-\text{NH}_3^+$	9.0-10.5	± 1.5	Lysine, neurotransmetteurs
Ammonium aromatique	$-\text{NH}_3^+$	4.5-5.5	± 0.5	Histidine, tryptophane
Phosphate (pK_1)	$-\text{OPO}_3\text{H}_2$	1.5-2.5	± 0.5	ATP, ADN, phospholipides
Phosphate (pK_2)	$-\text{OPO}_3\text{H}-$	6.5-7.5	± 0.5	Système tampon cellulaire
Phénol	$-\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$	9.5-10.5	± 1.0	Tyrosine, hormones
Imidazole	$-\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_2$	6.0-7.0	± 1.0	Histidine, sites catalytiques
Thiol	$-\text{SH}$	8.0-9.0	± 1.0	Cystéine, glutathion
Guanidinium	$-\text{NH}-\text{C}(\text{NH}_2)_2^+$	12.0-13.0	± 0.5	Arginine, créatine
Hydroxyle aliphatique	$-\text{OH}$	15.0-16.0	± 1.0	Sérine, thréonine

Facteurs Modifiant les pK_a en Milieu Biologique :

- **Environnement hydrophobe** : Il déstabilise les espèces chargées, ce qui se traduit par une augmentation du pK_a des groupes basiques et une diminution du pK_a des groupes acides.
- **Interactions électrostatiques** : La proximité d'une charge positive stabilise les anions (diminue le pK_a d'un acide), tandis qu'une charge négative a l'effet inverse.
- **Effet de micro-environnement** : La composition chimique spécifique d'un site actif enzymatique peut considérablement déplacer le pK_a d'un résidu pour optimiser la catalyse.
- **Modifications post-traductionnelles** : L'ajout de groupes fonctionnels (comme un phosphate ou un acétyle) modifie la charge et l'environnement d'un résidu, altérant ainsi son pK_a .

Exemple

Histidine dans l'hémoglobine :

- pK_a normal : 6.0
- pK_a dans l'environnement hydrophobe : 7.1
- Crucial pour l'effet Bohr (fixation/rélargage de l' O_2)

4.2.7. Applications Biomédicales des Concepts Acide-Base

Important

Équation de Henderson-Hasselbalch : relie le **pH** du milieu et le pK_a du médicament pour estimer la proportion de formes ionisée et non-ionisée (donc la diffusion).

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$$

Lecture rapide : à $\text{pH} = pK_a$, les deux formes sont en proportions $\approx 50/50$; un écart de 1 unité de pH correspond à un ratio $\approx 10 : 1$.

- **Forme non ionisée** (neutre) : Sa **liposolubilité** plus élevée **favorise son passage** à travers les membranes biologiques.
- **Forme ionisée** (chargée) : Sa forte **hydrosolubilité entrave sa diffusion** à travers les membranes et **favorise son élimination** par voie rénale.
- **Piégeage par l'effet de pH (distribution pH-dépendante)** : Les acides faibles s'accumulent dans les compartiments **basiques** (où ils sont déprotonés et chargés), et les bases faibles dans les compartiments **acides** (où elles sont protonées et chargées), car leur forme ionisée diffuse difficilement à travers les membranes.

4.2.8. Tableau des Médicaments et leurs pK_a Critiques

Le pK_a d'un médicament est un paramètre pharmacocinétique fondamental qui influence directement son devenir dans l'organisme. Il détermine le degré d'ionisation de la molécule en fonction du pH des différents compartiments biologiques,

affectant ainsi des processus clés tels que l'absorption digestive, la distribution tissulaire, la liaison aux protéines plasmatiques et l'élimination rénale. Le tableau suivant présente les valeurs de pK_a de médicaments couramment utilisés en pratique clinique, ainsi que leurs conséquences pharmacologiques et les implications pratiques pour la prise en charge des patients.

Tableau 4.7 Valeurs de pK_a de médicaments et conséquences en pratique clinique.

Médicament	Classe	pK_a	Conséquence Pharmacologique	Implication Clinique
Aspirine	AINS	3.5	Absorption gastrique	Prise avec aliments
Warfarine	Anticoagulant	5.0	Liaison protéique >99%	Interactions médicamenteuses
Lidocaïne	Anesthésique	7.9	Activité pH-dépendante	↓ efficacité en milieu acide
Morphine	Analgésique	8.0, 9.9	Distribution CNS	Monitoring respiratoire
Amoxicilline	Antibiotique	2.4, 7.4, 9.6	Absorption intestinale	Prise hors repas
Oméprazole	IPP	4.0, 8.7	Activation acide	Gélule gastro-résistante
Propranolol	β -bloquant	9.5	Trapping cérébral	Effets CNS
Furosémide	Diurétique	3.9, 7.5	Sécrétion tubulaire	Efficacité rénale

4.2.9. Physiologie Acido-Basique

L'homéostasie acido-basique de l'organisme repose sur un équilibre dynamique maintenu dans des limites étroites, indispensable au fonctionnement optimal des enzymes et des processus cellulaires. Le pH sanguin est régulé par l'interaction coordonnée de multiples systèmes tampons et d'organes spécialisés qui assurent la compensation des déséquilibres potentiels. Les éléments clés de cette régulation physiologique sont présentés ci-dessous.

- **Sang artériel** : $pH = 7.40 \pm 0.05$ ($[H^+] = 40 \text{ nM}$)
- **Systèmes tampons** : Bicarbonate, hémoglobine, protéines, phosphates
- **Régulation rénale** : Réabsorption de HCO_3^- , excretion de H^+
- **Compensation respiratoire** : Modulation de pCO_2

4.2.9.1. Diagnostic des Troubles Acido-Basiques

Tableau 4.8 Paramètres du bilan acido-basique en clinique.

Paramètre	Valeur Normale	Signification Clinique
pH artériel	7.35-7.45	Acidose <7.35, Alcalose >7.45
pCO_2	35-45 mmHg	Composante respiratoire
HCO_3^-	22-26 mM	Composante métabolique
Anion gap	8-16 mEq/L	Acidose métabolique
Excès de base	-2 à +2	Déviations métaboliques

Au-delà des valeurs théoriques de pK_a et de la classification des composés, la maîtrise des équilibres acido-basiques trouve une application clinique directe dans l'interprétation des bilans sanguins. Les paramètres présentés ci-dessus — pH artériel, pression partielle en dioxyde de carbone (pCO_2), bicarbonates (HCO_3^-) et anion gap — constituent les outils diagnostiques essentiels pour identifier et caractériser les troubles de l'équilibre acido-basique chez le patient. Cette approche clinique illustre concrètement comment les concepts fondamentaux de chimie acide-base se traduisent en pratique médicale quotidienne.

La compréhension approfondie des concepts acide-base selon Brønsted-Lowry et la maîtrise des valeurs de pK_a constituent un pilier fondamental pour :

- La conception rationnelle de médicaments
- L'interprétation des mécanismes enzymatiques
- Le diagnostic des déséquilibres physiologiques
- L'élaboration et le développement de nouvelles thérapies

Cette connaissance transcende la simple chimie théorique pour devenir un outil indispensable dans la pratique médicale et pharmaceutique moderne.

4.2.10. le potentiel d'Hydrogène (pH) ou Le degré d'acidité

Puisque les concentrations d'ions H_3O^+ et OH^- en solutions aqueuses sont habituellement des valeurs très petites et peu commodes dans les calculs, le biochimiste danois Søren Sørensen proposa, en 1909, une grandeur plus pratique appelée **pH**. Le pH (potentiel d'hydrogène) d'une solution est le logarithme négatif de la concentration d'ions hydronium (en moles par litre) :

À retenir


$$pH = -\log[H_3O^+] \quad (4.1)$$

Cette équation n'est qu'un outil qui nous permet de fournir des nombres commodes pour les calculs, le potentiel d'hydrogène nous aide à traduire la concentration d'ions hydronium, on peut alors déterminer si les solutions sont acides ou basiques, à 25 °C :

Remarque : Les calculs de pH avec des concentrations sont des **approximations** qui supposent un comportement idéal des solutions. En réalité, les interactions moléculaires (paires d'ions, etc...) font que les concentrations réelles diffèrent des concentrations calculées.

Solution rigoureuse :

- Utiliser l'**activité** (a) plutôt que la concentration []
- $\text{pH} = -\log a_{\text{H}_3\text{O}^+}$ (définition exacte)
- $a_{\text{H}_3\text{O}^+} = [\text{H}_3\text{O}^+]$ seulement pour les solutions idéales



Søren Peter Sørensen

Remarque :

Les calculs avec les concentrations sont des approximations qui donnent une idée du phénomène, mais pas la valeur exacte du pH mesuré. On travaille avec des modèles simplifiés, mais la réalité chimique est plus complexe.

Attention

Pour déterminer le pH d'une solution acido-basique de manière rigoureuse, on s'appuie systématiquement sur **deux principes fondamentaux** qui ne sont autres que les lois de conservation appliquées au contexte spécifique des équilibres ioniques :

- **Le bilan de matière du couple acido-basique** est l'application directe du **principe de conservation de la matière** au couple HA/A^- . Il stipule que toute la quantité d'acide introduite initialement dans la solution doit se retrouver, à tout instant, soit sous sa forme acide HA , soit sous sa forme basique conjuguée A^- . Mathématiquement, pour une concentration initiale C_0 de l'acide HA , cela s'écrit :

$$C_0 = [\text{HA}] + [\text{A}^-]$$

Cette équation exprime que les espèces HA et A^- sont les deux réservoirs d'un même atome de stock.

- **Le bilan d'électroneutralité** est la traduction chimique du **principe de conservation de la charge**. Une solution aqueuse, dans son ensemble, est toujours électriquement neutre. La somme des charges positives portées par tous les cations doit donc être égale à la somme des charges négatives portées par tous les anions. Pour une solution contenant l'acide HA et son sel NaA , cela donne :

$$[\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{A}^-] + [\text{OH}^-]$$

Ce bilan est crucial car il établit un lien entre la concentration en ions H_3O^+ (le pH que l'on cherche) et toutes les autres espèces ioniques en solution.

Ainsi, loin d'être des concepts différents, les **bilans de matière et d'électroneutralité** sont les incarnations pratiques et indispensables des grands principes de conservation (masse et charge) pour résoudre tout problème d'équilibre acido-basique et calculer un pH.

Pour résumer, voilà les étapes à suivre :

- a) Citer les réactions chimiques qui se déroulent au sein de la solution.
- b) Décrire les ions présents en solution.
- c) Écrire les équations mathématiques :
 - Le bilan de matière du couple acido-basique AH/A^- .
 - Le bilan d'électroneutralité du couple AH/A^- .
 - L'équation de constante d'acidité K_a et de basicité K_b du couple AH/A^- .
- d) Utiliser des approximations pour simplifier les calculs.

On peut également établir une échelle de **pOH**, analogue à l'échelle de **pH**, en utilisant le logarithme négatif de la concentration d'ions hydroxyde :

À retenir

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] \quad (4.2)$$

Nous avons vu dans la section 3.3.4 que le produit ionique de l'eau K_e égale à :

$$\begin{aligned} [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] &= K_e = 1,0 \times 10^{-14} \\ -\log([\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]) &= -\log K_e = -\log(1,0 \times 10^{-14}) \\ -\log[\text{H}_3\text{O}^+] - \log[\text{OH}^-] &= \text{p}K_e = 14,00 \end{aligned}$$

On obtient la relation fondamentale :

À retenir

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14 \quad (4.3)$$

La force d'un acide ou d'une base est mesurée par sa tendance à transférer un proton (H^+) dans un solvant donné (généralement l'eau).

Les Calculs : Dans cette section nous allons apprendre à calculer le **pH** de chaque solution aqueuse en équilibre acido-basique, il est très judicieux de souligner l'importance de tableau d'avancement pour chaque cas dans la démonstration et le calcul de **pH**.

Le tableau d'avancement : un outil méthodologique universel

Le tableau d'avancement constitue l'outil fondamental et systématique pour l'étude quantitative des réactions chimiques en solution. Bien plus qu'une simple méthode de calcul, il représente une démarche raisonnée applicable à l'ensemble des systèmes acido-basiques, garantissant rigueur et cohérence dans la résolution des problèmes.

Pour les espèces fortes : dissociation totale Le tableau visualise immédiatement la **dissociation complète** caractéristique des acides et bases forts. Il établit le lien direct et quantitatif entre la concentration initiale en réactif et la concentration finale en ions produits, tout en préparant le terrain pour les situations limites où l'autoprotolyse de l'eau devient significative. Cette approche unifiée permet de comprendre la continuité conceptuelle entre les différents comportements acido-basiques.

Pour les espèces faibles : équilibres dynamiques Face aux équilibres dynamiques des acides et bases faibles, le tableau structure rigoureusement la résolution mathématique. En introduisant systématiquement l'**avancement réactionnel** x , il permet :

- De poser les équations d'équilibre correctes
- De justifier les approximations pertinentes (négliger x devant les concentrations initiales)
- D'identifier les conditions de validité des modèles simplifiés
- D'anticiper les cas où une résolution exacte s'impose

Vision intégrative et applications avancées Au-delà des systèmes simples, le tableau d'avancement s'étend naturellement aux situations complexes :

- Mélanges de plusieurs acides et bases
- Systèmes tampons et zones de virage
- Équilibres compétitifs multiples
- Étude des polyacides et polybases

Important**Avantages méthodologiques :**

- Démarche standardisée applicable à tous les systèmes
- Prévention des oublis d'espèces chimiques
- Visualisation claire de la stoechiométrie
- Fondation solide pour l'étude des équilibres simultanés

La maîtrise du tableau d'avancement représente donc un investissement essentiel, offrant une compréhension profonde et unifiée de la chimie des solutions, depuis les acides forts jusqu'aux systèmes tampons biologiques les plus élaborés.

4.2.10.1. Acide fort

Les acides forts sont des électrolytes forts qui s'ionisent complètement ou presque dans l'eau (voir 4.2.1). La plupart des acides forts sont des acides inorganiques qui se caractérise par :

Important

- **Dissociation complète** : $K_a \gg 1$ (généralement $K_a > 10^2$)
- **pKa négatifs** : Typiquement entre -10 et -1
- **Bases conjuguées ultra-faibles** : Incapables de capter un proton
- **Force acide** : $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HNO}_3 > \text{H}_2\text{SO}_4$ (1ère protonation)
- **Superacides** : Acides plus forts que H_2SO_4 à 100% (ex : HClO_4 , $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$)

Choses importante à souligner aussi c'est que la plupart des acides forts sont inorganiques, dans le tableau suivant on y trouve quelques exemples :

Tableau 4.9 Échelle de force des acides forts en solution aqueuse

Acide fort	Base conjuguée	pK _a	K _a
HClO ₄ (acide perchlorique)	ClO ₄ ⁻ (ion perchlorate)	-10	10 ¹⁰
HI (acide iodhydrique)	I ⁻ (ion iodure)	-9	10 ⁹
HBr (acide bromhydrique)	Br ⁻ (ion bromure)	-8	10 ⁸
HCl (acide chlorhydrique)	Cl ⁻ (ion chlorure)	-7	10 ⁷
H ₂ SO ₄ (acide sulfurique)	HSO ₄ ⁻ (ion hydrogénosulfate)	-3	10 ³
	SO ₄ ²⁻ (ion sulfate)	1,99	10 ⁻²
HNO ₃ (acide nitrique)	NO ₃ ⁻ (ion nitrate)	-1,3	20
H ₃ O ⁺ (ion hydronium)	H ₂ O (eau)	-1,74	55
CF ₃ SO ₃ H (acide triflique)	CF ₃ SO ₃ ⁻ (ion triflate)	-14	10 ¹⁴
FSO ₃ H (acide fluorosulfurique)	FSO ₃ ⁻ (ion fluorosulfate)	-10	10 ¹⁰
ClSO ₃ H (acide chlorosulfurique)	ClSO ₃ ⁻ (ion chlorosulfate)	-8	10 ⁸

Comme vous pouvez le constater, on peut évaluer la force d'un acide à travers sa constante d'acidité **K_a**, ou son **pK_a** (logarithme négatif). Plus un acide est fort, plus sa constante d'acidité **K_a** est élevée. Étant donné la relation inverse entre **K_a** et **pK_a** ($pK_a = -\log K_a$), le **pK_a** d'un acide fort est généralement faible et souvent négatif.

Attention


Attention :

- Les valeurs de pK_a des acides forts sont des estimations théoriques
- En pratique, on considère une dissociation complète : $HA \longrightarrow H^+ + A^-$
- La force réelle dépend du solvant (échelle d'acidité relative)

Démonstration et calcul de pH pour un acide fort :

On commence toujours par une bonne lecture du tableau d'avancement, Ce dernier va décrire la **dissociation totale** d'un acide fort AH dans l'eau, en suivant l'évolution du système depuis l'état initial jusqu'à l'état final d'équilibre.

Équation bilan La réaction de dissociation s'écrit :



Il s'agit d'une transformation **totale** pour un acide fort.

État initial (*t*₀) Au départ :

- Seul l'acide AH est présent à la concentration C_A
- Les produits A⁻ et H₃O⁺ sont absents
- Le degré d'avancement α est nul

État intermédiaire (*t*) À un instant quelconque :

- Une fraction α de l'acide s'est dissociée
- La concentration en AH diminue : $C_A - C_A\alpha$
- Les concentrations en A⁻ et H₃O⁺ augmentent : $C_A\alpha$
- Le degré d'avancement est compris entre 0 et 1

État final (*t*_{eq}) À l'équilibre :

- La dissociation est **complète** ($\alpha \approx 1$)
- L'acide AH a totalement disparu
- Les ions A⁻ et H₃O⁺ sont présents à la concentration C_A
- Le pH final est déterminé par : $[H_3O^+] = C_A$

Important

À retenir : Pour un acide fort, la dissociation est totale et instantanée. La concentration en ions H₃O⁺ à l'équilibre est égale à la concentration initiale en acide, ce qui permet un calcul direct du pH : $pH = -\log C_A$.

Équation de réaction		AH	+	H ₂ O	→	A ⁻	+	H ₃ O ⁺
État initial à <i>t</i> ₀	$\alpha = 0$	C_A				0		0
État intermédiaire à <i>t</i>	$0 < \alpha < 1$	$C_A - C_A\alpha$				$C_A\alpha$		$C_A\alpha$
État final à <i>t</i> _{eq}	$\alpha \simeq 1$	0				C_A		C_A

Il faut just noter que α (α) c'est le **coefficient de dissociation** (on peut l'exprimer par un pourcentage aussi), c'est le rapport entre la quantité d'acide qui s'est dissociée et la quantité initiale d'acide introduite.

$$\alpha = \frac{\text{concentration dissociée}}{\text{concentration initiale}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]_0}$$

- $\alpha = 0$: Acide non dissocié
- $0 < \alpha < 1$: Acide partiellement dissocié
- $\alpha = 1$: Acide totalement dissocié (acide fort).

Le degré d'ionisation d'un acide faible dépend de la concentration initiale de l'acide. Plus l'acide est dilué, plus le pourcentage d'ionisation ou le Coefficient de dissociation est élevé. En d'autres termes, quand un acide est dilué, initialement le nombre de molécules par unité de volume, soit les molécules d'acide non ionisées et les ions, est réduit. Selon le principe de Le Chatelier, pour s'opposer à cette contrainte, soit la diminution de la concentration de particules causée par la dilution, l'équilibre se déplace du côté de l'acide non ionisé (une particule) vers celui de l'ion H_3O^+ et de la base conjuguée (deux particules) afin de produire plus de particules (ions). Par conséquent, le pourcentage d'ionisation de l'acide s'accroît.

imaginez, pour mieux comprendre On peut comparer l'acide faible à une salle remplie de couples de danseurs. Chaque couple représente une molécule d'acide non ionisée. Quand un couple se sépare, cela donne deux personnes seules, qui représentent les ions H_3O^+ et la base conjuguée.

— **Salle très remplie (solution concentrée)** : les couples ont du mal à se séparer car il n'y a pas assez d'espace pour circuler.

— **Salle peu remplie (solution diluée)** : il y a plus d'espace, les couples se séparent plus facilement.

Résultat : plus la solution est diluée, plus il y a de couples qui se séparent donc plus l'acide s'ionise.

Pour le cas d'acide fort, le calcul du pH est très simple il suffit d'appliquer l'équation (4.1), à condition de respecter le valeur ou les données à l'équilibre et seulement à l'équilibre :

À retenir

$$\text{pH} = -\log C_A \quad (4.4)$$

Cette équation est fonctionnelle si $C_A \geq 10^{-6,5} \text{ mol/L}$.

Limite de l'approximation et importance du solvant : Bien que l'équation (4.1) est simple pour les acides forts, son domaine de validité est restreint aux concentrations suffisamment élevées où la contribution du solvant devient négligeable. Cette approximation, qui postule que $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C_A$, revient à ignorer l'autoprotolyse de l'eau, un processus toujours présent dont l'influence devient prépondérante aux très faibles concentrations.

La limite de $10^{-6,5} \text{ mol/L}$ n'est pas arbitraire : elle correspond au point où la concentration en H_3O^+ issue de l'acide (C_A) devient comparable à celle générée par l'autoprotolyse de l'eau (10^{-7} mol/L). En dessous de cette concentration, le solvant cesse d'être un simple spectateur pour devenir un acteur principal de l'équilibre acido-basique. Le modèle simplifié s'effondre alors, comme le révèle le paradoxe apparent d'un pH basique (> 7) pour une solution d'acide fort, qui heurte l'intuition chimique.



Cette transition vers les faibles concentrations impose un changement radical de modélisation. On ne peut plus se contenter d'étudier la dissociation de l'acide seul ; il faut désormais considérer un **système couplé** où l'eau participe activement à l'équilibre acido-basique. La résolution exacte nécessite de prendre en compte **tous les ions simultanément** en résolvant l'ensemble des équations issues des bilans de matière et d'électroneutralité.

Exemple

Exemple : Nous avons un acide Fort (HCl) avec une concentration de $10^{-8,5} \text{ mol/L}$, quelle est le pH de cette solution ?

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log C_A = -\log(10^{-8,5}) = 8,5$$

Ce résultat est contre-intuitif. Il révèle la nécessité de considérer l'autoprotolyse de l'eau, le solvant contribue significativement aux ions H_3O^+ , Les équilibres à considérer sont :



Pour résoudre ce problème, nous devons déterminer les concentrations de trois espèces ioniques : H_3O^+ , OH^- , et Cl^- . La solution exacte requiert un système de trois équations :

$$\text{Bilan de matière :} \quad C_A = [\text{HCl}]_{eq} + [\text{Cl}^-]_{eq} = [\text{Cl}^-]_{eq} \quad \text{car } [\text{HCl}]_{eq} = 0 \quad (1)$$

$$\text{Électroneutralité :} \quad [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} = [\text{OH}^-]_{eq} + [\text{Cl}^-]_{eq} \quad (2)$$

$$\text{Produit ionique :} \quad [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}[\text{OH}^-]_{eq} = 10^{-14} \quad (3)$$

Substitution et résolution

$$\text{De (2) :} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + 10^{-8,5} \quad (4)$$

$$\text{De (3) :} \quad [\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$\text{De (4) : } [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} + 10^{-8,5}$$

Multiplions par $[\text{H}_3\text{O}^+]$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = 10^{-14} + 10^{-8,5} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]$$

Réarrangeons :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 - 10^{-8,5} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] - 10^{-14} = 0$$

Résolution de l'équation quadratique : $ax^2 + bx + c = 0$

— **Discriminant :** $\Delta = b^2 - 4ac = C_A^2 + 4K_e$

— **Solutions :**

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

— **Suivant le signe de Δ :**

- $\Delta > 0$: Deux solutions réelles distinctes
- $\Delta = 0$: Une solution réelle double $x_1 = x_2 = -b/2a$
- $\Delta < 0$: Deux solutions complexes conjuguées

— **Coefficients :** $a = 1$, $b = -10^{-8,5}$, $c = -10^{-14}$

— **Discriminant :** $\Delta = (-10^{-8,5})^2 - 4(1)(-10^{-14}) = 4,00 \times 10^{-14}$

— **Solution positive (physiquement acceptable) :**

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{10^{-8,5} + \sqrt{4,0 \times 10^{-14}}}{2} = 1,016 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$\Rightarrow \text{pH} = -\log(1,016 \times 10^{-7}) \approx 6,99$$

Donc : pH $\approx$ 6,99 Une valeur très cohérente pour HCl avec $C = 10^{-8,5} \text{ mol/L}$

4.2.10.2. Base forte

Ce qui a été dit sur les acides forts s'applique aussi aux bases fortes, lesquelles sont des électrolytes forts qui s'ionisent complètement dans l'eau. Elles comprennent les hydroxydes de métaux alcalins et de certains métaux alcalino-terreux.

Tableau 4.10 Propriétés des bases fortes : pK_b et constante de basicité K_b

Base forte	Acide conjugué	pK _b	K _b
LiOH (hydroxyde de lithium)	Li ⁺ (ion lithium)	-0,36	2,3
NaOH (hydroxyde de sodium)	Na ⁺ (ion sodium)	-0,56	3,6
KOH (hydroxyde de potassium)	K ⁺ (ion potassium)	-0,76	5,8
RbOH (hydroxyde de rubidium)	Rb ⁺ (ion rubidium)	-0,86	7,2
CsOH (hydroxyde de césium)	Cs ⁺ (ion césium)	-0,96	9,1
Ca(OH) ₂ (hydroxyde de calcium)	Ca ²⁺ (ion calcium)	1,37	$4,3 \times 10^{-2}$
Sr(OH) ₂ (hydroxyde de strontium)	Sr ²⁺ (ion strontium)	0,83	0,15
Ba(OH) ₂ (hydroxyde de baryum)	Ba ²⁺ (ion baryum)	0,64	0,23
LiNH ₂ (amidure de lithium)	NH ₃ (ammoniac)	-1,3	20
NaNH ₂ (amidure de sodium)	NH ₃ (ammoniac)	-1,5	32
KNH ₂ (amidure de potassium)	NH ₃ (ammoniac)	-1,7	50

Si la classification des acides forts repose sur leur dissociation complète en solution, les bases fortes obéissent à la même logique avec des caractéristiques spécifiques. Leur réactivité élevée et leur capacité à déprotonner quantitativement les acides faibles en font des réactifs incontournables en chimie préparative et en analyse. Le tableau ci-dessous présente leurs propriétés fondamentales, avant d'aborder un cas particulier illustrant le comportement des amidures métalliques.

Important

Caractéristiques des bases fortes :



- **Dissociation complète :** $K_b \gg 1$ (généralement $K_b > 10$)
- **pK_b négatifs ou proches de 0 :** Typiquement entre -2 et 2
- **Acides conjugués ultra-faibles :** Incapables de donner un proton
- **Force basique :** CsOH > RbOH > KOH > NaOH > LiOH
- **Superbases :** Bases plus fortes que NaOH (ex : amidures, hydrures)

Attention

Attention :

- Les hydroxydes des métaux alcalins sont des bases fortes
- Les hydroxydes des métaux alcalino-terreux sont des bases fortes modérément solubles
- Les pK_b sont donnés pour la première dissociation

Attention : le cas de : $\text{MNH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{M}^+ + \text{NH}_3 + \text{OH}^-$ Mécanisme réactionnel :



Explication : Pourquoi le même acide conjugué ?

- **Base réactive :** L'ion amidure NH_2^- (commun à tous)
- **Cation spectateur :** Li^+ , Na^+ , K^+ (ne participent pas)
- **Acide conjugué :** NH_3 formé par protonation de NH_2^-
- **Force basique :** Dépend peu du cation (sauf effet de solvation)

Remarque : L'exemple des amidures métalliques (MNH_2) illustre parfaitement la notion de cation spectateur : quelle que soit la nature du métal alcalin (Li^+ , Na^+ , K^+), c'est toujours l'ion amidure NH_2^- qui agit comme base réactive, expliquant ainsi la formation systématique d'ammoniac NH_3 comme acide conjugué.

Équation de réaction		B	+	H ₂ O	→	BH ⁺	+	OH ⁻
État initial à t_0	$\alpha = 0$	C_B				0		0
État intermédiaire à t	$0 < \alpha < 1$	$C_B - C_B\alpha$				$C_B\alpha$		$C_B\alpha$
État final à t_{eq}	$\alpha \simeq 1$	0				C_B		C_B

Pour le cas d'une base forte, le calcul du pH est très simple aussi, il suffit d'appliquer l'équation (4.1), à l'équilibre :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = -\log K_e - (-\log C_B) = \text{p}K_e + \log C_B = 14 + \log C_B$$

À retenir

$$\text{pH} = 14 + \log C_B \quad (4.5)$$

Remarque : le pH d'une base forte peut s'exprimer en fonction de pOH :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = -\log K_e - (-\log[\text{OH}^-]) = \text{p}K_e - \text{pOH} = 14 - \text{pOH}$$



Ces équations sont valables si : $C_B \geq 10^{-6,5}$ mol/L, sinon :

Exemple

Exemple : Nous avons une base forte (NaOH) avec une concentration de $C_B = 10^{-8,5}$ mol · L⁻¹, quelle est le pH de cette solution ?

$$\text{pH (approx.)} = 14 + \log[\text{OH}^-] = 14 + \log C_B = 14 + \log(10^{-8,5}) = 5,5$$

Les équilibres à considérer sont :



Les trois espèces ioniques sont : OH^- , H_3O^+ , et Na^+ . La solution exacte requiert un système de trois équations :

$$\text{Bilan de matière :} \quad C_B = [\text{NaOH}]_{eq} + [\text{Na}^+]_{eq} = [\text{Na}^+]_{eq} \quad \text{car } [\text{NaOH}]_{eq} = 0 \quad (1)$$

$$\text{Électroneutralité :} \quad [\text{Na}^+]_{eq} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} = [\text{OH}^-]_{eq} \quad (2)$$

$$\text{Produit ionique :} \quad [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} [\text{OH}^-]_{eq} = K_e = 10^{-14} \quad (3)$$

Substitution et résolution

$$\text{De (2) :} \quad [\text{OH}^-] = [\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = C_B + [\text{H}_3\text{O}^+] \quad (4)$$

$$\text{De (3) :} \quad [\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

En combinant (4) et (3) : $\frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = C_B + [\text{H}_3\text{O}^+]$

Multiplions par $[\text{H}_3\text{O}^+]$:

$$10^{-14} = C_B \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+]^2$$

Réarrangeons :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + C_B \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] - 10^{-14} = 0$$

Solution positive (physiquement acceptable) :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{-C_B + \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{-10^{-8,5} + \sqrt{4,00 \times 10^{-14}}}{2} \approx 9,84 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

$$\Rightarrow \text{pH} = -\log(9,84 \times 10^{-8}) \approx 7,01.$$

Donc : pH = 7,01. Une valeur très cohérente pour NaOH avec $C_B = 10^{-8,5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

4.2.10.3. Acide faible

La [Figure 4.1](#) met en évidence la différence de comportement entre un acide fort (HCl) et un acide faible (HF). Un acide fort, comme HCl, se dissocie totalement dans l'eau : chaque molécule libère son proton facilement, de sorte que la solution ne contient pratiquement que des ions H_3O^+ et Cl^- . On peut dire que l'acide fort "abandonne" tous ses protons d'un seul coup.

À l'inverse, un acide faible, tel que HF, se comporte de façon plus "retenue". En solution aqueuse, seule une partie des molécules se dissocie en ions H_3O^+ et F^- , tandis qu'une fraction reste sous forme non ionisée. Il existe donc un équilibre dynamique entre les trois espèces présentes : HF, H_3O^+ et F^- . On peut dire que l'acide faible hésite : il en libère quelques-uns, mais conserve une partie de ses protons. Cette dissociation partielle est gouvernée par la constante d'équilibre acido-basique K_a . Plus la valeur de cette constante d'acidité est grande, plus l'acide est fort, mais aucun acide faible n'atteint la dissociation complète d'un acide fort.



Figure 4.1 Comparaison de la dissociation d'un acide fort (HCl) et d'un acide faible (HF).

Important

Classification par force des acides :

- **Acides moyennement faibles** ($K_a > 10^{-3}$) : HF, acide chloroacétique
- **Acides faibles typiques** ($10^{-5} < K_a < 10^{-3}$) : Acides carboxyliques, HNO_2
- **Acides très faibles** ($K_a < 10^{-5}$) : HCN, NH_4^+ , phénol
- **Acides polyprotiques** : Possèdent plusieurs constantes d'acidité (K_{a1} , K_{a2} , K_{a3})

Exemple :

Tableau 4.11 Acides faibles courants, leurs bases conjuguées et constantes d'acidité

Acide faible	Base conjuguée	pK _a	K _a
HF (acide fluorhydrique)	F ⁻ (ion fluorure)	3,17	$6,8 \times 10^{-4}$
CH ₃ COOH (acide acétique)	CH ₃ COO ⁻ (ion acétate)	4,76	$1,8 \times 10^{-5}$
HCOOH (acide formique)	HCOO ⁻ (ion formiate)	3,75	$1,8 \times 10^{-4}$
C ₆ H ₅ COOH (acide benzoïque)	C ₆ H ₅ COO ⁻ (ion benzoate)	4,20	$6,3 \times 10^{-5}$
ClCH ₂ COOH (acide chloroacétique)	ClCH ₂ COO ⁻ (ion chloroacétate)	2,87	$1,4 \times 10^{-3}$
H ₂ CO ₃ (acide carbonique)	HCO ₃ ⁻ (ion bicarbonate)	6,35	$4,5 \times 10^{-7}$
	CO ₃ ²⁻ (ion carbonate)	10,33	$4,7 \times 10^{-11}$
H ₂ S (acide sulfhydrique)	HS ⁻ (ion hydrogénosulfure)	7,02	$9,5 \times 10^{-8}$
	S ²⁻ (ion sulfure)	13,9	$1,3 \times 10^{-14}$
H ₃ PO ₄ (acide phosphorique)	H ₂ PO ₄ ⁻ (ion dihydrogénophosphate)	2,16	$6,9 \times 10^{-3}$
	HPO ₄ ²⁻ (ion hydrogénéphosphate)	7,20	$6,3 \times 10^{-8}$
	PO ₄ ³⁻ (ion phosphate)	12,32	$4,8 \times 10^{-13}$
HNO ₂ (acide nitreux)	NO ₂ ⁻ (ion nitrite)	3,35	$4,5 \times 10^{-4}$
HCN (acide cyanhydrique)	CN ⁻ (ion cyanure)	9,21	$6,2 \times 10^{-10}$
HClO (acide hypochloreux)	ClO ⁻ (ion hypochlorite)	7,53	$2,9 \times 10^{-8}$
NH ₄ ⁺ (ion ammonium)	NH ₃ (ammoniac)	9,25	$5,6 \times 10^{-10}$
C ₆ H ₅ OH (phénol)	C ₆ H ₅ O ⁻ (ion phénolate)	9,99	$1,0 \times 10^{-10}$

Voici les étapes de la résolution d'un problème d'ionisation d'un acide faible.

- Étape 1 :** à partir de l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau, identifier les principales espèces à l'équilibre, c'est-à-dire les espèces qui peuvent influencer le pH de la solution.
- Étape 2 :** construire un tableau réactionnel et y exprimer les concentrations à l'équilibre des différentes espèces en fonction de la concentration initiale de l'acide et d'une seule inconnue x qui représente le changement de concentration.
- Étape 3 :** écrire l'expression de la constante d'ionisation de l'acide (K_a) en fonction des concentrations à l'équilibre. Résoudre d'abord à l'aide de la méthode de l'approximation. Si celle-ci n'est pas valable (c'est-à-dire si le degré de dissociation de l'acide est supérieur à 5 %), résoudre avec l'équation quadratique.
- Étape 4 :** ayant trouvé la valeur de x , calculer les concentrations à l'équilibre de toutes les espèces ainsi que le pH de la solution.

Équation de réaction		AH	+	H ₂ O	$\rightleftharpoons$	A ⁻	+	H ₃ O ⁺
État initial à t_0	$\alpha = 0$	C_a				0		0
État intermédiaire à t	$0 < \alpha < 1$	$C_a - C_a\alpha$				$C_a\alpha$		$C_a\alpha$
État final à t_{eq}	$\alpha \ll 1$	$C_a(1 - \alpha) \simeq C_a$				$C_a\alpha$		$C_a\alpha$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \frac{(C_a\alpha)(C_a\alpha)}{C_a(1 - \alpha)} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C_a} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a C_a}$$

À retenir

$$\text{pH} = -\log \sqrt{K_a C_a} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a) \quad (4.6)$$

(33)

Attention

Condition de validité : $C_a \gg K_a$ (soit $\alpha \ll 1$, un Coéf trop petit par rapport à 1 donc négligeable) :

- Si : $\alpha < 0,05$: Approximation excellente
- Si : $0,05 < \alpha < 0,1$: Approximation acceptable

Si non :

- $\alpha > 0,1$: Utiliser la solution exacte

La Solution Exacte :

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{(C_a\alpha)(C_a\alpha)}{C_a(1 - \alpha)} = \frac{C_a^2\alpha^2}{C_a(1 - \alpha)} = \frac{C_a\alpha^2}{1 - \alpha}$$

Donc :

$$K_a = \frac{C_a \alpha^2}{1 - \alpha} \Rightarrow K_a(1 - \alpha) = C_a \alpha^2 \Leftrightarrow K_a - K_a \alpha = C_a \alpha^2 \Leftrightarrow C_a \alpha^2 + K_a \alpha - K_a = 0$$

Cette solution exacte est toujours valable mais nécessite de résoudre une équation du second degré avec α comme inconnu.

$$\alpha = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2C_a}$$

On garde seulement la solution positive car une concentration ne peut pas être négative.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C_a \alpha = C_a \cdot \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2C_a} = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2}$$

Alors :

À retenir

$$\text{pH} = -\log \left(\frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2} \right) \quad (4.7)$$

Cas particulier : La question qui se pose maintenant : si nous avons un $C_a \ll K_a$, quel est le pH de cette solution ? Voici un exemple :

$$C_a = 10^{-8,5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \quad K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) \approx 1,8 \times 10^{-5}, \quad \text{Quel est le pH de cette solution ?}$$

Équation de réaction		$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$
État initial à t_0	$\alpha = 0$	$C_a \quad 0 \quad 0$
État intermédiaire à t	$0 < \alpha < 1$	$C_a - C_a \alpha \quad C_a \alpha \quad C_a \alpha$
État final à t_{eq}	$\alpha = \text{inconnu}$	$C_a(1 - \alpha) \quad C_a \alpha \quad C_a \alpha$

Le taux de dissociation α permet de relier directement la concentration initiale C_a aux concentrations des espèces à l'équilibre :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C_a \alpha, \quad [\text{A}^-] = C_a \alpha, \quad [\text{HA}] = C_a(1 - \alpha).$$

Connaître α est donc essentiel pour calculer le pH et déterminer si l'acide est presque totalement dissocié ($\alpha \approx 1$) ou très faiblement dissocié ($\alpha \ll 1$). Cela guide le choix des approximations dans nos calculs.

Analyse qualitative préalable et Calcul du rapport critique :

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{(C_a \alpha)(C_a \alpha)}{C_a(1 - \alpha)} = \frac{C_a^2 \alpha^2}{C_a(1 - \alpha)} = \frac{C_a \alpha^2}{1 - \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} = \frac{K_a}{C_a}$$

Attention

interprétation physique :

$$\text{Cas d'un acide concentré } (C_a \gg K_a) : \quad \frac{K_a}{C_a} \ll 1 \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} \ll 1 \Rightarrow \alpha \ll 1$$

$$\text{Cas d'un acide ultra-dilué } (C_a \ll K_a) : \quad \frac{K_a}{C_a} \gg 1 \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} \gg 1 \Rightarrow \alpha \approx 1$$

Règle pratique : Pour la valeur $\alpha = 0,1$

$$\frac{K_a}{C_a} = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} = \frac{0,1^2}{0,9} \approx 0,01$$

$$\text{Si le rapport } \frac{K_a}{C_a} < 0,01 \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} \ll 1 \Rightarrow \alpha < 0,1 \quad (\text{approximation valide})$$

$$\text{Si le rapport } \frac{K_a}{C_a} > 10 \Rightarrow \frac{\alpha^2}{1 - \alpha} \gg 1 \Rightarrow \alpha \approx 1 \quad (\text{acide totalement dissocié}).$$

Estimation du taux de dissociation α : À partir de la relation générale pour un acide faible :

$$K_a = \frac{C_a \alpha^2}{1 - \alpha}$$

On obtient :

$$\frac{K_a}{C_a} = \frac{1.8 \times 10^{-5}}{10^{-8.5}} = 1.8 \times 10^{3.5} \approx 1.8 \times 3162 \approx 5692$$

Réolvons l'équation du second degré :

$$\alpha^2 = 5692(1 - \alpha) \Rightarrow \alpha^2 + 5692\alpha - 5692 = 0$$

$$\Delta = 5692^2 + 4 \times 5692 = 32\,423\,552$$


$$\sqrt{\Delta} \approx 5694,17$$

$$\alpha = \frac{-5692 + 5694,17}{2} \approx 1,085$$

Attention : Ce calcul donne $\alpha > 1$, ce qui est **physiquement impossible**. Cela confirme que l'approximation usuelle (négligeant l'autoprotolyse) est **invalid**e dans ce régime de concentration. Donc dans ce cas de figure il ne faut surtout pas négliger l'autoprotolyse de l'eau.

Résolution exacte avec autoprotolyse de l'eau


a) Équilibre acide-base :



b) Conservation de la matière :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] + [\text{CH}_3\text{COO}^-] = C_a \quad (2)$$

c) Autoprotolyse de l'eau :



d) Électroneutralité :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{CH}_3\text{COO}^-] \quad (4)$$

De (1) et (2), exprimons $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$:

$$\begin{aligned} K_a &= \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{C_a - [\text{CH}_3\text{COO}^-]} \\ K_a(C_a - [\text{CH}_3\text{COO}^-]) &= [\text{H}_3\text{O}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-] \\ K_a C_a &= [\text{CH}_3\text{COO}^-]([\text{H}_3\text{O}^+] + K_a) \\ \Rightarrow [\text{CH}_3\text{COO}^-] &= \frac{K_a C_a}{[\text{H}_3\text{O}^+] + K_a} \\ \text{De (3) : } [\text{OH}^-] &= \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \end{aligned} \quad (5)$$

Substituons dans (4) :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} + \frac{K_a C_a}{[\text{H}_3\text{O}^+] + K_a}$$

Posons $x = [\text{H}_3\text{O}^+]$:

$$x = \frac{K_e}{x} + \frac{K_a C_a}{x + K_a} \quad (6)$$

Approximation justifiée : Puisque $K_a = 1,8 \cdot 10^{-5}$ mol/L et $x \approx 10^{-7}$ mol/L, on a :

$$K_a \gg x \Rightarrow x + K_a \approx K_a$$

L'équation (6) devient :

$$\begin{aligned} x &\approx \frac{K_e}{x} + \frac{K_a C_a}{K_a} = \frac{K_e}{x} + C_a \\ x^2 &\approx K_e + C_a x \Rightarrow x^2 - C_a x - K_e = 0 \end{aligned} \quad (7)$$

Résolution numérique :

Avec $C_a = 3,1623 \cdot 10^{-9}$ mol/L et $K_e = 10^{-14}$:

$$x = \frac{C_a + \sqrt{C_a^2 + 4K_e}}{2} = \frac{3,1623 \cdot 10^{-9} + \sqrt{(3,1623 \cdot 10^{-9})^2 + 4 \times 10^{-14}}}{2}$$

Calcul détaillé :

$$C_a^2 = (3,1623 \times 10^{-9})^2 = 1,00 \times 10^{-17}$$

$$4K_e = 4 \times 10^{-14} = 4,00 \times 10^{-14}$$

$$C_a^2 + 4K_e \approx 4,00 \times 10^{-14}$$

$$\sqrt{C_a^2 + 4K_e} \approx \sqrt{4,00 \times 10^{-14}} \approx 2,00 \times 10^{-7}$$

$$x = \frac{3,1623 \cdot 10^{-9} + 2,00 \cdot 10^{-7}}{2} = 1,0158 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log(1,0158 \times 10^{-7}) \approx 6,993$$

À retenir

$$\text{pH} = -\log\left(\frac{C_a + \sqrt{C_a^2 + 4K_e}}{2}\right) \quad (4.8)$$

Vérification le taux de dissociation réel :

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{K_a C_a}{x + K_a} = \frac{(1,8 \cdot 10^{-5})(3,1623 \cdot 10^{-9})}{1,0158 \cdot 10^{-7} + 1,8 \cdot 10^{-5}} = \frac{5,6921 \cdot 10^{-14}}{1,8102 \cdot 10^{-5}} \approx 3,1446 \cdot 10^{-9} \text{ mol/L}$$

$$\alpha = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{C_a} = \frac{3,1446 \cdot 10^{-9}}{3,1623 \cdot 10^{-9}} \approx 0,994$$

Contributions relatives en ion Hydronium dans cette solution :

- Contribution de l'acide : $3,14 \cdot 10^{-9} \text{ mol/L}$
- Contribution de l'eau : $x - [\text{CH}_3\text{COO}^-] \approx 9,84 \cdot 10^{-8} \text{ mol/L}$
- L'eau contribue **31 fois plus** de H_3O^+ que l'acide, donc $\sqrt{K_e} \gtrsim \sqrt{K_a C_a} \Rightarrow K_e \gtrsim K_a C_a$

Coclusion :

L'étude des acides faibles révèle toute la richesse et la complexité des équilibres acido-basiques en solution. Contrairement aux acides forts dont le comportement est trivial, les acides faibles exigent une analyse nuancée qui prend en compte la constante d'acidité K_a , la concentration initiale C_a , et dans les cas limites, l'autoprotolyse de l'eau elle-même. Le paramètre clé qu'est le taux de dissociation α permet de quantifier précisément le degré d'ionisation et de choisir la méthode de résolution appropriée : approximation des faibles dissociations lorsque $\alpha \ll 1$, résolution de l'équation quadratique pour les cas intermédiaires, ou prise en compte obligatoire de l'autoprotolyse lorsque $C_a \ll K_a$. L'exemple de l'acide acétique ultra-dilué ($C_a = 10^{-8,5} \text{ mol/L}$) illustre parfaitement cette situation limite où l'acide, bien que faible par nature, se comporte comme s'il était totalement dissocié, la contribution de l'eau devenant alors prépondérante. Cette progression méthodologique, constitue la base nécessaire pour aborder sereinement les systèmes tampons et les applications biologiques qui seront développées dans les sections suivantes.

4.2.10.4. Base faible

Les bases faibles sont des électrolytes faibles qui ne s'ionisent que partiellement dans l'eau. À l'équilibre, une solution aqueuse de base faible contient un mélange de base non ionisée, d'ions OH^- et des molécules de l'acide conjugué de la base. Les forces des bases faibles varient considérablement selon leur degré d'ionisation.^{(33),(30)} Cette ionisation limitée est régie par la constante d'équilibre .

Attention

Remarques importantes :

- Les anions dérivés d'acides faibles sont des bases faibles⁽⁶⁾
- Plus l'acide conjugué est fort (K_a grand), plus la base est faible (K_b petit)
- La relation : $K_a \times K_b = K_e = 10^{-14}$ à 25°C ⁽³¹⁾
- Exemple : Pour $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$, donc $K_b = \frac{10^{-14}}{1,8 \times 10^{-5}} = 5,6 \times 10^{-10}$

Exemple :

Tableau 4.12 Constantes de basicité (K_b) des bases faibles et de leurs acides conjugués à 25 °C .

Base	Acide conjugué	pK _b	K _b
NH ₃ (ammoniac)	NH ₄ ⁺ (ion ammonium)	4,75	$1,8 \times 10^{-5}$
CH ₃ NH ₂ (méthylamine)	CH ₃ NH ₃ ⁺ (ion méthylammonium)	3,36	$4,4 \times 10^{-4}$
C ₂ H ₅ NH ₂ (éthylamine)	C ₂ H ₅ NH ₃ ⁺ (ion éthylammonium)	3,25	$5,6 \times 10^{-4}$
C ₅ H ₅ N (pyridine)	C ₅ H ₅ NH ⁺ (ion pyridinium)	8,75	$1,8 \times 10^{-9}$
C ₆ H ₅ NH ₂ (aniline)	C ₆ H ₅ NH ₃ ⁺ (ion phénylammonium)	9,38	$4,2 \times 10^{-10}$
CO ₃ ²⁻ (ion carbonate)	HCO ₃ ⁻ (ion bicarbonate)	3,67	$2,1 \times 10^{-4}$
HCO ₃ ⁻ (ion bicarbonate)	H ₂ CO ₃ (acide carbonique)	7,65	$2,2 \times 10^{-8}$
HPO ₄ ²⁻ (ion hydrogénophosphate)	H ₂ PO ₄ ⁻ (ion dihydrogénophosphate)	6,80	$1,6 \times 10^{-7}$
PO ₄ ³⁻ (ion phosphate)	HPO ₄ ²⁻ (ion hydrogénophosphate)	1,68	$2,1 \times 10^{-2}$
F ⁻ (ion fluorure)	HF (acide fluorhydrique)	10,32	$4,8 \times 10^{-11}$
CH ₃ COO ⁻ (ion acétate)	CH ₃ COOH (acide acétique)	9,25	$5,6 \times 10^{-10}$
CN ⁻ (ion cyanure)	HCN (acide cyanhydrique)	4,79	$1,6 \times 10^{-5}$
NO ₂ ⁻ (ion nitrite)	HNO ₂ (acide nitreux)	10,65	$2,2 \times 10^{-11}$
OH ⁻ (ion hydroxyde)	H ₂ O (eau)	-1,74	$5,5 \times 10^1$

Les étapes de la résolution d'un problème d'ionisation d'une base faible sont les mêmes que pour un acide faible, il faut juste utiliser la constante de basicité K_b c'est plus appropriée, sinon avec le K_a ça reste acceptable. N'oublier pas le tableau d'avancement :

Équation de réaction		B	+ H ₂ O	⇌	BH ⁺	+ OH ⁻
État initial à t_0	$\alpha = 0$	C_b			0	0
État intermédiaire à t	$0 < \alpha < 1$	$C_b - C_b\alpha$			$C_b\alpha$	$C_b\alpha$
État final à t_{eq}	$\alpha \ll 1$	$C_b(1 - \alpha) \simeq C_b$			$C_b\alpha$	$C_b\alpha$

La première approche que nous pouvons faire c'est de négliger le Coefficient de dissociation α et ça donne cette équation :

$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]} = \frac{(C_b\alpha)(C_b\alpha)}{C_b(1 - \alpha)} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{C_b} \Rightarrow [\text{OH}^-] = \sqrt{K_b C_b}$$

$$\text{pOH} = -\log \sqrt{K_b C_b} = \frac{1}{2}(\text{p}K_b - \log C_b)$$

À retenir

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - \frac{1}{2}(\text{p}K_b - \log C_b) \quad (4.9)$$

On peut exprimer le pH d'une base faible avec le K_a :

$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]} = \frac{[\text{OH}^-]^2}{C_b} \Leftrightarrow \frac{K_e}{K_a} = \frac{K_e^2}{[\text{H}_3\text{O}^+]^2 C_b} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]^2 = \frac{K_e K_a}{C_b} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{\frac{K_e K_a}{C_b}}$$

$$\text{pH} = -\frac{1}{2} \log \left(\frac{K_e K_a}{C_b} \right) = \frac{1}{2} (14 + \text{p}K_a + \log C_b)$$

À retenir

$$\text{pH} = -\frac{1}{2} \log \left(\frac{K_e K_a}{C_b} \right) = \frac{1}{2} (14 + \text{p}K_a + \log C_b) \quad (4.10)$$

Attention

Condition de validité : $C_b \gg K_b$ (soit $\alpha \ll 1$, un coefficient trop petit par rapport à 1 donc négligeable)⁽³²⁾ :

- Si : $\alpha < 0,05$: Approximation excellente
- Si : $0,05 < \alpha < 0,1$: Approximation acceptable

Si non :

- $\alpha > 0,1$: Utiliser la solution exacte^{(32),(6)}

La Solution Exacte :

$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]} = \frac{(C_b\alpha)(C_b\alpha)}{C_b(1-\alpha)} = \frac{C_b^2\alpha^2}{C_b(1-\alpha)} = \frac{C_b\alpha^2}{1-\alpha}$$

Donc :

$$K_b = \frac{C_b\alpha^2}{1-\alpha} \Rightarrow K_b(1-\alpha) = C_b\alpha^2 \Leftrightarrow K_b - K_b\alpha = C_b\alpha^2 \Leftrightarrow C_b\alpha^2 + K_b\alpha - K_b = 0$$

Cette solution exacte est toujours valable mais nécessite de résoudre une équation du second degré avec α comme inconnu.

$$\alpha = \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_bC_b}}{2C_b}$$

On garde seulement la solution positive car une concentration ne peut pas être négative.

$$[\text{OH}^-] = C_b\alpha = C_b \cdot \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_bC_b}}{2C_b} = \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_bC_b}}{2} \quad (11)$$

$$\text{pOH} = -\log\left(\frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_bC_b}}{2}\right)$$

Alors :

À retenir

$$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_bC_b}}{2}\right) \quad (4.11)$$

Cette solution exacte peut s'écrire en fonction de K_a je met ici la démonstration :

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{10^{-14}}{K_a} = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]} = \frac{(C_b\alpha)(C_b\alpha)}{C_b(1-\alpha)} = \frac{C_b^2\alpha^2}{C_b(1-\alpha)} = \frac{C_b\alpha^2}{1-\alpha}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{C_b\alpha^2}{1-\alpha} &= \frac{10^{-14}}{K_a} \Rightarrow K_a C_b \alpha^2 = 10^{-14}(1-\alpha) \Leftrightarrow K_a C_b \alpha^2 = 10^{-14} - 10^{-14}\alpha \Leftrightarrow \\ &K_a C_b \alpha^2 + 10^{-14}\alpha - 10^{-14} = 0 \\ &K_a C_b \alpha^2 + K_e \alpha - K_e = 0 \end{aligned}$$

Cette solution est toujours valable, il résoudre une équation du second degré avec α comme inconnu.

$$\alpha = \frac{-K_e + \sqrt{(K_e)^2 + 4 \times K_e K_a C_b}}{2K_a C_b}$$

On garde seulement la solution positive car une concentration ne peut pas être négative.

$$[\text{OH}^-] = C_b\alpha = C_b \cdot \frac{-K_e + \sqrt{K_e^2 + 4 \times K_e K_a C_b}}{2K_a C_b} = \frac{-K_e + \sqrt{K_e^2 + 4 \times K_e K_a C_b}}{2K_a}$$

$$\text{pOH} = -\log\left(\frac{-K_e + \sqrt{K_e^2 + 4 \times K_e K_a C_b}}{2K_a}\right)$$

Alors :

À retenir

$$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{-K_e + \sqrt{K_e^2 + 4K_e K_a C_b}}{2K_a}\right) \quad (4.12)$$

Sinon on fait une substitution direct de l'équation (11) : En posant $K_b = 10^{-14}/K_a$ dans la solution générale :

$$\begin{aligned} [\text{OH}^-] &= \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_bC_b}}{2} = \frac{-\frac{10^{-14}}{K_a} + \sqrt{\left(\frac{10^{-14}}{K_a}\right)^2 + 4 \cdot \frac{10^{-14}}{K_a} \cdot C_b}}{2} \\ &= \frac{-10^{-14} + \sqrt{10^{-28} + 4 \times 10^{-14} K_a C_b}}{2K_a} \end{aligned}$$

$$\text{pH} = 14 + \log \left(\frac{-K_e + \sqrt{K_e^2 + 4 \times K_e K_a C_b}}{2K_a} \right)$$

Cas particulier celui de forte dilution : La question qui se pose maintenant, si nous avons une solution avec : $C_b = 10^{-8.5} \text{ M}$, $K_b(\text{NH}_3) \approx 1,8 \times 10^{-5}$. Quel est le pH de cette solution ? .

Tout dépend de la valeur de K_b . La concentration de base (C_b) est du même ordre que la contribution d'eau pure $[\text{OH}^-]_{\text{eau}} = 10^{-7} \text{ M}$, dans ce cas de figure il ne faut pas négliger l'eau et ce qu'il rapporte à la solution (l'influence de l'eau sur le pH n'est pas négligeable). dans le cas générale voici comment on décide rigoureusement.

Procédure simple et sûre

- a) Calculer x , solution positive de l'équation exacte (néglige l'autoprotolyse de l'eau) :

$$x = \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_b C_b}}{2} \quad (x \approx [\text{OH}^-] \text{ issue de la base})$$

- b) Calculer le degré de dissociation : $\alpha = \frac{x}{C_b}$

- c) Interprétation :

- Si $\alpha < 0.1$: l'approximation $\alpha \ll 1$ est acceptable.
- Si $\alpha > 0.1$: il faut utiliser la solution exacte (équation quadratique).


- d) Comparer x à la contribution de l'eau (10^{-7} M) :

- Si $x \ll 10^{-7}$: l'eau domine et le pH sera proche de 7 (la petite contribution de la base ne change presque rien).
- Si $x \gtrsim 10^{-7}$: la base influence nettement le pH.

En résumé : Il faut calculer x avec la formule quadratique, puis évaluer α et comparer x à 10^{-7} . dans cette section nous allons traiter les deux cas et voir la différence.

Démonstration du pH pour une base faible très diluée (l'ammoniac) :

Considérons l'ammoniac NH_3 en solution aqueuse :



- Concentration initiale : $C_b = 10^{-8.5} \text{ M} \approx 3,16 \times 10^{-9} \text{ M}$

- Constante de basicité : $K_b(\text{NH}_3) \approx 1,8 \times 10^{-5}$

- Degré de dissociation : $\alpha = \frac{[\text{OH}^-]}{C_b}$

Équation de réaction		NH_3	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-
État initial à t_0	$\alpha = 0$	C_b				0		0
État intermédiaire à t	$0 < \alpha < 1$	$C_b - C_b\alpha$				$C_b\alpha$		$C_b\alpha$
État final à t_{eq}	$\alpha \ll 1$	$C_b(1 - \alpha) \simeq C_b$				$C_b\alpha$		$C_b\alpha$

- 1. Équation de dissociation** La constante de basicité est :

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \approx \frac{(C_b\alpha)(C_b\alpha)}{C_b(1 - \alpha)} = \frac{C_b^2\alpha^2}{C_b} \approx C_b\alpha^2$$

On obtient :

$$\alpha \approx \sqrt{\frac{K_b}{C_b}} \implies [\text{OH}^-] = C_b\alpha \approx \sqrt{K_b C_b}.$$

2. Expression du pOH et du pH

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log \sqrt{K_b C_b} = -\frac{1}{2} \log(K_b C_b)$$

$$\text{pOH} = \frac{1}{2} (\text{p}K_b - \log C_b) = 6,62$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - \frac{1}{2} (\text{p}K_b - \log_{10} C_b) = 7,38 \quad \text{Physiquement incorrect}$$

3. Remarque : Pour une concentration très faible ($C_b \ll 10^{-7} \text{ M}$), la contribution de l'eau à la concentration en OH^- devient dominante. Dans ce cas, le pH reste très proche de 7, et l'approximation $\alpha \ll 1$ n'est pas appropriée (elle est

fausse).

Équation de réaction		NH_3	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-
État initial à t_0	$\alpha = 0$	C_b				0		0
État intermédiaire à t	$0 < \alpha < 1$	$C_b - C_b\alpha$				$C_b\alpha$		$C_b\alpha$
État final à t_{eq}	$\alpha > 0,1$	$C_b(1 - \alpha)$				$C_b\alpha$		$C_b\alpha$

1) Approximation usuelle (on néglige l'autoprotolyse de l'eau) :

En posant $[\text{OH}^-] = C_b\alpha = y$ et en négligeant K_e ,

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{y^2}{C_b - y} \implies y^2 + K_b y - K_b C_b = 0,$$

d'où la solution positive

$$y = \frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_b C_b}}{2} \approx 3,1617 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pOH} = -\log(3,1617 \times 10^{-9}) \approx 8,5 \implies \text{pH} = 14 - 8,5 = 5,5$$

Attention


Pourquoi pH = 5,50 est physiquement impossible ?

- À pH = 5,50, $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 3,16 \times 10^{-9} \text{ M}$
- Cette concentration vient **uniquement** de l'ammoniac
- Mais l'eau pure à 25 C apporte déjà $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7} \text{ M}$
- L'ammoniac, étant une **base**, ne peut pas **acidifier** la solution !


Remarque : ce résultat (pH = 5,50) est contre-intuitif, il correspond à la prise en compte **seule** de la dissociation de la base sans l'autoprotolyse de l'eau, pour des solutions aussi diluées il faut impérativement tenir compte de K_e .

2) Solution exacte (on tient compte de l'autoprotolyse de l'eau K_e) : L'ammoniac est une base faible, mais ici $C_b \ll K_b$, ce qui signifie qu'il est très dilué. Dans ce cas, le pH est principalement influencé par l'eau, mais la base apporte une légère contribution.

a) **Équilibres à considérer sont :**



Et :



b) **Bilan des espèces :**

- Conservation de la matière : $[\text{NH}_3]_{eq} + [\text{NH}_4^+]_{eq} = [\text{NH}_3]_0 = C_b$ (2)
- Électroneutralité : $[\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$

c) **Approximation :** Comme C_b est très faible, on s'attend à ce que le pH soit proche de 7.

$$\text{D'après l'électroneutralité : } [\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] \quad (3)$$

Or, $[\text{NH}_4^+]$ peut être exprimé en fonction de K_b et C_b . Pour une base faible très diluée, on utilise :

$$[\text{NH}_4^+] \approx \frac{K_b C_b}{K_b + [\text{OH}^-]} \quad (4)$$

D'où vient cette équation (4) ?

$$\begin{aligned} \text{Avec (1) et (2) on obtient : } K_b &= \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{C_b - [\text{NH}_4^+]} \\ K_b(C_b - [\text{NH}_4^+]) &= [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-] \\ K_b C_b - K_b [\text{NH}_4^+] &= [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-] \\ K_b C_b &= [\text{NH}_4^+]([\text{OH}^-] + K_b) \end{aligned}$$

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{K_b C_b}{[\text{OH}^-] + K_b}$$

Mais comme C_b est très petit et $[\text{OH}^-] \approx 10^{-7}$, on a $K_b \gg [\text{OH}^-]$ (car $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$ et $[\text{OH}^-] \approx 10^{-7}$), donc :

$$[\text{NH}_4^+] \approx \frac{K_b C_b}{K_b} = C_b$$

Ce qui n'est pas tout à fait exact car $[\text{OH}^-]$ n'est pas négligeable devant K_b . En fait, il faut résoudre exactement.

d) **Méthode exacte de résolution** : De l'électroneutralité avec une substitution (4) dans la (3) :

$$[\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$$

$$\frac{K_b C_b}{[\text{OH}^-] + K_b} + \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = [\text{OH}^-]$$

On pose $[\text{OH}^-] = y$, et on résout :

$$y = \frac{K_b C_b}{y + K_b} + \frac{K_e}{y}$$

Comme $K_b \gg y$ (car $y \approx 10^{-7}$, $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$), on approxime $y + K_b \approx K_b$, donc :

$$y \approx \frac{K_b C_b}{K_b} + \frac{K_e}{y} = C_b + \frac{K_e}{y}$$

$$y \approx C_b + \frac{K_e}{y}$$

$$y^2 \approx C_b y + K_e$$

$$y^2 - C_b y - K_e = 0$$

C'est une équation du second degré : $y^2 - C_b y - K_e = 0$ Avec $C_b = 3,1623 \times 10^{-9}$, $K_e = 10^{-14}$.
Résolvons :

$$y = \frac{C_b + \sqrt{C_b^2 + 4K_e}}{2} = 1,0158 \times 10^{-7}$$

Ainsi, $[\text{OH}^-] \approx 1,0158 \times 10^{-7} \text{ M}$, donc $\text{pOH} = -\log(1,0158 \times 10^{-7}) \approx 6,993$.

$$\text{pH} = 14 - 6,993 = 7,007$$

À retenir

$$\text{pH} = 14 + \log \left(\frac{C_b + \sqrt{C_b^2 + 4K_e}}{2} \right) \quad (4.13)$$

Le pH est très légèrement supérieur à 7 en raison de la présence de la base faible.

$$\text{pH} \approx 7,007$$

Attention

Remarques et conditions pratiques :

- L'approximation quadratique (sans K_e) donne ici $\text{pH} \approx 5,50$, manifestement incorrecte physiquement : l'eau domine à ces dilutions et rend la solution pratiquement neutre.
- Pour $C_b \lesssim 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ il faut toujours résoudre la cubique (ou inclure K_e) pour obtenir un résultat fiable.
- Si $C_b \gtrsim 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, la quadratique suffit généralement.

On trouve aussi des fois les démonstration avec le K_a :

1) Approximation usuelle (on néglige l'autoprotolyse de l'eau) :

En posant $[\text{OH}^-] = C_b \alpha = y$ et en négligeant K_e ,

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{10^{-14}}{K_a} = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{y^2}{C_b - y}$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{C_b - y} = \frac{K_e}{K_a} \Rightarrow K_a y^2 = K_e (C_b - y)$$

$$K_a y^2 + K_e y - K_e C_b = 0,$$

d'où la solution positive

$$y = \frac{-K_e + \sqrt{K_e^2 + 4K_e K_a C_b}}{2K_a}$$


Substitution numérique avec $K_a(\text{NH}_4^+) = 5,56 \times 10^{-10}$:

$$y \approx 3,1617 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow \text{pOH} = -\log y \approx 8,5 \Rightarrow \text{pH} = 14 - 8,5 = 5,5$$


Remarque : ce résultat ($\text{pH} = 5,50$) est contre-intuitif, il correspond à la prise en compte **seule** de la dissociation de la base sans l'autoprotolyse de l'eau ; pour des solutions aussi diluées il faut impérativement tenir compte de K_e .

2) Solution exacte (on tient compte de l'autoprotolyse de l'eau K_e) : L'ammoniac est une base faible, mais ici $C_b \ll K_b$, ce qui signifie qu'il est très dilué. Dans ce cas, le pH est principalement influencé par l'eau, mais la base apporte une légère contribution.

a) **Équilibres à considérer :**



Et :



b) **Bilan des espèces :**

- Conservation de la matière : $[\text{NH}_3]_{eq} + [\text{NH}_4^+]_{eq} = C_b$
- Électroneutralité : $[\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$

c) **Approximation :** Comme C_b est très faible, on s'attend à ce que le pH soit proche de 7.

$$\text{D'après l'électroneutralité : } [\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] \quad (3)$$

Or, $[\text{NH}_4^+]$ peut être exprimé en fonction de K_a et C_b . Pour une base faible très diluée :

$$[\text{NH}_4^+] \approx \frac{K_b C_b}{K_b + [\text{OH}^-]} = \frac{\frac{K_e}{K_a} C_b}{\frac{K_e}{K_a} + [\text{OH}^-]} = \frac{K_e C_b}{K_e + K_a [\text{OH}^-]} \quad (4)$$

d) **Méthode exacte :** De l'électroneutralité avec substitution de (4) dans (3) :

$$[\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$$

$$\frac{K_e C_b}{K_e + K_a y} + \frac{K_e}{y} = y$$

Comme $K_a = 5,56 \times 10^{-10}$ et $y \approx 10^{-7}$, on a $K_a y \approx 5,56 \times 10^{-17} \ll 10^{-14}$, donc :

$$\frac{10^{-14} C_b}{K_e} + \frac{K_e}{y} \approx y$$

$$y^2 - C_b y - K_e = 0$$

Résolution :

$$y = \frac{C_b + \sqrt{C_b^2 + 4K_e}}{2} = 1,0158 \times 10^{-7}$$

Ainsi, $[\text{OH}^-] \approx 1,0158 \times 10^{-7} \text{ M}$, donc $\text{pOH} = -\log(1,0158 \times 10^{-7}) \approx 6,993$.

$$\text{pH} = 14 - 6,993 = 7,007$$

Le pH est très légèrement supérieur à 7 en raison de la présence de la base faible.

$$\boxed{\text{pH} \approx 7,007}$$

Pour les plus curieux : approche mathématique détaillée :

a) **Bilan des espèces :**

- **Conservation de la matière :** $[\text{NH}_3]_{eq} + [\text{NH}_4^+]_{eq} = [\text{NH}_3]_0 = C_b$
- **Électroneutralité :** $[\text{NH}_4^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$

b) **Approximation et développement :** Comme C_b est très faible, on s'attend à ce que le pH soit proche de 7.

D'après l'électroneutralité :

$$[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] - \frac{K_e}{[\text{OH}^-]}$$

D'après la conservation de la matière :

$$[\text{NH}_3]_{eq} = C_b - [\text{NH}_4^+]_{eq} = C_b - \left([\text{OH}^-] - \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} \right)$$

Expression de K_b en fonction de $[\text{OH}^-]$:

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{\left([\text{OH}^-] - \frac{K_e}{[\text{OH}^-]}\right)[\text{OH}^-]}{C_b - [\text{OH}^-] + \frac{K_e}{[\text{OH}^-]}} = \frac{[\text{OH}^-]([\text{OH}^-]^2 - K_e)}{C_b[\text{OH}^-] - [\text{OH}^-]^2 + K_e}$$

Équation cubique finale :

$$\begin{aligned} K_b(C_b[\text{OH}^-] - [\text{OH}^-]^2 + K_e) &= [\text{OH}^-]([\text{OH}^-]^2 - K_e) \\ K_b C_b [\text{OH}^-] - K_b [\text{OH}^-]^2 + K_b K_e &= [\text{OH}^-]^3 - K_e [\text{OH}^-] \\ [\text{OH}^-]^3 + K_b [\text{OH}^-]^2 - (K_b C_b + K_e)[\text{OH}^-] - K_b K_e &= 0 \end{aligned}$$

Pour une base faible très diluée, la concentration en ions OH^- est solution de l'équation cubique⁽³¹⁾ :

$$[\text{OH}^-]^3 + K_b [\text{OH}^-]^2 - (K_b C_b + K_e)[\text{OH}^-] - K_b K_e = 0$$

Résolution approchée :

L'équation cubique peut être simplifiée en négligeant les termes en $[\text{OH}^-]^3$ et $[\text{OH}^-]^2$ car $[\text{OH}^-]$ est petit pour une base faible diluée.

On obtient alors :

$$-(K_b C_b + K_e)[\text{OH}^-] - K_b K_e \approx 0$$

Soit :

$$[\text{OH}^-]^2 = K_b C_b + K_e$$

D'où la solution :

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b C_b + K_e}$$

$$\text{pH} = 14 + \log(\sqrt{1,8 \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-8,5} + 10^{-14}}) = 7,5$$

Cas particulier des solutions très diluées

Lorsque les solutions acides ou basiques sont extrêmement diluées ($C < 10^{-6}$ M), l'autoprotolyse de l'eau devient significative^{(31),(34)} et ne peut plus être négligée. Le pH se rapproche légèrement de 7. Dans les solutions très diluées, l'eau n'est plus un simple solvant mais il participe activement à l'équilibre acido-basique. Son influence devient prépondérante lorsque les concentrations deviennent comparables à 10^{-7} M.

La logique des calculs de pH

En chimie acido-basique, une vérité fondamentale émerge : toute solution aqueuse contient un **dialogue constant** entre les espèces acides et basiques. Ce dialogue suit des règles précises que nous avons explorées :

- **Deux grandes familles** s'opposent et se complètent : les **acides** (donneurs de protons) et les **bases** (accepteurs de protons)
- **Deux personnalités** caractérisent chaque famille : les **forts** qui s'engagent complètement dans la réaction, et les **faibles** qui hésitent et établissent un équilibre délicat
- **Deux facteurs maîtres** déterminent le pH final :
 - La **quantité** présente (la concentration C) : plus on met d'acide ou de base, plus l'effet est marqué
 - La **force** intrinsèque (K_a ou K_b) : capacité naturelle à libérer ou capturer des protons

La beauté de ce système réside dans son **équilibre dynamique** : quand un acide faible est très concentré, il peut influencer le pH presque comme un acide fort. À l'inverse, un acide fort très dilué se rapproche du pH de l'eau pure.

Cette compréhension nous permet de **prédire** et **calculer** le pH dans des situations variées, de la solution ultra-acide à la solution ultra-basique, en passant par toutes les nuances intermédiaires. Chaque calcul de pH raconte ainsi l'histoire de cet équilibre subtil entre concentration et force, entre engagement total et hésitation mesurée.

Pour mieux cerner une problématique et trouver le pH je vous présente la règle d'or :

- a) **Je choisis mon camp** : **Acide** ou **Base** ?
- b) **Je choisis mon arme** : **Fort** (simple) ou **Faible** (calcul) ?
- c) **Je vérifie la concentration** : C'est **Normal** ou **Très dilué** ? **L'eau intervient** (cherche le terme K_e ou $\sqrt{\dots + K_e}$).

Le tableau ci-dessous résume les équations principales pour le calcul du pH des solutions acides et basiques. Les formules sont choisies en fonction du type de soluté et de son degré de dissociation α ainsi les cas de forte dilution.

Note : Pour les bases faibles, les deux formules dans chaque cas sont mathématiquement équivalentes. La première utilise la constante de basicité K_b , tandis que la seconde utilise la constante d'acidité K_a .

Tableau 4.13 Formules de calcul du pH en solution aqueuse (à 25 °C).

Type de solution	Conditions	Équation du pH (astuce mnémotechnique)
Acide fort	$\alpha = 1$	$\text{pH} = -\log C_A$ (Fort = Facile)
Base forte		$\text{pH} = 14 + \log C_B$ (Base = Bonus +14)
Acide faible	$\alpha < 0,1$	$\text{pH} = \frac{1}{2}\left(\text{p}K_a - \log C_a\right)$ (faible = demi-formule)
Base faible		$\text{pH} = \frac{1}{2}\left(14 + \text{p}K_a + \log C_b\right)$
		$\text{pH} = 14 - \frac{1}{2}\left(\text{p}K_b - \log C_b\right)$
Acide faible	$\alpha > 0,1$	$\text{pH} = -\log\left(\frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a}}{2}\right)$
Base faible		$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{-K_e + \sqrt{K_e^2 + 4K_e K_a C_b}}{2K_a}\right)$
		$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_b C_b}}{2}\right)$
Acide fort ultra-dilué	$C < 10^{-6}$	$\text{pH} = -\log\left(\frac{C_a + \sqrt{C_a^2 + 4K_e}}{2}\right)$
Base forte ultra-diluée		$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{C_b + \sqrt{C_b^2 + 4K_e}}{2}\right)$
Acide faible ultra-dilué	$C_a \ll K_a$	$\text{pH} = -\frac{1}{2}\log\left(K_a C_a + K_e\right)$
	solution générale	$\text{pH} = -\log\left(\frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C_a + 4K_e}}{2}\right)$
Base faible ultra-diluée	$C_b \ll K_b$	$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2}\log\left(K_b C_b + K_e\right)$
	solution générale	$\text{pH} = 14 + \log\left(\frac{-K_b + \sqrt{K_b^2 + 4K_b C_b + 4K_e}}{2}\right)$

Conclusion.

Le calcul du pH en solution aqueuse repose essentiellement sur le choix du **bon niveau d'approximation** en fonction de la nature de l'électrolyte (fort ou faible), de la concentration analytique C et du degré de dissociation α . Pour un acide ou une base forte ($\alpha \simeq 1$), le pH se déduit directement de la concentration, tandis que pour un acide ou une base faible on relie $[\text{H}^+]$ (ou $[\text{OH}^-]$) à K_a (ou K_b) : l'approximation « faible dissociation » est acceptable tant que la variation de concentration reste inférieure à quelques pourcents (règle des 5%), sinon il faut résoudre l'équation exacte (quadratique). Enfin, dans le cas des solutions **très diluées** (typiquement $C \lesssim 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$), l'autoprotolyse de l'eau n'est plus négligeable et impose d'introduire $K_e = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ (à 25 °C, $K_e \approx 10^{-14}$), ce qui justifie les expressions générales faisant intervenir K_e .^{(31),(32)}

Chapitre 5.

Dosage Acido Basique :

En chimie, il ne suffit pas de savoir quelles substances sont présentes dans un échantillon (Avec l'étude qualitative) ; il est souvent crucial de savoir en quelle quantité elles s'y trouvent (Avec l'étude quantitative). Pensez à une recette de cuisine : dire qu'il faut "un peu de sel" est très différent de prescrire "5 grammes de sel". Le premier cas est qualitatif (on identifie l'ingrédient), le second est quantitatif (on mesure sa quantité). Le dosage, ou quantification, est précisément le passage de la théorie ("le fer est présent dans cette eau") à la pratique ("il y a 0,2 milligramme de fer par litre d'eau"). Sans cette mesure précise, la chimie resterait une science descriptive. Le dosage nous permet de prendre des décisions rapides : un médecin peut diagnostiquer une maladie grâce au taux de glucose dans le sang, ou ajuster la posologie d'un médicament en fonction de son pKa pour optimiser son absorption intestinale.⁽³⁵⁾ un ingénieur peut vérifier si l'eau d'une rivière est potable, et un industriel peut s'assurer qu'un médicament contient la bonne dose de principe actif. En somme, doser, c'est donner un sens et une valeur à nos observations chimiques pour agir sur le monde réel.

De la théorie à la pratique : pourquoi doser ?

Imaginez un médecin qui reçoit les résultats d'une analyse de sang. Savoir que "le glucose est présent" dans l'échantillon est une information qualitativement intéressante, mais cliniquement inutile. En revanche, savoir que la concentration de glucose est de 1,2 gramme par litre est une donnée chiffrée, objective, qui permet de poser un diagnostic de diabète et de décider d'un traitement. C'est toute la différence entre décrire et agir. Le dosage, ou quantification, est ce pont indispensable entre la présence d'une molécule et son impact biologique. En tant que futurs professionnels de santé, vous serez confrontés chaque jour à des résultats de dosages : pour prescrire le bon médicament à la bonne posologie, pour surveiller l'évolution d'une maladie, ou pour garantir la pureté d'un composé en pharmacie. Doser, c'est donc traduire le langage de la chimie en une décision médicale, pharmaceutique ou biologique pertinente.

L'importance des dosages en chimie analytique

Si la chimie analytique est l'art de l'investigation au service des sciences de la vie, le dosage en est la preuve irréfutable. C'est l'outil qui transforme une suspicion en un fait mesurable, fondement de la médecine basée sur les preuves (evidence-based medicine). Son importance est omniprésente et critique dans vos futurs métiers :

- En médecine, le dosage est la clé du diagnostic et du suivi. Il permet d'évaluer la fonction rénale par le dosage de la créatinine, de confirmer un infarctus du myocarde en mesurant la troponine, ou d'ajuster les doses d'un médicament comme l'anticoagulant warfarine pour éviter les hémorragies ou les thromboses.
- En pharmacie, il est essentiel à chaque étape du médicament : de la fabrication, où l'on vérifie la dose exacte de principe actif, à la pharmacovigilance, où le dosage sanguin permet de suivre la pharmacocinétique du médicament et d'anticiper ses effets secondaires.⁽³⁵⁾
- En chirurgie dentaire, les dosages garantissent la sécurité des soins, qu'il s'agisse de contrôler la concentration d'anesthésique local ou de vérifier la biocompatibilité et la composition des matériaux de comblement ou des prothèses.
- En sciences de la vie, le dosage est un outil de recherche fondamental pour quantifier l'expression d'un gène, mesurer l'activité d'une enzyme ou suivre la consommation de nutriments par une culture cellulaire.

Sans dosage, la pratique clinique ne serait qu'une série de conjectures. Le dosage fournit les chiffres, les seuils, les preuves qui permettent de passer de l'incertitude à une décision éclairée et sécuritaire pour le patient.

Vue d'ensemble de la démarche

Réaliser un dosage fiable, surtout sur un échantillon biologique complexe comme le sang ou la salive, n'est pas improvisé. Cela suit une méthodologie rigoureuse en quatre étapes, que vous devez maîtriser pour garantir la validité de vos résultats.

- 1) Définir le problème analytique : C'est le point de départ clinique ou biologique. La question n'est pas "que mesure-t-on ?", mais "pourquoi mesure-t-on ça et dans quelle matrice?". Par exemple : "Quel est le taux de cholestérol LDL (lipoprotéine de basse densité) chez ce patient à risque cardiovasculaire ?" ou "Quelle est la concentration en fluor dans ce dentifrice ?". Cette définition conditionne tout le reste.
- 2) Choisir et préparer : On sélectionne la méthode de dosage la plus adaptée (spectrophotométrie, chromatographie, immuno-essai...) en fonction de l'analyte, de la complexité de l'échantillon (sang, urine, salive) et de la précision requise. L'échantillon doit souvent être préparé : centrifugation du sang pour isoler le plasma, dilution, filtration... C'est une étape cruciale pour éviter les interférences.
- 3) Mesurer : C'est la phase expérimentale, où l'on met en œuvre la technique choisie. Que ce soit avec un automate d'analyse clinique ou un spectrophotomètre au laboratoire, cette étape demande une rigueur extrême dans la manipulation des réactifs et l'enregistrement du signal (une couleur, une lumière, un courant...).

- 4) Interpréter et conclure : Le signal brut est traduit en concentration par le calcul. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le résultat doit être comparé à des intervalles de référence (les "normes") pour être interprété. La conclusion n'est pas "la concentration est X", mais "la concentration est X, ce qui est supérieur à la normale, suggérant telle pathologie". C'est le retour à la question initiale pour fournir une information utile et exploitable.

Définition et objectifs

Un **dosage**, ou analyse quantitative, est l'ensemble des opérations qui permettent de déterminer la quantité précise d'une substance chimique spécifique, appelée **l'analyte**, présente dans un échantillon. Il ne s'agit pas de savoir *si* une molécule est présente (une analyse qualitative), mais de répondre à la question : "**Combien ?**". Cette "combinaison" peut être exprimée de différentes manières : une masse (en grammes, en milligrammes), une concentration (en moles par litre, en gramme par litre), ou encore un volume.

Les objectifs d'un dosage sont variés mais toujours centrés sur la prise de décision. En sciences de la vie et en santé, un dosage permet de :

- **Diagnostiquer** : La concentration d'un marqueur biologique (comme la troponine pour un infarctus) permet de confirmer une pathologie.
- **Surveiller** : Suivre l'évolution d'une maladie ou l'efficacité d'un traitement en dosant régulièrement une molécule dans le sang.
- **Définir une posologie** : Ajuster la dose d'un médicament pour qu'elle soit thérapeutique sans être toxique.
- **Contrôler la qualité** : Vérifier qu'un médicament, un cosmétique ou un dispositif médical contient bien la quantité promise de principe actif et respecte les normes de sécurité.
- **Détecter une toxicité** : Mesurer la concentration d'un poison ou d'un polluant dans un milieu biologique ou environnemental.

En résumé, le dosage transforme une présence chimique en une donnée chiffrée, essentielle pour tout raisonnement et toute action en médecine, pharmacie et biologie.

Analogie : La recette de cuisine mystère

Pour bien comprendre le principe, imaginons que vous êtes un chef et que vous trouvez une recette de gâteau exceptionnelle... mais il manque une information cruciale. Pour le sucre, il est simplement écrit : "Ajoutez du sucre". Si vous mettez une pincée, le gâteau sera fade. Si vous mettez tout le paquet, il sera immangeable. La recette est inutilisable sans la **quantité exacte** de sucre.

Dans cette situation :

- Votre pâte à gâteau : est **l'échantillon** à analyser (ex. : sang d'un patient ou flacon de médicament).
- Le sucre : est **l'analyte**, la substance dosée quantitativement (ex. : glucose ou principe actif d'un antibiotique).
- Votre question "Combien de sucre ai-je mis ?" est **l'objectif du dosage** : déterminer la **concentration** ($c = \frac{n}{V}$ en mol/L).
- Votre balance de précision et verre doseur étalonnés : sont **les instruments du laboratoire** (balance analytique, spectrophotomètre UV-Vis).
- Votre méthode : préparer des **standards** (pâtes référence avec 0 g, 5 g, 10 g de sucre par L), mesurer le "goût" (ou absorbance en labo), tracer la **courbe d'étalonnage** (goût vs. dose), puis estimer la dose inconnue par interpolation.

Exemple clinique : Dosage glucose sanguin par spectro UV (821 nm). Standards : 0–20 mmol/L. Résultat : $c = 5,2 \pm 0,1$ mmol/L.

Le dosage, c'est exactement ça : c'est l'opération qui vous permet de passer de "ajoutez du sucre" (une information vague et inutile) à "ajoutez **exactement 150 grammes de sucre**" (une information précise et actionnable). De la même manière, le médecin ne peut pas soigner un patient en sachant seulement qu'il a "du cholestérol" ; il a besoin de savoir qu'il en a 2,5 g/L "pour prescrire le bon traitement".

Le vocabulaire essentiel

Pour maîtriser les dosages, il faut d'abord parler la même langue. Certains termes sont fondamentaux et leur distinction est cruciale pour comprendre la démarche et éviter les erreurs d'interprétation.

Solution à titrer et solution titrante

Imaginez que vous êtes un enquêteur devant un échantillon de sang suspect. Vous voulez savoir s'il contient une substance X et en quelle quantité.

La solution à titrer (ou solution titrée) est votre **échantillon inconnu**. C'est la solution qui contient l'analyte dont vous cherchez à déterminer la quantité. Dans notre analogie, c'est le flacon de sang prélevé chez le patient. Sa concentration en substance X est le "mystère" à résoudre.

La solution titrante est votre **outil de mesure**. C'est une solution dont on connaît **très précisément** la concentration. On l'ajoute progressivement (goutte à goutte) à la solution à titrer. C'est le "réactif révélateur" qui va réagir de manière prévisible avec la substance X.

En résumé : on a un volume connu de la **solution à titrer** (l'inconnu) et on y ajoute un volume mesuré de la **solution titrante** (le connu) pour trouver l'inconnu.

Équivalence et point final

C'est la distinction la plus importante, et souvent la plus source de confusion. Pensez à un GPS.

L'équivalence est un **concept théorique, parfait**. C'est l'instant exact, mathématique, où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques idéales. C'est-à-dire que la quantité de matière (en moles) de la solution titrante ajoutée est parfaitement suffisante pour consommer toute la quantité de matière de l'analyte dans la solution à titrer. Il n'en reste ni l'un ni l'autre. C'est comme les coordonnées GPS exactes de l'adresse que vous visez.

Le point final est une **notion expérimentale, concrète**. C'est l'instant que vous observez et qui vous indique que vous avez atteint (ou très légèrement dépassé) l'équivalence. Le plus souvent, ce signal est un **changement de couleur** brutal d'un indicateur coloré ajouté dans le mélange. C'est le moment où votre GPS vous annonce : "Vous êtes arrivé." En pratique, vous êtes peut-être à quelques mètres de la porte, mais c'est suffisant pour savoir que vous êtes à destination.

L'objectif de tout dosage est de choisir une méthode et un indicateur qui font que le **point final** (ce qu'on voit) soit le plus proche possible de l'**équivalence** (ce qui se passe vraiment).

Saut de pH

Le saut de pH n'est pas un concept, mais un **phénomène observable**. C'est la signature, le signal d'alarme qui nous prévient que nous venons de franchir le point d'équivalence. Lors d'un dosage acido-basique, juste avant l'équivalence, la solution contient encore un peu d'acide (ou de base) qui "tamponne" le système et empêche le pH de varier beaucoup. Au moment précis de l'équivalence, tout l'acide (ou la base) a été neutralisé. Si vous ajoutez une seule goutte supplémentaire de la solution titrante (forte), cette goutte se retrouve "toute seule" dans un milieu neutre et provoque une variation **brutale et immense** du pH. C'est ce pic quasi vertical sur une courbe de dosage que l'on appelle le **saut de pH**. C'est ce saut qui provoque le changement de couleur de l'indicateur et nous permet de repérer le point final.

5.1. La réaction de dosage

Le dosage ne fonctionne pas avec n'importe quelle réaction chimique. Pour qu'une réaction puisse servir de base à un dosage fiable, elle doit impérativement respecter trois conditions, que Skoog et al. décrivent comme les critères fondamentaux de tout dosage analytique⁽³⁶⁾ : les "trois piliers" du dosage.

Caractéristiques (totale, unique, rapide)

- Totale (ou quantitative)** : La réaction doit être complète. À la fin, il ne doit plus rester de réactifs (ou une quantité négligeable). Si la réaction est un équilibre, une partie des réactifs reste en solution et il est impossible de savoir quand on a ajouté "juste assez" de titrant.
 - **Analogie** : C'est comme remplir un seau qui n'a pas de trou. On sait qu'une fois plein, tout l'eau qu'on verse dedans débordera. Si le seau est percé (réaction non totale), il ne se remplira jamais complètement.
- Unique (ou univoque)** : La solution titrante ne doit réagir **qu'avec** l'analyte qui nous intéresse. Si elle réagit aussi avec d'autres composés présents dans l'échantillon (des impuretés, le solvant...), la mesure sera faussée car on dosera plusieurs choses à la fois sans le savoir.
 - **Analogie** : C'est avoir une clé qui n'ouvre qu'une seule serrure. Si votre clé ouvre aussi la porte de votre voisin, vous ne saurez jamais quelle porte vous avez réellement ouverte.
- Rapide** : La réaction doit être instantanée, ou du moins très rapide. Si la réaction est lente, vous ajouterez du titrant en attendant que la réaction précédente se termine, et vous dépasserez largement le point d'équivalence sans même vous en rendre compte.
 - **Analogie** : C'est conduire une voiture avec des freins qui réagissent immédiatement. Si vous appuyez sur la pédale et que la voiture met 10 secondes à s'arrêter, vous dépasserez toujours votre point d'arrêt.

Comment choisir la bonne réaction ?

Le choix de la réaction n'est pas le fruit du hasard, il découle de la nature de l'analyte. La démarche est la suivante :

- Identifier la famille chimique** de l'analyte : est-ce un acide ? une base ? un oxydant ? un réducteur ? un ion métallique ?
- Sélectionner le type de réaction** correspondant :
 - Acide + Base → Réaction acido-basique
 - Oxydant + Réducteur → Réaction d'oxydo-réduction (redox)
 - Ion métallique + Ligand → Réaction de complexation
 - Deux ions qui forment un précipité → Réaction de précipitation
- Vérifier que la réaction choisie** respecte bien les trois piliers (totale, unique, rapide). Pour cela, on se base sur des données connues (constantes d'équilibre, potentiels redox, etc.) et l'expérience.

Éléments de correction pour l'exercice :




Figure 5.1 Montage de pH-métrie

- a) **Oui.** La réaction est totale (acide fort/base forte), unique (pas d'autres réactifs) et instantanée. C'est le dosage parfait.
- b) **Non, ou c'est compliqué.** Le problème est le critère d'**unicité**. La soude réagira avec l'acide acétique mais aussi avec les acides aminés. On ne dosera pas que le vinaigre.
- c) **Non.** Le problème est le critère de **totalité**. La double flèche ($\rightleftharpoons$) indique un équilibre. La réaction n'est pas complète, il restera toujours des ions Cu^{2+} libres, ce qui rend impossible la détermination d'un point d'équivalence net.

5.2. Suivi pH-métrique : La Théorie

5.2.1. Le principe du suivi pH-métrique

Pourquoi mesurer le pH ?

Lors d'un dosage acido-basique, les molécules (acide et base) sont invisibles. Comment savoir où nous en sommes dans la réaction ? Comment savoir quand nous avons atteint le point d'équivalence sans un indicateur coloré qui changerait de manière imprécise ? La réponse est de suivre un **signal** qui dépend directement de la réaction. Le pH est ce signal. En mesurant le pH de la solution en continu avec une électrode, nous avons un "thermomètre" de l'acidité. Chaque goutte de titrant ajoutée modifie la concentration en ions H_3O^+ (ou OH^-), et donc le pH. En suivant cette évolution, nous ne faisons pas que lire des nombres : nous observons en direct le "combat" entre l'acide et la base. Le pH-mètre est notre œil, celui qui nous permet de voir l'invisible et de transformer une réaction chimique en une courbe, un objet d'étude concret et analysable.

La courbe $\text{pH} = f(V)$: "carte d'identité" du dosage

Si le pH-mètre est notre œil, la courbe de dosage, qui trace le pH en fonction du volume de titrant ajouté (notée $\text{pH} = f(V)$), est le cerveau qui interprète l'information. Cette courbe n'est pas un simple graphique ; c'est la véritable **carte d'identité** du dosage. Pour que cette « carte d'identité » soit exploitable, il faut donc construire la courbe $\text{pH} = f(V)$ à partir de mesures fiables : à chaque volume V de titrant ajouté, on relève le pH après stabilisation, en resserrant les ajouts au voisinage du saut de pH afin de déterminer V_{eq} avec précision.

Protocole expérimental : Le protocole décrit ci-dessous suit les recommandations de Harris pour les dosages pH-métriques⁽³⁷⁾ :

1. Réaliser le montage suivant (Figure 5.1).
2. Rincer puis remplir la burette graduée avec la solution titrante.

3. Prélever **10,0 mL** de solution à titrer à l'aide d'une pipette jaugée et d'une propipette, puis l'introduire dans le bécher.
4. Introduire un barreau aimanté dans le bécher, le placer sur l'agitateur magnétique, puis immerger l'électrode du pH-mètre (sans qu'elle touche le barreau).
5. Mettre en route l'agitateur magnétique, allumer le pH-mètre et relever le pH initial ($V = 0$).
6. Ajouter un volume ΔV de solution titrante, attendre la stabilisation de l'affichage, puis relever le pH et le volume total V versé.
7. Répéter l'étape précédente en notant le couple (V, pH) après chaque ajout.
8. Au voisinage du saut de pH, effectuer des ajouts par paliers de 0,5 mL, en relevant (V, pH) après chaque ajout.
9. Lorsque le pH ne varie plus de manière importante, reprendre des ajouts par paliers de 1,0 mL, en relevant (V, pH) après chaque ajout.
10. Tracer la courbe $pH = f(V)$ afin de déterminer V_{eq} (volume à l'équivalence).

Pensez à un électrocardiogramme (ECG) pour un cœur. Pour un médecin, les pics et les creux de l'ECG racontent une histoire complète : le rythme, la force des contractions, les pathologies éventuelles. De la même manière, la courbe $pH = f(V)$ raconte l'histoire complète de notre réaction :

- Le **point de départ** (le pH initial) nous dit si nous avons affaire à un acide fort ou faible.
- La **forme générale** de la courbe avant le saut nous renseigne sur la force de l'acide ou de la base que nous dosons.
- La **position** du grand saut de pH nous donne le volume de titrant nécessaire pour neutraliser l'analyte, et donc sa quantité : c'est le but du dosage !
- Un point très précis sur la courbe, que nous verrons plus loin, nous donne même le **pKa** de l'acide, une donnée fondamentale en pharmacie.

Apprendre à lire cette courbe, c'est comme apprendre à lire un ECG : c'est acquérir la capacité de diagnostiquer une réaction chimique avec précision et confiance.

5.2.2. Les quatre zones caractéristiques

L'analyse théorique des courbes de dosage acido-basique est développée en détail par Atkins et de Paula.⁽³⁸⁾ La courbe de dosage n'est pas monotone : elle peut être décomposée en quatre zones distinctes, comme les quatre actes d'une pièce de théâtre. Comprendre chaque zone, c'est comprendre la chimie qui se passe à chaque instant du dosage.

Phase 1 : Avant l'équivalence

- **Ce qui se passe** : Nous ajoutons le titrant (par exemple, une base forte) à notre solution à titrer (un acide). Mais il reste encore un large **excès d'acide** dans le bécher.
- **L'aspect de la courbe** : Le pH augmente, mais très lentement. La courbe a une pente douce.
- **Pourquoi ?** Nous sommes en présence d'une **solution tampon**. L'acide restant en grande quantité "absorbe" la base que nous ajoutons, limitant ainsi la variation du pH. C'est comme essayer de réchauffer une immense piscine avec une seule bouilloire : la température de l'eau (le pH) va à peine augmenter. La solution résiste au changement.

Phase 2 : Le point de demi-équivalence

- **Ce qui se passe** : Nous avons ajouté **exactement la moitié** du volume de titrant nécessaire pour atteindre l'équivalence. À cet instant précis, la quantité d'acide restant (HA) est égale à la quantité de sa base conjuguée formée (A^-).
- **L'aspect de la courbe** : C'est un point particulier situé au milieu de la zone tampon. La courbe y est souvent la plus "plate".
- **Pourquoi est-ce un point clé ?** À cet instant, une relation fondamentale apparaît : **le pH de la solution est égal au pKa de l'acide dosé** ($pH = pK_a$), une conséquence directe de l'équation de Henderson-Hasselbalch.⁽³⁸⁾ C'est une méthode expérimentale extrêmement puissante pour déterminer le pKa d'une molécule, ce qui est crucial pour comprendre le comportement d'un médicament dans l'organisme (son absorption, son passage dans les membranes, etc.).⁽³⁵⁾

Phase 3 : L'équivalence (le point clé !)

- **Ce qui se passe** : C'est le moment charnière. Toute la quantité d'acide initial a été neutralisée. Il n'y a plus d'acide HA, ni de base titrante. La solution ne contient que de l'eau et la base conjuguée A^- .
- **L'aspect de la courbe** : C'est le fameux **saut de pH**. La courbe est quasiment verticale. Le pH change de plusieurs unités en une seule goutte de titrant.
- **Pourquoi ?** Le pouvoir tampon a disparu ! Il n'y a plus d'acide pour neutraliser la base que l'on continue d'ajouter. La goutte de base forte "tombe" dans une solution qui ne peut plus la contrer, provoquant une explosion de pH. Le centre de ce saut vertical correspond au **volume équivalent** (V_{eq}), la donnée la plus importante du dosage.


Phase 4 : Après l'équivalence

- **Ce qui se passe** : Nous continuons d'ajouter la base titrante, mais maintenant elle est en **excès**. Le pH de la solution n'est plus contrôlé par l'acide initial (qui a disparu) mais par la base que nous ajoutons.

- **L'aspect de la courbe** : Après le saut, le pH augmente à nouveau, mais lentement, pour se stabiliser progressivement vers le pH de la solution titrante pure.
- **Pourquoi ?** La situation est symétrique de la **Phase 1**. Nous diluons progressivement notre excès de base dans un volume de plus en plus grand d'eau. La variation du pH devient de nouveau modérée. La courbe rejoint une asymptote qui correspond au pH de la solution de soude que nous ajoutons.

5.2.3. Le Dosage Acide Fort par une Base Forte : Le Duel Parfait

Le dosage acido-basique est l'une des méthodes les plus classiques et les plus pédagogiques de la chimie analytique. Il repose sur la réaction de neutralisation entre les ions oxonium H_3O^+ apportés par un acide et les ions hydroxyde OH^- apportés par une base. Cette réaction est totale, rapide et stœchiométrique :



Dans ce cas précis, nous considérons le dosage d'un **acide fort** (par exemple HCl) par une **base forte** (par exemple NaOH). Un acide fort est totalement dissocié en solution aqueuse, de même qu'une base forte. Ainsi, la concentration initiale de l'acide correspond directement à la concentration en ions H_3O^+ , et celle de la base correspond à la concentration en ions OH^- .

Pour mieux comprendre :

Imaginez un duel opposant deux combattants d'une puissance et d'une honnêteté absolues. Chaque coup porté est efficace, chaque défense est transparente. Il n'y a pas de ruse, pas de stratégie cachée, juste une confrontation pure et prévisible. C'est exactement ce qui se passe lors du dosage d'un acide fort par une base forte. C'est le cas d'école, le modèle de référence qui nous permet de comprendre tous les autres, plus complexes.

Principe de l'expérience


On place dans un bécher un volume V_a d'acide fort de concentration C_a . On ajoute progressivement, à l'aide d'une burette graduée, une solution de base forte de concentration C_B . À chaque ajout, la solution réagit immédiatement : les ions OH^- neutralisent une partie des ions H_3O^+ . Le suivi du dosage peut se faire soit par indicateur coloré (comme la phénolphthaléine), soit par mesure du pH avec une sonde.

Imaginez un duel opposant deux combattants d'une puissance absolues. Chaque coup porté est efficace, une défense transparente. Il n'y a pas de ruse, pas de stratégie cachée, juste une confrontation pure et prévisible. C'est exactement ce qui se passe lors du dosage d'un acide fort par une base forte. C'est le modèle de référence qui nous permet de comprendre tous les autres cas, plus complexes.

Pour maîtriser ce dosage, nous devons répondre à quatre questions fondamentales : Qui sont les combattants ? Que reste-t-il après la bataille ? Comment se déroule le combat, étape par étape ? Et comment sait-on que le combat est terminé ?

5.2.4. Les Combattants : Des Acteurs "Honnêtes"


Un acide fort (comme l'acide chlorhydrique, HCl) et une base forte (comme l'hydroxyde de sodium, NaOH) sont dits "forts" car, une fois dans l'eau, ils ne font aucun mystère de leur identité. Ils se dissocient **totale**ment et **immédiatement** en ions.



Il n'y a pas d'équilibre, pas de molécules d'acide ou de base "en attente". Dès l'instant où ils sont dans la solution, ils sont présents à 100 % sous forme d'ions, prêts à réagir. Cette transparence est la première clé de la simplicité de ce dosage.

5.2.5. L'Après-Bataille : Des "Spectateurs" Inoffensifs

La réaction entre les ions est tout aussi directe :



Que deviennent les autres ions, Na^+ et Cl^- ? Ils ne participent pas à la réaction. On les appelle des **ions spectateurs**. Ils sont comme les spectateurs dans un stade : ils sont présents, mais ils ne font pas le match. Plus important encore, ces ions sont chimiquement inertes vis-à-vis de l'eau. L'ion Na^+ est un acide si faible qu'il est incapable d'arracher un proton à une molécule d'eau. L'ion Cl^- est une base si faible qu'elle ne capte jamais de proton.

Le produit de leur "association", le chlorure de sodium (NaCl), est donc un **sel neutre**. Dissous dans l'eau, il ne modifie pas le pH. C'est la deuxième clé, la plus importante : au moment précis où tout l'acide a réagi avec toute la base (l'équivalence), la solution ne contient plus que de l'eau et des ions spectateurs neutres. Le pH est donc celui de l'eau pure : **7**.

5.2.6. Le Combat, Étape par Étape : L'Anatomie de la Courbe

Pour visualiser ce duel, suivons un exemple concret : nous dosons 10 mL d'acide chlorhydrique (HCl) $C_A = 0,1 \text{ M}$ avec de la soude (NaOH) avec une concentration de $C_B = 0,1 \text{ M}$. Les concentrations étant identiques, donc le volume nécessaire

pour neutraliser tout l'acide est 10 mL.

Équation de réaction	HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H ₂ O
État initial à t_0	n_A		n_B		0		–
	$C_A V_A$		$C_B V_B$		0		–
État d'équilibre à t_{eq}	$C_A V_A - C_B V_B$		0		$C_B V_B$		–

Phase 1 : Le Règne de l'Acide (Avant l'équivalence)

Au début du dosage, l'acide fort règne en maître dans le bécher. Chaque goutte de base ajoutée est immédiatement neutralisée par l'excès d'ions H_3O^+ présents. La balance penche encore largement en faveur de l'acide : le pH augmente, mais très lentement. La solution conserve un caractère fortement acide.

Calcul à $V = 1$ mL de NaOH ajouté

Équation de réaction	HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H ₂ O
État initial (mol)	n_A		n_B		0		solvant
	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$0,1 \cdot 10^{-3}$		0		–
État final (mol)	$9,0 \cdot 10^{-4}$		0		$0,1 \cdot 10^{-3}$		–
	Acide fort		Base forte		Sel neutre		

Pourquoi raisonner en quantités de matière ?

Imaginez que vous préparez un cocktail : si vous versez un peu de sirop dans un verre, puis que vous ajoutez de l'eau, le goût sucré devient moins fort. La **concentration** en sucre a changé, mais la **quantité totale** de sucre dans le verre est restée la même.

C'est exactement ce qui se passe pendant un dosage :

- Quand on ajoute la solution de base, le **volume total augmente**.
- Toutes les **concentrations** sont donc **diluées** et changent constamment.
- En revanche, les **quantités de matière (en moles)** ne sont pas affectées par cette dilution.

Méthode de calcul pas à pas

1. Calculer les quantités de matière initiales :

$$\text{Moles d'acide : } n_A = C_A V_A = 0,1 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Moles de base ajoutée : } n_B = C_B V_B = 0,1 \cdot 1 \cdot 10^{-3} = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

2. Identifier l'espèce déterminante pour le pH :

Le mélange final contient :

- **Acide fort restant** : espèce active qui impose l'acidité
- **Sel neutre (NaCl)** : ions spectateurs qui n'influencent pas le pH

Analyse du mélange à t_{eq} : qui détermine le pH ? Avant tout calcul, il est essentiel d'identifier les espèces chimiques présentes dans le bécher **après** la réaction c'est-à-dire à l'équilibre et de comprendre leur rôle.

Dans notre cas (avant l'équivalence), le mélange est constitué de :

- **Acide fort (HCl) restant** : C'est l'espèce **active**.
 - Il est totalement dissocié en ions H_3O^+ .
 - C'est un **donneur de protons** puissant.
 - Il **impose** un milieu acide.
- **Sel (NaCl) formé** : C'est une espèce **spectatrice**.
 - Il provient de l'anion Cl^- (base conjuguée d'un acide fort, extrêmement faible).
 - Il provient du cation Na^+ (acide conjugué d'une base forte, extrêmement faible).
 - Ces deux ions sont **totalement stables** dans l'eau et **n'interagissent pas** avec H_3O^+ ou OH^- .
 - Ils **n'influencent pas** le pH du milieu.

Conclusion : Le pH du mélange est **uniquement et entièrement** contrôlé par l'**acide fort restant**. Le sel, étant neutre, ne fait que "diluer" la solution sans participer à l'équilibre acido-basique.

L'équation appropriée pour calculer la concentration en H_3O^+ est donc celle qui décrit la dissociation totale d'un acide fort :

3. Calculer le pH :

- Quantité d'acide restant : $n_{\text{restant}} = n_A - n_B = 9,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$
- Volume total : $V_{\text{total}} = V_A + V_B = 11,0 \text{ mL}$

— Concentration en H_3O^+ :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{n_{\text{restant}}}{V_{\text{total}}} = \frac{9,0 \cdot 10^{-4}}{11,0 \cdot 10^{-3}} = 8,18 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

— Calcul du pH :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(8,18 \cdot 10^{-2}) \approx 1,09$$

Interprétation

Le pH initial était de 1,00. Après ajout de 1 mL de base, le pH n'augmente que très légèrement à 1,09. Cette faible variation confirme que :

- Le mélange reste très acide
- Nous sommes encore loin du point d'équivalence
- L'acide fort restant domine toujours le milieu

En résumé

En raisonnant avec les quantités de matière, vous suivez l'évolution réelle des réactifs, indépendamment de la dilution. Cette approche est essentielle pour calculer précisément le pH à chaque étape du dosage.

Phase 2 : À la Demi-Équivalence ($V_B = 5 \text{ mL}$)

Nous approchons du milieu du dosage. La base forte gagne du terrain, mais le combat est encore serré. À ce stade, une moitié de l'acide initial a été neutralisée, tandis que l'autre moitié reste présente. Cette situation particulière crée un équilibre caractéristique.

Calcul à $V = 5 \text{ mL}$ de NaOH ajouté

Équation de réaction	HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H ₂ O
État initial (mol)	n_A		n_B		0		solvant
	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$5,0 \cdot 10^{-4}$		0		—
État final (mol)	$5,0 \cdot 10^{-4}$		0		$5,0 \cdot 10^{-4}$		—
	Acide fort		Base forte		Sel neutre		

Méthode de calcul pas à pas

1. Calculer les quantités de matière initiales :

$$\text{Moles d'acide : } n_A = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Moles de base ajoutée : } n_B = C_B V_B = 0,1 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

2. Identifier l'espèce déterminante pour le pH :

Le mélange final contient :

- **Acide fort restant** : $5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$
- **Sel neutre (NaCl)** : $5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$
- **Pas de base forte** : toute la base ajoutée a réagi

Situation particulière de la demi-équivalence À ce point stratégique, nous observons que :

- La quantité d'acide restant **égale** la quantité de sel formé
- Exactement la moitié de l'acide initial a été neutralisée
- Le milieu reste acide, mais beaucoup moins qu'au début

3. Calculer le pH :

- Quantité d'acide restant : $n_{\text{restant}} = n_A - n_B = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$
- Volume total : $V_{\text{total}} = V_A + V_B = 15,0 \text{ mL}$
- Concentration en H_3O^+ :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{n_{\text{restant}}}{V_{\text{total}}} = \frac{5,0 \cdot 10^{-4}}{15,0 \cdot 10^{-3}} = 3,33 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

— Calcul du pH :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(3,33 \cdot 10^{-2}) \approx 1,48$$

En résumé

La demi-équivalence représente un point charnière où exactement la moitié de l'acide initial a été consommée. Le pH a significativement augmenté par rapport au début du dosage, annonçant l'approche du point de virage.

Phase 3 : Le Point d'Équivalence ($V_B = 10$ mL)

Nous voici au moment crucial du dosage : le point d'équivalence. C'est l'instant où l'acide et la base ont été mélangés dans les proportions exactes de la réaction. Il n'y a plus ni excès d'acide, ni excès de base. Les deux armées se sont annihilées mutuellement dans un combat parfaitement équilibré.

Calcul à $V = 10$ mL de NaOH ajouté

Équation de réaction	HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H ₂ O
État initial (mol)	n_A		n_B		0		solvant
	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,0 \cdot 10^{-3}$		0		—
État final (mol)	0		0		$1,0 \cdot 10^{-3}$		—
	Acide fort		Base forte		Sel neutre		

Méthode de calcul pas à pas

1. Calculer les quantités de matière initiales :

$$\text{Moles d'acide : } n_A = C_A V_A = 0,1 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Moles de base ajoutée : } n_B = C_B V_B = 0,1 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Observation cruciale : À l'équivalence, $n_A = n_B$. Les réactifs sont dans les proportions stoechiométriques exactes.

2. Analyse qualitative du mélange à l'équivalence

Que trouve-t-on dans le bécher après la réaction ?

- Acide fort (HCl) : complètement consommé il ne reste plus une seule mole d'acide.
- Base forte (NaOH) : avec le même nombre de molécule que l'acide elle sera aussi absente dans le mélange final, donc il ne reste plus une seule mole de base.
- Eau (H₂O) : formée par la réaction, mais c'est le solvant
- Sel (NaCl) : $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol de chlorure de sodium

Qui détermine le pH maintenant ? Le sel NaCl est composé de :

- **Ion Na⁺** : acide conjugué de NaOH (base forte), donc **acide extrêmement faible**
- **Ion Cl⁻** : base conjuguée de HCl (acide fort), donc **base extrêmement faible**


Ces deux ions sont **totalemtent spectateurs**. Aucun des deux ne réagit avec l'eau de manière significative. Ils n'ont **aucune influence** sur le pH.

Calcul du pH à l'équivalence

3. Quelle est l'espèce déterminante ?

Puisqu'il n'y a plus ni acide fort, ni base forte, et que le sel est neutre, le pH est contrôlé par... **l'eau pure !**

- Volume total : $V_{\text{total}} = V_A + V_B = 20,0$ mL
- Dans une solution aqueuse, l'eau s'autoprotolyse :



- À 25 °C, le produit ionique de l'eau est :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-14}$$

- Dans l'eau pure, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = 1,0 \cdot 10^{-14}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{1,0 \cdot 10^{-14}} = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ mol/L}$$

- Calcul du pH :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log(1,0 \cdot 10^{-7}) = 7,00$$

En résumé

Le point d'équivalence représente l'achèvement parfait de la réaction de neutralisation. C'est l'instant où acide et base, ayant été ajoutés en quantités stoechiométriquement équivalentes, ont totalement réagi pour donner un sel neutre et de l'eau. Le pH à l'équivalence pour un couple acide fort/base forte est toujours de 7,00 à 25 °C.

Phase 4 : Le Règne de la Base (Après l'équivalence)

Nous avons maintenant dépassé le point d'équivalence. La base forte, qui était auparavant le réactif limitant, devient l'espèce en excès. C'est un renversement complet de situation : la base prend le contrôle du milieu et impose son caractère basique.

Calcul à V = 15 mL de NaOH ajouté

Équation de réaction	HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H ₂ O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,5 \cdot 10^{-3}$		0		—
État final (mol)	0		$0,5 \cdot 10^{-3}$		$1,0 \cdot 10^{-3}$		—
	Acide fort		Base forte		Sel neutre		

Méthode de calcul pas à pas

1. Calculer les quantités de matière initiales :

$$\text{Moles d'acide : } n_A = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{Moles de base ajoutée : } n_B = C_B V_B = 0,1 \cdot 15 \cdot 10^{-3} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Observation cruciale : Après l'équivalence, $n_B > n_A$. La base est maintenant en excès.

2. Analyse qualitative du mélange

Que trouve-t-on dans le bécher après la réaction ?

- **Acide fort (HCl)** : dissociation totale
- **Base forte (NaOH)** : en excès ($0,5 \cdot 10^{-3}$ mol)
- **Sel neutre (NaCl)** : $1,0 \cdot 10^{-3}$ mol
- Les ions OH^- de la base forte imposent le caractère basique

Qui détermine le pH maintenant ?

- La **base forte en excès** : elle est totalement dissociée et produit des ions OH^-
- Le **sel neutre (NaCl)** : reste spectateur, sans influence sur le pH
- L'**acide fort** : a totalement disparu

Calcul du pH après l'équivalence

3. Calcul de la concentration en ions OH^-

- Quantité de base en excès : $n_{\text{base excès}} = n_B - n_A = 0,5 \cdot 10^{-3}$ mol
- Volume total : $V_{\text{total}} = V_A + V_B = 25,0$ mL
- Concentration en OH^- :

$$[\text{OH}^-] = \frac{n_{\text{base excès}}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{25,0 \cdot 10^{-3}} = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

4. Calcul du pH

- On calcule d'abord le pOH :

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-] = -\log(2,0 \cdot 10^{-2}) \approx 1,70$$

- Puis on déduit le pH :

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 1,70 = 12,30$$

Interprétation

Évolution complète du pH :

- À $V_B = 0$ mL : pH = 1,00 (règne de l'acide)
- À $V_B = 1$ mL : pH = 1,09 (acide dominant)
- À $V_B = 5$ mL : pH = 1,48 (demi-équivalence)
- À $V_B = 10$ mL : pH = 7,00 (équivalence - neutralité)
- À $V_B = 15$ mL : pH = 12,30 (base dominante)

Caractéristiques de la zone après l'équivalence :

- La base forte en excès impose un pH **basique**
- Le pH augmente **beaucoup plus lentement** qu'autour de l'équivalence
- Chaque ajout supplémentaire de base dilue la solution, limitant l'augmentation du pH
- Le sel neutre présent ne fait qu'atténuer légèrement la basicité par dilution

En résumé

Après l'équivalence, nous assistons à un renversement complet : la base forte, maintenant en excès, domine le milieu et impose un pH basique. Le calcul du pH se fait en déterminant la concentration de la base forte restante, exactement comme nous le faisons pour l'acide fort avant l'équivalence, mais en raisonnant avec les ions OH^- et le pOH.

5.2.7. Le Dosage Base Forte par un Acide Fort : La Révérence

5.2.7.1. Une Symétrie Élégante

Si le dosage acide fort avec une base forte était un duel entre deux combattants égaux, le dosage base forte-acide fort en est la **révérence**, le même combat, mais vu depuis l'autre côté du miroir.

Pour l'étudiant avisé : Vous maîtrisez déjà l'essentiel. La courbe de dosage est le **miroir parfait** de la précédente, symétrique par rapport au point ($V_{eq} = 10 \text{ mL}$, $\text{pH} = 7$).

5.2.7.2. Le Scénario Inversé

Notre nouveau protagoniste :

- **Dans le bécher :** Volume V_b de base forte (ex : NaOH 0,1 M)
- **Dans la burette :** Acide fort (ex : HCl 0,1 M)
- **Réaction :** Identique! $\text{OH}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

5.2.7.3. Les Quatre phases

- Phase 1 - Le Règne de la Base** (Avant équivalence)
 - pH initial **élevé** (≈ 13 pour NaOH 0,1 M)
 - Chaque goutte d'acide neutralise une partie des OH^-
 - **Le pH diminue lentement**
- Phase 2 - La Demi-Équivalence**
 - Moment charnière où la moitié de la base a été neutralisée
 - $\text{pH} = ?$ **À vous de jouer !** (Indice : $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$ restant)
- Phase 3 - L'Équivalence**
 - **Même point !** $V_{eq} = V_b$, $\text{pH} = 7,00$
 - Solution neutre : uniquement sel + eau
 - **Virage brutal** du pH
- Phase 4 - Le Règne de l'Acide** (Après équivalence)
 - L'acide fort en excès impose l'acidité
 - **Le pH diminue lentement** vers 1-2

5.2.7.4. La Courbe Miroir


Point	Dosage Acide→Base	Dosage Base→Acide
Début	$\text{pH} \approx 1$	$\text{pH} \approx 13$
Demi-éq.	$\text{pH} \approx 1,5$	$\text{pH} \approx 12,5$
Équivalence	$\text{pH} = 7$	$\text{pH} = 7$
Fin	$\text{pH} \approx 12-13$	$\text{pH} \approx 1-2$

5.2.8. Le Dosage Acide Faible par une Base Forte :

Contrairement au dosage acide fort-base forte qui était un "duel parfait" entre deux combattants transparents, le dosage d'un acide faible par une base forte introduit une dimension stratégique supplémentaire. L'acide faible, comme l'acide acétique CH_3COOH , ne révèle pas immédiatement toute sa force. Il dissimule une partie de son potentiel, créant des équilibres complexes et des zones tampons qui rendent ce dosage plus subtil et plus riche en enseignements.

5.2.8.1. Les Combattants : Un Acide "Stratège" et une Base "Brutale"


L'acide faible (CH_3COOH) : un combattant équilibré Un acide faible n'est que partiellement dissocié en solution aqueuse. Il établit un équilibre dynamique :



Cet équilibre est caractérisé par sa constante d'acidité K_a :

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 1,8 \times 10^{-5} \quad \text{avec} \quad \text{p}K_a = 4,74$$

La base forte (NaOH) : la force transparente Comme précédemment, la base forte se dissocie totalement :






Figure 5.2 Dosage de HCl par NaOH





Figure 5.3 Dosage de NaOH par HCl

5.2.8.2. Le Mécanisme Réactionnel "Une Neutralisation Progressive" :

La réaction de dosage s'écrit :



Cette réaction est totale ($K \gg 1$), mais son déroulement est plus complexe que dans le cas acide fort-base forte. Cette complexité provient de la **nature équilibrée** de l'acide faible. Contrairement à un acide fort qui livre instantanément tous ses protons, l'acide acétique maintient un équilibre dynamique qui évolue progressivement au cours du dosage. Chaque ajout de base forte ne neutralise pas seulement les protons libres, mais **déplace cet équilibre** selon le principe de Le Chatelier, forçant la dissociation de nouvelles molécules d'acide. Ce mécanisme séquentiel crée une **zone tampon**

étendue où le pH varie peu, et conduit inévitablement à un **pH basique à l'équivalence** dû à l'hydrolyse de l'acétate formé CH_3COO^- . C'est cette progression continue des équilibres que nous allons maintenant analyser en détail à travers les différentes zones caractéristiques du dosage.

5.2.8.3. Étude Détaillée des Différentes phases du Dosage

Considérons le dosage de $V_a = 10 \text{ mL}$ d'acide acétique $C_a = 0,1 \text{ M}$ par de la soude $C_B = 0,1 \text{ M}$.

Phase 1 : Avant l'Équivalence :

La zone avant l'équivalence se caractérise par un excès d'acide faible. On peut la diviser en deux sous-phases distinctes :

Première sous-phase : La solution d'acide faible pure ($V_B = 0 \text{ mL}$) À ce stade initial, nous avons une solution d'acide acétique pure. Le pH est déterminé uniquement par l'équilibre de dissociation de l'acide faible, le pH se calcule par :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a C_A} = \sqrt{1,8 \times 10^{-5} \times 0,1} = 1,34 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log(1,34 \times 10^{-3}) = \boxed{2,87}$$

Deuxième sous-phase : La zone tampon ($0 < V_B < V_{eq}$) Dès la première goutte de base ajoutée ($V_B > 0$), la situation change radicalement. Nous entrons dans le domaine de la solution tampon, où coexistent l'acide faible restant et sa base conjuguée formée. Cette zone, qui s'étend jusqu'à l'équivalence, présente des propriétés remarquables de résistance aux variations de pH que nous allons explorer en détail.

Situation à $V_B = 1 \text{ mL}$ (Début du Dosage)

Équation de réaction	CH_3COOH	+	NaOH	$\longrightarrow$	CH_3COONa	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,0 \cdot 10^{-4}$		0		—
État final (mol)	$9,0 \cdot 10^{-4}$		0		$1,0 \cdot 10^{-4}$		—
	Acide faible		Base forte		Sel Basique		

À ce stade précoce du dosage, nous sommes en présence d'un mélange entre l'acide faible CH_3COOH et l'acétate de sodium CH_3COONa . Ce sel, en solution aqueuse, fournit :

- Un ion spectateur Na^+ qui n'influence pas le pH
- L'ion acétate CH_3COO^- , base conjuguée de l'acide acétique

donc on nous du compte nous avons un acide faible et sa base conjugué, et c'est exactement la définition d'une solution tampon :

Bilan des espèces actives :

- Acide faible restant : $9,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$
- Base conjuguée formée : $1,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$
- Volume total : $V_{\text{total}} = 11,0 \text{ mL}$

Alors l'application de la relation de Henderson-Hasselbalch est prépondérante :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \right) = 4,74 + \log \left(\frac{0,1}{0,9} \right) = 4,74 - 0,95 = \boxed{3,79}$$

Interprétation Le pH a augmenté de 2,87 à 3,79, et la solution commence à développer des propriétés tampon, Avant de passer à la phases suivant, il est important de faire une bref connaissance avec la solution Tampon :

Les Solutions Tampons : Origine et Propriétés

Définition Solution Tampon : L'Équilibre Sage

Une solution tampon est un mélange entre un acide faible et sa base conjuguée, sinon une base faible avec son acide conjugué qui coexistent en harmonie, formant un duo complémentaire, tel un sage régulateur, maintient le pH relativement constant. Son secret réside dans sa double capacité à neutraliser les assauts acides par sa base conjuguée et les assauts basiques par son acide faible, maintenant ainsi un pH remarquablement stable grâce à cet équilibre dynamique calculé. Les propriétés et les applications des solutions tampon sont traitées de manière exhaustive par Perrin et Dempsey.⁽³⁹⁾

Origine de l'équation de Henderson-Hasselbalch : L'équation qui doit son nom à deux scientifiques qui, indépendamment, ont marqué le début du 20^{ème} siècle par leurs travaux fondateurs :


Lawrence Joseph Henderson (1908) - Biochimiste américain qui, le premier, formula une équation décrivant l'équilibre acide-base dans le sang. Travaillant sur la régulation du pH sanguin et le rôle du bicarbonate, il établit la relation fondamentale entre les concentrations d'acide et de base conjuguée.

Karl Albert Hasselbalch (1916) - Médecin et chimiste danois qui, reprenant les travaux de Henderson, eut l'idée géniale d'appliquer la fonction logarithme à l'équation originale. Cette transformation donna à la relation sa forme moderne et pratique que nous utilisons aujourd'hui.



Henderson & Hasselbalch

Évolution mathématique : Considérons l'équilibre acide-base générique :



La constante d'acidité s'écrit : $K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}$

Équation originale de Henderson (1908) : $[\text{H}^+] = K_a \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$

Transformation de Hasselbalch (1916) : $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$


À retenir

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}\right) \quad (5.1)$$


Cette équation, née de préoccupations physiologiques sur la régulation du pH sanguin, est devenue un outil universel en chimie des solutions, trouvant des applications bien au-delà du domaine médical qui l'avait vue naître. Pour une démonstration mathématique complète, vous pouvez vous référer à Perrin et Dempsey.⁽³⁹⁾

Conditions pour former une solution tampon efficace Pour qu'une solution tampon déploie son bouclier protecteur, quatre conditions essentielles doivent être réunies :

- **La bonne équipe** : Présence simultanée des deux partenaires du couple acide-base conjugué. Il faut avoir des concentrations significatives des deux formes, acide (HA) et base (A⁻). Cette équipe peut se former de quatre façons :
 - **Mélange direct** d'un acide faible avec sa base conjuguée.
 - **Mélange direct** d'une base faible avec son acide conjugué.
 - **Neutralisation partielle d'un acide faible par une base forte** : On ajoute une quantité limitée de base forte à un excès d'acide faible. La base forte est entièrement consommée (réactif limitant), générant la base conjuguée, tandis qu'une partie de l'acide faible reste non neutralisée. telque :



- **Neutralisation partielle d'une base faible par un acide fort** : On ajoute une quantité limitée d'acide fort à un excès de base faible. L'acide fort est entièrement consommé (réactif limitant), générant l'acide conjugué, tandis qu'une partie de la base faible reste non neutralisée. telque :




- **La parfaite harmonie** : Un rapport des concentrations équilibré. Le pouvoir tampon est maximal lorsque [A⁻] = [HA] (pH = pK_a). Le tampon reste efficace pour des rapports compris entre 0,1 et 10, soit pour un intervalle de pH = pK_a ± 1.
- **La force numérique** : Des concentrations absolues suffisantes. Des concentrations élevées (typiquement 0,01 M à 1 M) assurent une meilleure capacité tampon, comme une armée plus nombreuse peut mieux résister aux assauts.
- **Le terrain favorable** : Un pK_a approprié. Le pK_a de l'acide doit être proche du pH souhaité pour la zone tampon, garantissant que les deux formes soient présentes en quantités significatives.

En résumé : Une solution tampon efficace nécessite la bonne équipe chimique, en harmonie numérique, suffisamment concentrée et opérant sur son terrain de prédilection !


Mécanisme d'action du tampon L'efficacité du tampon repose sur sa double capacité à neutraliser :

- **Les ajouts de base forte** :



L'acide faible consomme les ions OH⁻ ajoutés.

- Les ajouts d'acide fort :



La base conjuguée consomme les ions H_3O^+ ajoutés.

Application à notre dosage acide acétique/soude Dans notre cas, le couple tampon est CH_3COOH/CH_3COO^- avec $pK_a = 4,74$. Pendant toute la phase avant l'équivalence ($0 < V_B < 10 \text{ mL}$), nous créons naturellement une solution tampon dont les propriétés expliquent :

- La faible variation de pH dans cette zone
- La courbure caractéristique de la courbe de dosage
- L'importance particulière de la demi-équivalence

Capacité tampon et zone d'efficacité La capacité tampon est maximale à la demi-équivalence et décroît lorsqu'on s'éloigne de cette condition. Dans notre dosage, la zone tampon efficace s'étend approximativement de $pH = 3,74$ à $pH = 5,74$ ($pK_a \pm 1$).

Cette compréhension approfondie des solutions tampons nous permet maintenant d'analyser avec plus de pertinence le point particulier de la demi-équivalence.

Phase 2 à $V_B = 5 \text{ mL}$ (Demi-Équivalence)

Équation de réaction	CH_3COOH	+	$NaOH$	$\longrightarrow$	CH_3COONa	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$5,0 \cdot 10^{-4}$		0		—
État final (mol)	$5,0 \cdot 10^{-4}$		0		$5,0 \cdot 10^{-4}$		—
	Acide faible		Base forte		Sel Basique		

Correction importante : À la ligne "État final", il faut lire "Acide faible" et "Sel basique" pour être cohérent avec la chimie de l'acide acétique.

Analyse détaillée de ce point remarquable À la demi-équivalence, nous atteignons une situation d'équilibre parfaite qui présente des caractéristiques exceptionnelles :

- Égalité stoechiométrique parfaite :

$$[CH_3COOH] = [CH_3COO^-] = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Exactement la moitié de l'acide initial a été convertie en sa base conjuguée.

- Relation de Henderson-Hasselbalch simplifiée :

$$pH = pK_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 4,74 + \log(1) = 4,74$$

Le logarithme de 1 étant nul, le pH devient **indépendant des concentrations absolues** et égale exactement le pK_a .

- **Pouvoir tampon maximal :** La solution présente des propriétés tampon **optimales**. La capacité à résister aux variations de pH est à son maximum car toute addition d'acide ou de base sera neutralisée avec la même efficacité par les deux formes du couple.
- **Importance expérimentale :** Ce point est crucial en laboratoire car il permet de déterminer expérimentalement le pK_a d'un acide faible avec une grande précision, simplement en mesurant le pH à la demi-équivalence.
- **Équilibre dynamique parfait :** Le système atteint un état d'équilibre où les vitesses de protonation et de déprotonation sont parfaitement équilibrées, créant une stabilité pH-métrique remarquable.

Conséquence fondamentale La demi-équivalence représente le **point d'inflexion** de la courbe de dosage où la dérivée de la courbe $pH = f(V)$ change de comportement. C'est le moment où le système tampon exhibe toute son efficacité protectrice.

À la demi-équivalence, nous observons une situation remarquable :

- $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$
- Le pH est égal au pK_a de l'acide :
- La solution présente des propriétés **tampon** optimales

Situation à $V_B = 8 \text{ mL}$

Équation de réaction	CH_3COOH	+	$NaOH$	$\longrightarrow$	CH_3COONa	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$8,0 \cdot 10^{-4}$		0		—
État final (mol)	$0,2 \cdot 10^{-3}$		0		$8 \cdot 10^{-4}$		—
	Acide faible		Base forte		Sel Basique		

Analyse quantitative détaillée

— Bilan matière après réaction :

$$\begin{aligned}\text{Acide acétique restant} &: 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ \text{Acétate de sodium formé} &: 8,0 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ \text{Rapport } \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} &= \frac{8,0}{2,0} = 4,0 \\ \text{Volume total : } V_{\text{total}} &= 10 + 8 = 18 \text{ mL} = 0,018 \text{ L}\end{aligned}$$

— Application de la relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,74 + \log \left(\frac{4,44 \times 10^{-2}}{1,11 \times 10^{-2}} \right) = 4,74 + 0,60 = 5,34$$

Interprétation physique et chimique

- **Éloignement de la demi-équivalence** : Nous sommes maintenant dans une situation où la base conjuguée domine largement ($[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 4 \times [\text{CH}_3\text{COOH}]$).
- **Pouvoir tampon encore efficace** : Bien que diminué par rapport à la demi-équivalence, le pouvoir tampon reste significatif car le rapport des concentrations (4 : 1) est encore dans la zone d'efficacité (entre 0,1 et 10).
- **Évolution du pH** : Par rapport à la demi-équivalence ($\text{pH} = 4,74$), le pH a augmenté de 0,60 unité, ce qui correspond exactement au logarithme du rapport des concentrations.
- **Approche de l'équivalence** : À $V_B = 8 \text{ mL}$, nous avons consommé 80% de l'acide initial. Il ne reste plus que 20% de l'acide à neutraliser pour atteindre le point d'équivalence.

Perspective Cette situation illustre comment la relation de Henderson-Hasselbalch nous permet de prédire avec précision l'évolution du pH dans la zone tampon, même lorsque nous nous éloignons des conditions optimales de la demi-équivalence.

Phase 3 : Le Point d'Équivalence ($V_B = 10 \text{ mL}$)

Équation de réaction	CH_3COOH	+	NaOH	$\longrightarrow$	CH_3COONa	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,0 \cdot 10^{-3}$		0		—
État final (mol)	0		0		$1,0 \cdot 10^{-3}$		—
	Acide faible		Base forte		Sel Basique		

Le Renversement de Situation À l'équivalence, nous assistons à une transformation fondamentale :

- Disparition complète de l'acide acétique initial.
- Consommation totale de la base forte ajoutée.
- Apparition exclusive de l'acétate de sodium CH_3COONa .

Pourquoi un pH Basique à l'Équivalence ? Contrairement au dosage acide fort par une base forte où le pH à l'équivalence est neutre ($\text{pH} = 7$), ici l'équivalence donne un pH **basique** ($\text{pH} > 7$), pour la simple raison c'est que l'ion acétate CH_3COO^- est la **base conjuguée** d'un acide faible. En solution aqueuse, il subit une réaction d'hydrolyse avec l'eau : $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ Cette réaction libère des ions OH^- , rendant la solution basique.

Calcul Détaillé du pH

a) Concentration de l'acétate :

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{n_{\text{sel formé}}}{V_{\text{total}}} = \frac{1,0 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-3}} = 0,05 \text{ mol/L}$$

b) Constante de basicité K_b :

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{1,8 \times 10^{-5}} = 5,56 \times 10^{-10}$$

Cette relation fondamentale relie la basicité de l'acétate à l'acidité de l'acide acétique.

c) Concentration en OH^- :

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \times C} = \sqrt{5,56 \times 10^{-10} \times 0,05} = 5,27 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

Application de la formule des bases faibles à la concentration C .

d) **pOH et pH** :

$$\text{pOH} = -\log(5,27 \times 10^{-6}) = 5,28$$

$$\text{pH} = 14,00 - \text{pOH} = 14,00 - 5,28 = 8,72$$

Conclusion Le point d'équivalence marque la fin de la zone tampon et le début d'une dominance basique. Le pH de 8,72 témoigne de l'hydrolyse de l'ion acétate et constitue une preuve expérimentale de la faiblesse de l'acide acétique initial.

Phase 4 : Après l'Équivalence ($V_B = 15 \text{ mL}$)

Équation de réaction	CH_3COOH	+	NaOH	$\longrightarrow$	CH_3COONa	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,5 \cdot 10^{-3}$		0		–
État final (mol)	0		$5,0 \cdot 10^{-4}$		$1,0 \cdot 10^{-3}$		–
	Acide faible		Base forte		Sel Basique		

Le Renversement Complet de Situation Après l'équivalence, nous assistons à un changement de régime fondamental :

- Disparition totale de l'acide acétique initial
- Apparition d'un excès de base forte NaOH
- Présence résiduelle de l'acétate de sodium formé

Pourquoi la Base Forte Domine-t-elle ? Dans cette zone, deux espèces basiques coexistent :

- La base forte NaOH : Totalelement dissociée, elle impose sa basicité
- L'ion acétate CH_3COO^- : Base faible, son influence est négligeable devant la base forte.

Le pH est donc **exclusivement contrôlé ou imposé** par l'excès de base forte, selon le même principe que dans le dosage acide fort base forte.

Calcul Détaillé du pH

$$\text{Concentration en } \text{OH}^- : [\text{OH}^-] = \frac{n_{\text{OH}^-}}{V_{\text{total}}} = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{0,025} = 0,020 \text{ mol/L}$$

$$\text{Calcul du pOH} : \text{pOH} = -\log(0,020) = -\log(2,0 \times 10^{-2}) = 1,70$$

$$\text{Calcul du pH} : \text{pH} = 14,00 - \text{pOH} = 14,00 - 1,70 = 12,30$$

Conclusion Après l'équivalence, le système perd sa complexité et se comporte comme une simple solution de base forte. La courbe de dosage rejoint asymptotiquement celle du dosage acide fort-base forte, marquant la fin du comportement spécifique des acides faibles.

Caractéristiques Remarquables du Dosage Acide Faible-Base Forte

- **Zone tampon** : Entre le début du dosage et l'équivalence, le mélange acide faible/sa base conjuguée constitue une solution tampon
- **Demi-équivalence** : Point où $\text{pH} = \text{p}K_a$, crucial pour la détermination expérimentale du $\text{p}K_a$
- **Équivalence basique** : Le pH à l'équivalence est supérieur à 7 en raison de l'hydrolyse de l'ion acétate
- **Saut de pH moins marqué** : La variation de pH autour de l'équivalence est moins brutale que dans le cas acide fort-base forte

Acide faible	Base conjuguée	$\text{p}K_a$	K_a
CH_3COOH (acide acétique)	CH_3COO^- (ion acétate)	4,76	$1,8 \times 10^{-5}$
HCOOH (acide formique)	HCOO^- (ion formiate)	3,75	$1,8 \times 10^{-4}$
HF (acide fluorhydrique)	F^- (ion fluorure)	3,17	$6,8 \times 10^{-4}$

Le compartement des acides faible dans un dosage avec une base forte : Ce graphe comparatif révèle plusieurs enseignements fondamentaux sur le dosage des acides faibles :

- **Impact du $\text{p}K_a$ sur la position de la courbe** : Plus le $\text{p}K_a$ est faible, plus la courbe est décalée vers les pH bas en début de dosage. L'acide fluorhydrique (HF , $\text{p}K_a = 3,17$) commence à $\text{pH} \approx 2,0$ alors que l'acide acétique (CH_3COOH , $\text{p}K_a = 4,76$) débute à $\text{pH} 2,9$.
- **Zones tampons caractéristiques** : Chaque courbe présente un **palier** centré sur son $\text{p}K_a$ respectif. C'est dans cette zone que le pouvoir tampon est maximal, où le pH varie peu malgré l'ajout de base.
- **Points de demi-équivalence** : Le **point d'inflexion** de chaque courbe correspond exactement au $\text{p}K_a$ de l'acide ($\text{pH} = \text{p}K_a$ lorsque $V_B = \frac{V_{eq}}{2}$). Ce point est crucial pour la détermination expérimentale des constantes d'acidité.




Figure 5.4 Dosage d'acides faibles (CH_3COOH , HCOOH et HF) par NaOH

- **pH à l'équivalence** : Contrairement aux acides forts, tous les pH à l'équivalence sont **supérieurs à 7**. Plus l'acide est faible (pK_a élevé), plus le pH à l'équivalence est basique : $\text{HF} (\approx 8,2) < \text{HCOOH} (\approx 8,5) < \text{CH}_3\text{COOH} (\approx 8,7)$.
- **Saut de pH à l'équivalence** : L'amplitude du saut pH-métrique diminue lorsque le pK_a augmente. Les acides plus faibles donnent des transitions **plus progressives**, ce qui rend le repérage du point équivalent plus délicat.

Remarques importantes :

- **Précision du dosage** : Les acides avec des pK_a plus élevés (CH_3COOH) présentent des sauts de pH moins nets, réduisant la précision du repérage de l'équivalence.
- **Validation expérimentale** : Ces courbes confirment la relation fondamentale $\text{pH} = pK_a$ à la demi-équivalence, permettant de vérifier la cohérence des mesures expérimentales.

Cette comparaison visuelle illustre parfaitement comment la constante d'acidité K_a influence toutes les caractéristiques d'un dosage acide-base : position initiale, zone tampon, pH à l'équivalence et netteté du virage. Elle souligne l'importance de connaître le pK_a pour optimiser les conditions opératoires d'un dosage.

Conclusion

Le dosage d'un acide faible par une base forte illustre parfaitement l'importance des équilibres acido-basiques et des solutions tampons. Contrairement au cas acide fort-base forte où le pH à l'équivalence est toujours 7, ici le pH à l'équivalence dépend de la force de l'acide faible utilisé. Cette étude montre la richesse et la complexité des systèmes acido-basiques en solution aqueuse.

Phases dosage acide par base forte	V_B (mL)	pH Acide Fort	pH Acide Faible
Initial	0	1,00	2,87
Demi-équivalence	5	1,48	4,74
Équivalence	10	7,00	8,72
Après équivalence	15	12,30	12,30

Tableau 5.1 Comparaison des pH lors du dosage d'un acide fort et d'un acide faible Par une base forte.


5.2.9. Le Dosage Base Faible par un Acide Fort : La Symétrie Inversée

Contrairement au dosage précédent où l'acide faible dictait sa loi, nous inversons maintenant les rôles : la base faible règne en maître dans le bécher, et l'acide fort joue l'assaillant progressif. Cette symétrie apparente cache pourtant une

dynamique unique où la base faible, telle l'ammoniac NH_3 , dévoile sa stratégie avec parcimonie, créant des équilibres subtils et des zones tampons basiques qui rendent ce dosage tout aussi fascinant.

5.2.9.1. Les Combattants : Une Base "Stratège" et un Acide "Brutal"

La base faible (NH_3) : une stratégie équilibrée Une base faible n'est que partiellement protonée en solution aqueuse. Elle établit un équilibre dynamique :




Cet équilibre est caractérisé par sa constante de basicité K_b :

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = 1,8 \times 10^{-5} \quad \text{avec} \quad \text{p}K_b = 4,74$$


Soit pour le couple acide-base conjugué ($\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$) : $\text{p}K_a = 9,26$

L'acide fort (HCl) : la force transparente Comme précédemment, l'acide fort se dissocie totalement :



5.2.9.2. Le Mécanisme Réactionnel "Une Neutralisation Progressive" :

La réaction de dosage s'écrit :



Cette réaction est totale ($K \gg 1$), mais son déroulement présente la même complexité stratégique que le cas précédent. La complexité de ce dosage ne provient pas d'une "progression lente", mais de la superposition de deux équilibres acido-basiques qui interagissent. Analysons-le mécaniste :

- a) **L'Équilibre Fondamental de la Base Faible** : La solution initiale d'ammoniac n'est pas une simple solution d'ions OH^- . Elle est régie par l'équilibre de dissociation de la base faible :



La concentration initiale en ions OH^- est donc faible et dépend de cette constante K_b .

- b) **Le Mécanisme de Neutralisation et le Déplacement d'Équilibre** : Lors de l'ajout d'acide fort (H_3O^+), les ions OH^- présents en solution sont les premiers à être neutralisés :



Cette consommation d'ions OH^- **déplace l'équilibre (1) vers la droite**, selon le principe de Le Chatelier. Pour compenser la perte de OH^- , de nouvelles molécules d'ammoniac NH_3 sont protonées, générant à la fois des ions NH_4^+ et des ions OH^- .

- c) **Conséquence : La Zone Tampon Basique** : Ce mécanisme de compensation est la définition même de l'effet tampon. Le couple $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ absorbe les ions H_3O^+ ajoutés, ce qui explique pourquoi le pH varie très peu sur une large plage de volume d'acide ajouté. Le système résiste au changement de pH.
- d) **Le Point d'Équivalence : Un Renversement de Situation** : À l'équivalence, toute la base faible initiale (NH_3) a été convertie en son acide conjugué (NH_4^+). La solution ne contient donc plus de base, mais uniquement l'acide faible NH_4^+ et des ions spectateurs. Cet ion NH_4^+ est maintenant l'espèce majoritaire et impose son propre équilibre :



Puisque NH_4^+ est un acide (même faible), il libère des ions H_3O^+ dans la solution. Par conséquent, **le pH à l'équivalence est obligatoirement acide**.

C'est donc la succession de ces deux régimes — un premier régime tampon dominé par le couple $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$, suivi d'un second régime acide dominé par l'hydrolyse de NH_4^+ — qui définit la courbe de pH de ce dosage.

5.2.9.3. Étude Détaillée des Différentes phases du Dosage

Considérons le dosage de $V_B = 10 \text{ mL}$ d'ammoniac $C_B = 0,1 \text{ M}$ par acide chlorhydrique $C_A = 0,1 \text{ M}$.

Phase 1 : Avant l'Équivalence :

La zone avant l'équivalence se caractérise par un excès de base faible. On peut la diviser en deux sous-phases distinctes :

Première sous-phase : La solution de base faible pure ($V_A = 0 \text{ mL}$) À ce stade initial, nous avons une solution d'ammoniac pure. Le pH est déterminé uniquement par l'équilibre de basicité de la base faible, le pH se calcule par :

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b C_B} = \sqrt{1,8 \times 10^{-5} \times 0,1} = 1,34 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(1,34 \times 10^{-3}) = 2,87 \Rightarrow \text{pH} = 14,00 - 2,87 = \boxed{11,13}$$

Deuxième sous-phase : La zone tampon ($0 < V_A < V_{eq}$) Dès la première goutte d'acide ajoutée ($V_A > 0$), la situation change radicalement. Nous entrons dans le domaine de la solution tampon basique, où coexistent la base faible restante et son acide conjugué formé. Cette zone, qui s'étend jusqu'à l'équivalence, présente des propriétés remarquables de résistance aux variations de pH.

Situation à $V_A = 1 \text{ mL}$ (Début du Dosage)

Équation de réaction	NH_3	+	HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,0 \cdot 10^{-4}$		0		—
État final (mol)	$9,0 \cdot 10^{-4}$		0		$1,0 \cdot 10^{-4}$		—
	Base faible		Acide fort		Sel acide		

À ce stade précoce du dosage, nous sommes en présence d'un mélange entre la base faible NH_3 et le chlorure d'ammonium NH_4Cl . Ce sel, en solution aqueuse, fournit :

- Un ion spectateur Cl^- qui n'influence pas le pH
- L'ion ammonium NH_4^+ , acide conjugué de l'ammoniac

Nous avons donc une base faible et son acide conjugué, ce qui constitue exactement la définition d'une solution tampon :

Bilan des espèces actives :

- Base faible restante : $9,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$
- Acide conjugué formé : $1,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$
- Volume total : $V_{\text{total}} = 11,0 \text{ mL}$

Alors l'application de la relation de Henderson-Hasselbalch est primordiale :

$$\text{pH} = \text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) + \log\left(\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}\right) = 9,26 + \log\left(\frac{0,9}{0,1}\right)$$

$$\text{pH} = 9,26 + \log(9) = 9,26 + 0,95 = \boxed{10,21}$$

Interprétation

- Le pH a diminué de 11,13 à 10,21
- La solution développe des propriétés tampon en milieu basique
- Le rapport $[\text{NH}_3]/[\text{NH}_4^+]$ est encore élevé (9,0)
- La base faible domine largement le milieu

Phase 2 à $V_A = 5 \text{ mL}$ (Demi-Équivalence)

Équation de réaction	NH_3	+	HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$5,0 \cdot 10^{-4}$		0		—
État final (mol)	$5,0 \cdot 10^{-4}$		0		$5,0 \cdot 10^{-4}$		—
	Base faible		Acide fort		Sel acide		

Analyse détaillée de ce point remarquable À la demi-équivalence, nous atteignons une situation d'équilibre parfaite :

- Égalité stoechiométrique parfaite :

$$[\text{NH}_3] = [\text{NH}_4^+] = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Exactement la moitié de la base initiale a été convertie en son acide conjugué.

- Relation de Henderson-Hasselbalch simplifiée :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 9,26 + \log(1) = \boxed{9,26}$$


Le pH devient **indépendant des concentrations absolues** et égale exactement le $\text{p}K_a$ du couple.

- **Pouvoir tampon maximal** : La solution présente des propriétés tampon **optimales** en milieu basique.

Phase 3 : Le Point d'Équivalence ($V_A = 10 \text{ mL}$)

Équation de réaction	NH_3	+	HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,0 \cdot 10^{-3}$		0		–
État final (mol)	0		0		$1,0 \cdot 10^{-3}$		–
	Base faible		Acide fort		Sel acide		

Pourquoi un pH Acide à l'Équivalence ? Contrairement au dosage base forte-acide fort où le pH à l'équivalence est neutre ($\text{pH} = 7$), ici l'équivalence donne un pH **acide** ($\text{pH} < 7$), car l'ion ammonium NH_4^+ est l'**acide conjugué** d'une base faible. En solution aqueuse, il subit une hydrolyse :



Cette réaction libère des ions H_3O^+ , rendant la solution acide.

Calcul Détaillé du pH

a) Concentration de l'ammonium :

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{1,0 \times 10^{-3}}{20 \times 10^{-3}} = 0,05 \text{ mol/L}$$

b) Concentration en H_3O^+ :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a \times C} = \sqrt{5,56 \times 10^{-10} \times 0,05} = 5,27 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$$

c) Calcul du pH :

$$\text{pH} = -\log(5,27 \times 10^{-6}) = 5,28$$

Phase 4 : Après l'Équivalence ($V_A = 15 \text{ mL}$)

Équation de réaction	NH_3	+	HCl	$\longrightarrow$	NH_4Cl	+	H_2O
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,5 \cdot 10^{-3}$		0		–
État final (mol)	0		$5,0 \cdot 10^{-4}$		$1,0 \cdot 10^{-3}$		–
	Base faible		Acide fort		Sel acide		

Le pH est contrôlé par l'excès d'acide fort :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{0,025} = 0,020 \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log(0,020) = 1,70$$

Comparaison des Dosages Base Forte / Base Faible par Acide Fort

Phases dosage base par acide fort	V_A (mL)	pH Base Forte	pH Base Faible
Initial	0	13,00	11,13
Demi-équivalence	5	12,52	9,26
Équivalence	10	7,00	5,28
Après équivalence	15	1,70	1,70

Tableau 5.2 Comparaison des pH lors du dosage d'une base forte et d'une base faible par un acide fort

Caractéristiques Remarquables du Dosage Base Faible-Acide Fort

- **Zone tampon basique** : Entre le début du dosage et l'équivalence
- **Demi-équivalence** : Point où $\text{pH} = \text{p}K_a$ du couple acide-base
- **Équivalence acide** : Le pH à l'équivalence est inférieur à 7
- **Symétrie parfaite** avec le dosage acide faible-base forte




Figure 5.5 Dosage d'acides faibles (N_2H_4 , NH_3 et CH_3NH_2) par HCl

Base faible	Acide conjuguée	pK_a	K_a
CH_3NH_2 (méthylamine)	CH_3NH_3^+ (ion méthylammonium)	10,64	$2,3 \times 10^{-11}$
NH_3 (ammoniac)	NH_4^+ (ion ammonium)	9,26	$5,6 \times 10^{-10}$
N_2H_4 (hydrazine)	N_2H_5^+ (ion hydrazinium)	7,94	$1,2 \times 10^{-8}$

Caractéristiques fondamentales du dosage base faible - acide fort

Le dosage d'une base faible par un acide fort présente des particularités remarquables qui le distinguent du cas base forte-acide fort :

- **Solution tampon** : Avant l'équivalence, le mélange base faible/son acide conjugué forme un système tampon qui résiste aux variations de pH
- **Demi-équivalence** : Point caractéristique où $\text{pH} = \text{pK}_a$, permettant la détermination expérimentale de la constante d'acidité du couple acide-base
- **Équivalence** : Le pH au point équivalent est inférieur à 7 en raison de l'hydrolyse de l'acide conjugué formé
- **Transition progressive** : La variation de pH autour de l'équivalence est moins brutale que dans le cas base forte-acide fort

Conclusion


Le dosage base faible-acide fort complète magnifiquement notre panorama. Il illustre la belle symétrie des phénomènes acido-basiques tout en maintenant la richesse des équilibres chimiques qui rendent ces dosages si instructifs.

5.2.10. Le Dosage Acide Faible par Base Faible : Le Duel des Stratèges

Nous arrivons au cas le plus sophistiqué et le plus riche en enseignements : la rencontre de deux combattants "stratèges". Contrairement aux dosages précédents où un protagoniste imposait sa loi par sa force brute, nous assistons ici à un véritable duel tactique où l'acide faible et la base faible déploient toute leur subtilité. Chaque goutte ajoutée déclenche une cascade d'équilibres entrelacés, créant une chorégraphie chimique d'une complexité fascinante.


5.2.10.1. Les Combattants : Deux Stratèges en Équilibre

L'acide faible (CH_3COOH) : Comme nous le connaissons déjà, l'acide acétique maintient son équilibre caractéristique :




avec $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$ et $\text{pK}_a = 4,74$

La base faible (CH_3NH_2) La méthylamine : L'ammoniac déploie sa propre stratégie d'équilibre :



avec $K_b = 4,4 \times 10^{-4}$ et $\text{p}K_b = 3,36 \Rightarrow \text{p}K_a = 10,64$

Le Mécanisme Réactionnel : Une Danse d'Équilibres Entrelacés La réaction globale s'écrit :



Contrairement aux dosages précédents où un réactif était toujours limitant, ici nous naviguons constamment dans un **régime d'équilibre**. La réaction n'atteint jamais la totalité car les constantes d'acidité et de basicité sont du même ordre de grandeur.

Étude Détaillée des Différentes Situations Considérons le dosage de $V_A = 10 \text{ mL}$ d'acide acétique $C_A = 0,1 \text{ M}$ par de la méthylamine $C_B = 0,1 \text{ M}$.

Phase 1 : Avant l'équivalence :

Première sous-phase ($V_B = 0 \text{ mL}$) Seul l'acide acétique est présent. Donc c'est très simple le pH est celui d'un acide acétique CH_3COOH :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a C_A} = \sqrt{1,8 \times 10^{-5} \times 0,1} = 1,34 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = 2,87$$

Deuxième sous-phase ($V_B = 1 \text{ mL}$) La zone tampon ($0 < V_a < V_{eq}$) exactement pareil que la deuxième sous-phase du dosage acide faible par une Base forte, un domaine de la solution tampon acide, où deux espèces coexistent de nature différente qui forme un couple Acide/Base conjuguée. et ça contenu dans le même rythme jusqu'à l'équivalence.

Équation	CH_3COOH	+	CH_3NH_2	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	CH_3NH_3^+
État initial (mol)	$1,0 \times 10^{-3}$		$0,1 \times 10^{-3}$		0		0
État final (mol)	$(1,0 \times 10^{-3}) - x$		$(0,1 \times 10^{-3}) - x$		x		x

Important

La Règle Générale et le spectre de possibilités : Pour la réaction : $\text{HA} + \text{B} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{HB}^+$

$$K = \frac{[\text{A}^-][\text{HB}^+]}{[\text{HA}][\text{B}]} \times \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \left(\frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]} \right) \times \left(\frac{[\text{HB}^+]}{[\text{B}][\text{H}_3\text{O}^+]} \right)$$

$$K = K_a(\text{HA}) \times \frac{1}{K_a(\text{HB}^+)} = \frac{K_a(\text{HA})}{K_a(\text{HB}^+)}$$

Passage à la notation logarithmique (pK) En prenant le logarithme décimal de l'expression :

$$\log K = \log K_a(\text{HA}) - \log K_a(\text{HB}^+) \Rightarrow \text{p}K = \text{p}K_a(\text{HA}) - \text{p}K_a(\text{HB}^+)$$

Et donc, en repassant à l'exponentielle :

$$K = 10^{\text{p}K_a(\text{HA}) - \text{p}K_a(\text{HB}^+)} = 10^{\text{p}K_a(\text{acide conjugué de la base}) - \text{p}K_a(\text{acide})}$$

Interprétation physique :

- $\Delta \text{p}K_a = \text{p}K_a(\text{HB}^+) - \text{p}K_a(\text{HA})$
- $\Delta \text{p}K_a = 0$: $K = 1$ (équilibre parfait)
- $\Delta \text{p}K_a = 1$: $K = 10$ (légèrement favorisé)
- $\Delta \text{p}K_a = 2$: $K = 100$ (nettement favorisé)
- $\Delta \text{p}K_a = 3$: $K = 1000$ (très favorisé)
- $\Delta \text{p}K_a = 4$: $K = 10^4$ (quasi-total)
- $\Delta \text{p}K_a = -1$: $K = 0,1$ (légèrement défavorisé)
- $\Delta \text{p}K_a = -2$: $K = 0,01$ (nettement défavorisé)

Calcul détaillé des quantités à l'équilibre Volume total : $V = 11 \text{ mL} = 0,011 \text{ L}$

Résolution : Soit x l'avancement à l'équilibre (en mol). Les concentrations s'écrivent :

$$\begin{aligned}
[\text{CH}_3\text{COOH}] &= [\text{CH}_3\text{NH}_2] = \frac{1,0 \times 10^{-3} - x}{0,011} \\
[\text{CH}_3\text{NH}_2] &= \frac{0,1 \times 10^{-3} - x}{0,011} \\
[\text{CH}_3\text{COO}^-] &= [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = \frac{x}{0,011}
\end{aligned}$$

L'expression de la constante d'équilibre :

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{CH}_3\text{NH}_2]} = \frac{\left(\frac{x}{0,011}\right)^2}{\left(\frac{1,0 \times 10^{-3} - x}{0,011}\right)\left(\frac{0,1 \times 10^{-3} - x}{0,011}\right)}$$


Le Spectre des Possibilités :

— Réaction extrême défavorisé ($\Delta pK_a = -6$) :



$$\Delta pK_a = 4,6 - 9,2 = -4,6 \Rightarrow K = 10^{-4,6} \approx 2,5 \times 10^{-5}$$

— Réaction équilibré ($\Delta pK_a \approx 0$) Les 4 espèces coexistent en proportions comparables.



$$\Delta pK_a = 4,6 - 4,74 = -0,14 \Rightarrow K = 10^{-0,14} \approx 0,72$$

— Notre cas ($\Delta pK_a = 5,9$)

$$pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,74 \quad \text{et} \quad pK_a(\text{CH}_3\text{NH}_3^+) = 10,64$$

$$\Delta pK_a = 10,64 - 4,74 = 5,90 \Rightarrow K = 10^{5,90} \approx 7,94 \times 10^5$$

$$K \approx 8 \times 10^5 \quad (\text{très fortement favorisé})$$

— Réaction extrême favorisé ($\Delta pK_a = 6$)



$$\Delta pK_a = 9,26 - 3,17 = 6,09 \Rightarrow K = 10^{6,09} \approx 1,2 \times 10^6$$

C'est l'un des cas les plus favorisés entre acides/bases faibles courants.

Règle pratique pour les dosages :

- $\Delta pK_a > 4$: Dosage possible avec saut de pH net
- $2 < \Delta pK_a < 4$: Dosage difficile, saut de pH flou
- $\Delta pK_a < 2$: Dosage impossible pratiquement

Résolution de l'équation d'équilibre On considère l'équation :

$$7,94 \times 10^5 = \frac{x^2}{(1,0 \times 10^{-3} - x)(0,1 \times 10^{-3} - x)}$$

1. Mise sous forme polynomiale En posant :

$$a = 1,0 \times 10^{-3}, \quad b = 0,1 \times 10^{-3}, \quad K = 7,94 \times 10^5,$$

on développe :

$$K(ab - (a+b)x + x^2) = x^2.$$

2. Réorganisation de l'équation

$$K ab - K(a+b)x + Kx^2 = x^2 \Rightarrow (K-1)x^2 - K(a+b)x + Kab = 0.$$

3. Substitution numérique

$$\begin{aligned}A &= K - 1 = 7,94 \times 10^5 - 1 \approx 7,94 \times 10^5 \\B &= -K(a + b) = -7,94 \times 10^5 \times (1,1 \times 10^{-3}) = -873,4 \\C &= Kab = 7,94 \times 10^5 \times (1,0 \times 10^{-7}) = 0,0794\end{aligned}$$

On obtient donc :

$$7,94 \times 10^5 x^2 - 873,4x + 0,0794 = 0$$

4. Calcul du discriminant

$$\begin{aligned}\Delta &= B^2 - 4AC = (-873,4)^2 - 4 \times (7,94 \times 10^5) \times 0,0794 \\ \Delta &= 7,626 \times 10^5 - 2,522 \times 10^5 = 5,104 \times 10^5 \\ \sqrt{\Delta} &\approx 714,4\end{aligned}$$

5. Calcul des racines

$$\begin{aligned}x &= \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} = \frac{873,4 \pm 714,4}{1,588 \times 10^6} \\ \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{873,4 - 714,4}{1,588 \times 10^6} = 1,00 \times 10^{-4} \\ x_2 = \frac{873,4 + 714,4}{1,588 \times 10^6} = 9,99 \times 10^{-4} \end{cases}\end{aligned}$$

6. Choix de la solution physique L'avancement x ne peut pas dépasser la plus petite des quantités initiales ($n_{\text{CH}_3\text{NH}_2} = 0,1 \times 10^{-3}$ mol). Ainsi, $x_2 > 0,1 \times 10^{-3}$ est impossible.

$$x = 1,00 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

7. Bilan des quantités à l'équilibre

$$\Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{\text{final}} = 1,0 \times 10^{-3} - 1,00 \times 10^{-4} = 9,00 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ n_{\text{CH}_3\text{NH}_2}^{\text{final}} = 0,1 \times 10^{-3} - 1,00 \times 10^{-4} = 0 \text{ mol} \\ n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^{\text{final}} = n_{\text{CH}_3\text{NH}_3^+}^{\text{final}} = 1,00 \times 10^{-4} \text{ mol} \end{cases}$$

Calcul des concentrations et du pH Le volume total $V = 11$ mL donne :

$$\begin{aligned}[\text{CH}_3\text{COOH}] &= \frac{9,00 \times 10^{-4}}{0,011} = 8,18 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \\ [\text{CH}_3\text{COO}^-] &= \frac{1,00 \times 10^{-4}}{0,011} = 9,09 \times 10^{-3} \text{ mol/L}\end{aligned}$$

Calcul du pH par l'équation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + \log\left(\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}\right) = 4,74 + \log\left(\frac{9,09 \times 10^{-3}}{8,18 \times 10^{-2}}\right) = 4,74 + \log(0,111).$$

$$\text{pH} = 3,79$$

Vérification de la validité de l'approximation

$$[\text{CH}_3\text{NH}_2] = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}{K[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{(9,09 \times 10^{-3})^2}{(7,94 \times 10^5)(8,18 \times 10^{-2})} \approx 1,3 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$$

Cette valeur est totalement négligeable, confirmant la validité de l'approximation de réaction totale.

Observation importante À $V_B = 1$ mL :

- **Rapport** [base]/[acide] = **0,111** : le système tampon commence à se former.
- **pH = 3,79** : augmentation modérée par rapport au pH initial (2,87).
- **Réaction quasi-totale** : la méthylamine ajoutée est entièrement convertie.
- **Régime tampon émergent** : coexistence d'acide faible et de sa base conjuguée.

Cette situation illustre le comportement typique d'un dosage en **régime tampon**, où le pH évolue lentement grâce à l'effet stabilisateur du couple acide/base conjuguée.

Phase 2 : Démi-Equivalence à $V_B = 5 \text{ mL}$: La Complexité Révélée

Équation	CH_3COOH	+	CH_3NH_2	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	CH_3NH_3^+
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$0,5 \cdot 10^{-3}$		0		0
État final (mol)	$(1,0 \cdot 10^{-3}) - x$		$(0,5 \cdot 10^{-3}) - x$		x		x

Calcul détaillé des quantités à l'équilibre Volume total : $V = 15 \text{ mL} = 0,015 \text{ L}$

Résolution :

Soit x l'avancement à l'équilibre (en mol). Les concentrations s'écrivent :

$$\begin{aligned} [\text{CH}_3\text{COOH}] &= \frac{1,0 \times 10^{-3} - x}{0,015} \\ [\text{CH}_3\text{NH}_2] &= \frac{0,5 \times 10^{-3} - x}{0,015} \\ [\text{CH}_3\text{COO}^-] &= [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = \frac{x}{0,015} \end{aligned}$$

L'expression de la constante d'équilibre :

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{CH}_3\text{NH}_2]} = \frac{\left(\frac{x}{0,015}\right)^2}{\left(\frac{1,0 \times 10^{-3} - x}{0,015}\right)\left(\frac{0,5 \times 10^{-3} - x}{0,015}\right)}$$

Résolution de l'équation d'équilibre On considère l'équation :

$$7,94 \times 10^5 = \frac{x^2}{(1,0 \times 10^{-3} - x)(0,5 \times 10^{-3} - x)}$$

On obtient donc :

$$7,94 \times 10^5 x^2 - 1191x + 0,397 = 0.$$

discriminant :

$$\begin{aligned} \Delta &= B^2 - 4AC = (-1191)^2 - 4 \times (7,94 \times 10^5) \times 0,397 = 1,576 \times 10^5 \\ \sqrt{\Delta} &\approx 397,0 \end{aligned}$$

Calcul des racines : $x = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1191 - 397,0}{1,587998 \times 10^6} = 5,00 \times 10^{-4} \\ x_2 = \frac{1191 + 397,0}{1,587998 \times 10^6} = 1,00 \times 10^{-3} \end{cases}$$

6. Choix de la solution physique L'avancement x ne peut pas dépasser la plus petite des quantités initiales ($n_{\text{CH}_3\text{NH}_2} = 0,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$). Ainsi, $x_2 > 0,5 \times 10^{-3}$ est impossible.

$$x = 5,00 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

7. Vérification de cohérence chimique

$$\Rightarrow \begin{cases} n_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{\text{final}} = 1,0 \times 10^{-3} - x = 5,0 \times 10^{-4} \\ n_{\text{CH}_3\text{NH}_2}^{\text{final}} = 0,5 \times 10^{-3} - x \approx 0. \\ n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^{\text{final}} = n_{\text{CH}_3\text{NH}_3^+}^{\text{final}} = x = 5,0 \times 10^{-4} \end{cases}$$

Le volume total $V = 15 \text{ mL}$ donne :

$$\begin{aligned} [\text{CH}_3\text{COOH}] &= [\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{0,015} = 3,33 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \\ \Rightarrow \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} &\approx 1 \Rightarrow \text{pH} \approx \text{p}K_a = 4,74 \end{aligned}$$

L'avancement $x \approx 5,0 \times 10^{-4}$ mol confirme que la réaction est **quasi totale** ($K = 7,9 \times 10^5$), et que le mélange à mi-titrage forme un **tampon acide acétique / acétate d'ammonium**.

Vérification de la validité de l'approximation : À l'équilibre la constante s'écrit

$$K = \frac{[A^-][BH^+]}{[HA][B]}$$

d'où

$$[B] = [CH_3NH_2] = \frac{[A^-][BH^+]}{K[HA]}$$

Aux conditions du mi-titrage nous avons approximativement

$$[A^-] \approx [BH^+] \approx \frac{5,00 \times 10^{-4}}{0,015} = 3,33 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

donc

$$[CH_3NH_2] \approx \frac{0,03333}{7,94 \times 10^5} \approx 4,2 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$$

La quantité résiduelle correspondante vaut

$$n_{CH_3NH_2}^{final} = [CH_3NH_2] \times V \approx 4,2 \times 10^{-8} \times 0,015 \approx 6,3 \times 10^{-10} \text{ mol},$$

ce qui est négligeable devant les autres quantités présentes. Cette valeur confirme que l'approximation de "réaction quasi totale" est parfaitement valide pour ce cas.

Observation fondamentale : À mi-parcours ($V_B = 5 \text{ mL}$), le rapport $[A^-]/[HA] \approx 1$, d'où

$$\text{pH} \approx \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,74$$

"La question que se pose maintenant est la suivante : au point de demi-équivalence, nous obtenons un $\text{pH} = \text{p}K_a$, ce qui était prévisible pour un système tampon. Cependant, cette situation est différente de la première sous-phase où nous avions un acide faible pur. La méthode de calcul reste-t-elle la même pour tous les points avant l'équivalence ?"

Phase 3 : L'Équivalence à $V_B = 10 \text{ mL}$:

Équation	CH_3COOH	+	CH_3NH_2	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	CH_3NH_3^+
État initial (mol)	$1,0 \times 10^{-3}$		$1,0 \times 10^{-3}$		0		0
État final (mol)	$(1,0 \times 10^{-3}) - x$		$(1,0 \times 10^{-3}) - x$		x		x

Calcul détaillé des quantités à l'équilibre Volume total : $V = 20 \text{ mL} = 0,020 \text{ L}$

Résolution :

Soit x l'avancement à l'équilibre (en mol). Les concentrations s'écrivent :

$$\begin{aligned} [\text{CH}_3\text{COOH}] &= \frac{1,0 \times 10^{-3} - x}{0,020} \\ [\text{CH}_3\text{NH}_2] &= \frac{1,0 \times 10^{-3} - x}{0,020} \\ [\text{CH}_3\text{COO}^-] &= [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = \frac{x}{0,020} \end{aligned}$$

L'expression de la constante d'équilibre :

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{CH}_3\text{NH}_2]} = \frac{\left(\frac{x}{0,020}\right)^2}{\left(\frac{1,0 \times 10^{-3} - x}{0,020}\right)^2}$$

Résolution de l'équation d'équilibre On considère l'équation :

$$7,94 \times 10^5 = \frac{x^2}{(1,0 \times 10^{-3} - x)^2} \Rightarrow \sqrt{7,94 \times 10^5} = \frac{x}{1,0 \times 10^{-3} - x} \Leftrightarrow 891,1 = \frac{x}{1,0 \times 10^{-3} - x}$$

Résolution

$$\begin{aligned}
 891,1(1,0 \times 10^{-3} - x) &= x \\
 8,911 \times 10^{-1} - 891,1x &= x \\
 8,911 \times 10^{-1} &= 892,1x \\
 x &= \frac{8,911 \times 10^{-1}}{892,1} = 9,99 \times 10^{-4} \text{ mol}
 \end{aligned}$$

$$x \approx 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Bilan des quantités de matière à l'équilibre

Équation	CH ₃ COOH	+	CH ₃ NH ₂	$\rightleftharpoons$	CH ₃ COO ⁻	+	CH ₃ NH ₃ ⁺
État initial (mol)	1,0 × 10 ⁻³		1,0 × 10 ⁻³		0		0
État final (mol)	0		0		1,0 × 10 ⁻³		1,0 × 10 ⁻³

Calcul du pH à l'équivalence À l'équivalence, nous avons essentiellement une solution de **acétate de méthylammonium** CH₃COO⁻CH₃NH₃⁺, qui est un sel d'acide faible et de base faible.

Méthode de calcul : Pour un sel A⁻B⁺ d'acide faible et base faible, le pH est donné par :

$$\text{pH} = \frac{\text{p}K_a(\text{HA}) + \text{p}K_a(\text{BH}^+)}{2}$$

Démonstration de la formule : $\text{pH} = \frac{\text{p}K_a(\text{HA}) + \text{p}K_a(\text{BH}^+)}{2}$

Contexte : Nous avons un sel A⁻B⁺ en solution, issu de la réaction entre l'acide HA et la base B.

Équilibres en jeu :

- (1) A⁻ + H₂O $\rightleftharpoons$ HA + OH⁻ (basicité de A⁻)
- (2) B⁺ + H₂O $\rightleftharpoons$ B + H₃O⁺ (acidité de B⁺)

Constantes d'équilibre :

$$\begin{aligned}
 K_b(\text{A}^-) &= \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = \frac{K_e}{K_a(\text{HA})} \\
 K_a(\text{B}^+) &= \frac{[\text{B}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{B}^+]}
 \end{aligned}$$

Équation d'électroneutralité :

$$[\text{B}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{A}^-] + [\text{OH}^-]$$

Conservation de la matière :

$$[\text{HA}] + [\text{A}^-] = C \quad \text{et} \quad [\text{B}] + [\text{B}^+] = C$$

Approximations pour un sel concentré : Pour C suffisamment grand, on peut négliger [H₃O⁺] et [OH⁻] devant [A⁻] et [B⁺] :

$$[\text{B}^+] \approx [\text{A}^-] \approx C$$

Expression des concentrations des espèces minoritaires : Des constantes d'équilibre, on tire :

$$\begin{aligned}
 [\text{HA}] &= \frac{[\text{A}^-][\text{OH}^-]}{K_b(\text{A}^-)} \approx \frac{C[\text{OH}^-]}{K_e/K_a(\text{HA})} = \frac{CK_a(\text{HA})[\text{OH}^-]}{K_e} \\
 [\text{B}] &= \frac{[\text{B}^+][\text{H}_3\text{O}^+]}{K_a(\text{B}^+)} \approx \frac{C[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_a(\text{B}^+)}
 \end{aligned}$$

Équation fondamentale : De la conservation de la matière, on a aussi :

$$[\text{HA}] \approx [\text{B}]$$

Car les protons "perdus" par B^+ sont "gagnés" par A^- .

Donc :

$$\frac{CK_a(\text{HA})[\text{OH}^-]}{K_e} \approx \frac{C[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_a(\text{B}^+)}$$

Simplification : On simplifie par C :

$$\frac{K_a(\text{HA})[\text{OH}^-]}{K_e} \approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_a(\text{B}^+)}$$

Mais $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$, donc :

$$\frac{K_a(\text{HA}) \cdot \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]}}{K_e} \approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_a(\text{B}^+)}$$

Élimination de K_e :

$$\frac{K_a(\text{HA})}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_a(\text{B}^+)}$$

Relation finale :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 \approx K_a(\text{HA}) \cdot K_a(\text{B}^+)$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a(\text{HA}) \cdot K_a(\text{B}^+)}$$

Passage au pH :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log \sqrt{K_a(\text{HA}) \cdot K_a(\text{B}^+)}$$

$$\text{pH} = -\frac{1}{2} [\log K_a(\text{HA}) + \log K_a(\text{B}^+)]$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} [-\log K_a(\text{HA}) - \log K_a(\text{B}^+)]$$

À retenir

$$\text{pH} = \frac{\text{p}K_a(\text{HA}) + \text{p}K_a(\text{B}^+)}{2} \quad (5.2)$$

Conditions de validité :

- Concentration du sel suffisamment élevée ($C > 10^{-2}$ M)
- Les approximations $[\text{H}_3\text{O}^+] \ll C$ et $[\text{OH}^-] \ll C$ sont valides
- Le sel est parfaitement dissocié
- Pas d'autres équilibres parasites

Donc notre cas :

$$\text{pH} = \frac{4,74 + 10,64}{2} = \frac{15,38}{2} = 7,69$$

Phase 4 : Après l'Équivalence à $V_B = 15$ mL : Le Régime Basique

Équation	CH_3COOH	+	CH_3NH_2	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	CH_3NH_3^+
État initial (mol)	$1,0 \cdot 10^{-3}$		$1,5 \cdot 10^{-3}$		0		0
État final (mol)	$(1,0 \cdot 10^{-3}) - x$		$(1,5 \cdot 10^{-3}) - x$		x		x

Calcul détaillé des quantités à l'équilibre Données :

- Volume total : $V = 25$ mL = 0,025 L
- Constante d'équilibre : $K = 7,94 \times 10^5$

Résolution :

Soit x l'avancement à l'équilibre. L'équation d'équilibre s'écrit :

$$7,94 \times 10^5 = \frac{x^2}{(1,0 \times 10^{-3} - x)(1,5 \times 10^{-3} - x)}$$

Développons l'équation :

Résolution de l'Équation pour $V_B = 15 \text{ mL}$

On considère l'équation d'équilibre :

$$7,94 \times 10^5 = \frac{x^2}{(1,0 \times 10^{-3} - x)(1,5 \times 10^{-3} - x)}$$

1. Mise sous forme polynomiale En posant $a = 1,0 \times 10^{-3}$ et $b = 1,5 \times 10^{-3}$, on développe :

$$\begin{aligned} 7,94 \times 10^5 (ab - (a+b)x + x^2) &= x^2 \\ 7,94 \times 10^5 (1,5 \times 10^{-6} - 2,5 \times 10^{-3}x + x^2) &= x^2 \\ 1,191 - 1985x + 7,94 \times 10^5 x^2 &= x^2 \end{aligned}$$

En regroupant les termes :

$$(7,94 \times 10^5 - 1)x^2 - 1985x + 1,191 = 0,794 \times 10^5 x^2 - 1985x + 1,191 = 0$$

2. Calcul du discriminant

$$\begin{aligned} \Delta &= B^2 - 4AC = (-1985)^2 - 4 \times (7,94 \times 10^5) \times 1,191 \\ &= 1,56825 \times 10^5 \Rightarrow \sqrt{\Delta} \approx 396,01 \end{aligned}$$

3. Calcul des racines

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1985 - 396,01}{1,58798 \times 10^6} = \frac{1588,99}{1,58798 \times 10^6} \approx 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ x_2 = \frac{1985 + 396,01}{1,58798 \times 10^6} = \frac{2381,01}{1,58798 \times 10^6} \approx 1,50 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{cases}$$

4. Choix de la solution physique L'avancement x ne peut pas dépasser la plus petite des quantités initiales. ici, l'acide acétique CH_3COOH est le réactif limitant avec $n = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

- $x_2 = 1,50 \times 10^{-3} \text{ mol}$ est impossible.
- $x_1 = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$ est la solution physiquement acceptable.

$$x \approx 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Quantités finales à l'équilibre :

$$\begin{aligned} n_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{\text{eq}} &= 1,0 \times 10^{-3} - 1,00 \times 10^{-3} = 0 \text{ mol} \\ n_{\text{CH}_3\text{NH}_2}^{\text{eq}} &= 1,5 \times 10^{-3} - 1,00 \times 10^{-3} = 0,50 \times 10^{-3} \text{ mol} \\ n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^{\text{eq}} &= n_{\text{CH}_3\text{NH}_3^+}^{\text{eq}} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

Concentrations à l'équilibre :

$$\begin{aligned} [\text{CH}_3\text{COOH}] &= 0 \text{ mol/L} \\ [\text{CH}_3\text{NH}_2] &= \frac{0,50 \times 10^{-3}}{0,025} = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \\ [\text{CH}_3\text{COO}^-] &= \frac{1,00 \times 10^{-3}}{0,025} = 4,00 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \\ [\text{CH}_3\text{NH}_3^+] &= \frac{1,00 \times 10^{-3}}{0,025} = 4,00 \times 10^{-2} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

Analyse du système :

Nous avons deux couples acide-base :

- Couple 1 : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ avec $K_{a1} = 1,74 \times 10^{-5}$
- Couple 2 : $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$ avec $K_{a2} = 1,26 \times 10^{-11}$

Les espèces majoritaires sont :

- CH_3COO^- : $4,00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (base faible)
- CH_3NH_3^+ : $4,00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (acide très faible)


— CH_3NH_2 : $2,00 \times 10^{-2}$ mol/L (base faible)

Calcul du pH par la méthode des équilibres compétitifs :

Le système est complexe car nous avons plusieurs acides et bases en compétition. Cependant, on peut observer que :

- CH_3NH_3^+ est un acide très faible ($K_a = 1,26 \times 10^{-11}$)
- CH_3COO^- est une base faible ($K_b = 5,75 \times 10^{-10}$)
- CH_3NH_2 est une base faible ($K_b = 7,94 \times 10^{-4}$)

L'espèce la plus basique est CH_3NH_2 (K_b la plus élevée). Le pH sera donc contrôlé principalement par l'équilibre :



Calcul avec l'équation de Henderson-Hasselbalch modifiée :

Pour un mélange complexe, on peut utiliser l'approximation :

$$\text{pH} \approx \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{NH}_3^+) + \log \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}$$

$$\text{pH} = 10,90 + \log \left(\frac{2,00 \times 10^{-2}}{4,00 \times 10^{-2}} \right) = 10,90 + \log(0,5) = 10,90 - 0,301 = 10,60$$

Vérification avec le second couple :

$$\text{pH} \approx \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

Mais ici $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0$, donc cette formule n'est pas applicable directement. Cela confirme que l'acide acétique a totalement réagi.

Conclusion :

Le pH est principalement contrôlé par le couple méthylamine/méthylammonium, avec un excès de base faible.

$$\text{pH} = 10,6$$

Le milieu est basique, dominé par la méthylamine libre et son acide conjugué en proportions comparables.

Cas Particulier :

Nous allons maintenant analyser un cas où les deux stratégies sont parfaitement équilibrées, un "duel de maîtres". Ce cas illustre les limites du dosage et l'importance cruciale de la constante d'équilibre.

L'acide faible (l'acide acétique) : $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ avec $\text{p}K_a = 4,74$

La base faible (l'aniline) : $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_{2(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})}$ avec $\text{p}K_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+) = 4,6$

La réaction globale est : $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_{2(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+_{(\text{aq})}$

Constante d'équilibre :

$$K = 10^{\text{p}K_a(\text{acide conjugué de la base}) - \text{p}K_a(\text{acide})} = 10^{4,6 - 4,74} = 10^{-0,14} \approx 0,72$$

Remarque : Une constante $K \approx 0,72$ est inférieure à 1, C'est le point crucial : la réaction est **légèrement défavorisée**. Les réactifs sont un peu plus "forts" que les produits. À l'équilibre, une quantité non négligeable de réactifs subsistera. **Nous ne pouvons PAS la considérer comme totale.**

Conséquence pratique : Un tel dosage est **très difficile, voire impossible à réaliser expérimentalement**. Le saut de pH à l'équivalence sera très faible et progressif, rendant la détection du point d'équivalence imprécise. C'est un excellent exemple théorique pour comprendre les limites de la méthode.

Étude Détaillée du Dosage (Méthode de l'Équilibre) : Considérons le dosage de $V_A = 15$ mL d'acide acétique $C_a = 0,1$ M par de l'aniline $C_b = 0,15$ M. Le volume équivalent théorique est $V_{eq} = 10$ mL.

Phase-1 : Avant l'Équivalence ($0 < V_B < 10$ mL) Puisque la réaction n'est pas totale, on ne peut pas utiliser un tableau d'avancement simple. Il faut résoudre l'équilibre complet. Le système contiendra toujours les 4 espèces en quantités non négligeables. Le calcul est complexe et nécessite de résoudre un système d'équations (électronéutralité, constante d'équilibre). Le pH évoluera très lentement, sans former de zone tampon efficace.

Avant l'équivalence à $V_B = 2,0$ mL :

Équation	CH_3COOH	+	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$
État initial (mol)	$1,50 \cdot 10^{-3}$		$0,3 \cdot 10^{-3}$		0		0
État final (mol)	$(1,50 \cdot 10^{-3}) - x$		$(0,3 \cdot 10^{-3}) - x$		x		x

Équation d'équilibre

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]} = \frac{\left(\frac{x}{0,0170}\right)^2}{\left(\frac{1,50 \cdot 10^{-3} - x}{0,0170}\right)\left(\frac{0,30 \cdot 10^{-3} - x}{0,0170}\right)}$$

$$0,72 = \frac{x^2}{(1,50 \cdot 10^{-3} - x)(0,30 \cdot 10^{-3} - x)}$$

Résolution de l'équation

$$-0,28x^2 - 1,296 \cdot 10^{-3}x + 3,24 \cdot 10^{-7} = 0$$

Discriminant :

$$\Delta = (1,296 \cdot 10^{-3})^2 - 4 \times (-0,28) \times (3,24 \cdot 10^{-7})$$

$$\sqrt{\Delta} = 1,429 \cdot 10^{-3}$$

Racines :

$$x_1 = \frac{1,296 \cdot 10^{-3} - 1,429 \cdot 10^{-3}}{-0,56} = \frac{-1,33 \cdot 10^{-4}}{-0,56} = 2,38 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$x_2 = \frac{1,296 \cdot 10^{-3} + 1,429 \cdot 10^{-3}}{-0,56} = \frac{2,725 \cdot 10^{-3}}{-0,56} = -4,87 \cdot 10^{-3} \text{ mol (impossible)}$$

$$x = 2,38 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

Bilan des quantités

$$\begin{cases} n_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{\text{final}} = 1,50 \cdot 10^{-3} - 2,38 \cdot 10^{-4} = 1,262 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \\ n_{\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2}^{\text{final}} = 0,30 \cdot 10^{-3} - 2,38 \cdot 10^{-4} = 0,062 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \\ n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^{\text{final}} = n_{\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+}^{\text{final}} = 2,38 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \end{cases}$$

Concentrations et pH :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{1,262 \cdot 10^{-3}}{0,0170} = 7,42 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L et } [\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{2,38 \cdot 10^{-4}}{0,0170} = 1,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Équation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,74 + \log \left(\frac{1,40 \cdot 10^{-2}}{7,42 \cdot 10^{-2}} \right) = 4,74 - 0,724 = 4,02$$

Vérification concentration résiduelle d'aniline :

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2] = \frac{0,062 \cdot 10^{-3}}{0,0170} = 3,65 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Cette valeur n'est **pas négligeable**, confirmant que les 4 espèces coexistent ($K \approx 1$).

Important

Interprétation : Nous sommes dans la **zone tampon déséquilibrée**, avec un rapport [base]/[acide] = 0,189, ce qui explique le pH légèrement inférieur au pKa.

Phase-2 : Demi-équivalence à $V_B = 5,0 \text{ mL}$:

Données initiales

- Volume d'acide acétique : $V_A = 15,0 \text{ mL}$, $C_A = 0,100 \text{ mol/L}$
- Volume d'aniline ajouté : $V_B = 5,0 \text{ mL}$, $C_B = 0,150 \text{ mol/L}$
- Constante d'équilibre : $K = 0,72$
- Volume total : $V = 20,0 \text{ mL} = 0,0200 \text{ L}$

Équation	CH_3COOH	+	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$
État initial (mol)	$1,50 \cdot 10^{-3}$		$0,75 \cdot 10^{-3}$		0		0
État final (mol)	$(1,50 \cdot 10^{-3}) - x$		$(0,75 \cdot 10^{-3}) - x$		x		x

$$0,72 = \frac{x^2}{(1,50 \cdot 10^{-3} - x)(0,75 \cdot 10^{-3} - x)}$$

$$x = 4,63 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

Concentrations finales

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{1,037 \cdot 10^{-3}}{0,0200} = 5,19 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}, \quad [\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{4,63 \cdot 10^{-4}}{0,0200} = 2,32 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2] = \frac{2,87 \cdot 10^{-4}}{0,0200} = 1,44 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}, \quad [\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+] = \frac{4,63 \cdot 10^{-4}}{0,0200} = 2,32 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Analyse des rapports caractéristiques

- Rapport acide acétique : $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{2,32}{5,19} = 0,447$
- Rapport aniline : $\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+]} = \frac{1,44}{2,32} = 0,621$
- Degré d'avancement : $\alpha = \frac{x}{n_{\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2}^0} = \frac{4,63}{7,50} = 0,617$

Calcul du pH par équilibre dominant :

Le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ($\text{pK}_a = 4,74$) domine légèrement car plus concentré.

$$\text{pH} = \text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,74 + \log(0,447) = \boxed{4,39}$$

Vérification par le second couple :

$$\text{pH} = \text{pK}_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+) + \log \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+]}$$

$$\text{pH} = 4,60 + \log(0,621) = 4,60 - 0,207 = 4,39$$

Important

Validation : Les deux couples donnent le même pH (4,39), confirmant la cohérence interne du calcul et l'état d'équilibre du système, Dans un dosage classique ($K \gg 1$), à la demi-équivalence on aurait $\text{pH} = \text{pK}_a = 4,74$. Ici, le pH est plus bas (4,39) car la réaction incomplète laisse moins de base conjuguée formée. et comme interprétation physique nous avons :

- **Avancement modéré :** $\alpha = 61,7\%$ seulement, dû à $K < 1$
- **Coexistence marquée :** Les 4 espèces sont présentes en proportions significatives
- **pH intermédiaire :** 4,39 entre les deux pK_a (4,60 et 4,74)
- **Réactif limitant :** L'aniline est presque totalement consommée

Conclusion :

Le point de demi-équivalence révèle toute la complexité d'un dosage avec $K \approx 1$. Contrairement aux dosages usuels, on n'observe pas $\text{pH} = \text{pK}_a$, mais une valeur inférieure reflétant l'équilibre incomplet et la coexistence des quatre espèces chimiques.

Pahse-3 : Après l'équivalence à $V_B = 20,0 \text{ mL}$

Équation	CH_3COOH	+	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$
État initial (mol)	$1,50 \cdot 10^{-3}$		$3,00 \cdot 10^{-3}$		0		0
État final (mol)	$(1,50 \cdot 10^{-3}) - x$		$(3,00 \cdot 10^{-3}) - x$		x		x

Équation d'équilibre complète

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]} = \frac{\left(\frac{x}{0,0350}\right)^2}{\left(\frac{1,50 \cdot 10^{-3} - x}{0,0350}\right)\left(\frac{3,00 \cdot 10^{-3} - x}{0,0350}\right)} = 0,72$$

Solutions :

$$x_1 = \frac{3,24 \cdot 10^{-3} - 3,759 \cdot 10^{-3}}{-0,56} = 9,27 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$x_2 = \frac{3,24 \cdot 10^{-3} + 3,759 \cdot 10^{-3}}{-0,56} = -1,250 \cdot 10^{-2} \text{ mol (rejetée)}$$

$$x = 9,27 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

Bilan matière complet à l'équilibre

$$\begin{cases} n_{\text{CH}_3\text{COOH}}^{\text{eq}} = 1,50 \cdot 10^{-3} - 9,27 \cdot 10^{-4} = 5,73 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \\ n_{\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2}^{\text{eq}} = 3,00 \cdot 10^{-3} - 9,27 \cdot 10^{-4} = 2,073 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \\ n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^{\text{eq}} = n_{\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+}^{\text{eq}} = 9,27 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \end{cases}$$

Concentrations finales

$$\begin{aligned} [\text{CH}_3\text{COOH}] &= \frac{5,73 \cdot 10^{-4}}{0,0350} = 1,64 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}, & [\text{CH}_3\text{COO}^-] &= \frac{9,27 \cdot 10^{-4}}{0,0350} = 2,65 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \\ [\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2] &= \frac{2,073 \cdot 10^{-3}}{0,0350} = 5,92 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}, & [\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+] &= \frac{9,27 \cdot 10^{-4}}{0,0350} = 2,65 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \end{aligned}$$

Calcul corrigé du pH : Traiter l'excès d'aniline comme une base faible.

$$K_b(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = \frac{K_e}{K_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+)} = \frac{10^{-14}}{10^{-4,60}} = 10^{-9,40} = 4,0 \cdot 10^{-10}$$

Concentration effective de la base :

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2] \approx 5,92 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Calcul de la basicité :

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \times [\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]} = \sqrt{4,0 \times 10^{-10} \times 5,92 \times 10^{-2}} = \sqrt{2,37 \times 10^{-11}}$$

$$[\text{OH}^-] = 4,87 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(4,87 \times 10^{-6}) = 5,31$$

$$\text{pH} = 14,00 - 5,31 = 8,69$$

Validation et interprétation

Important

Résultat validé : pH = 8,69 correspond bien à un milieu **basique**, cohérent avec la présence d'un excès d'aniline.
Conclusion : Malgré la faible basicité de l'aniline ($K_b = 4,0 \times 10^{-10}$), la concentration élevée ($5,92 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$) conduit à un pH nettement basique.

Synthèse du système

- **Réaction limitée :** Avancement $x = 9,27 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$ seulement (sur $1,50 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ possible)
- **Coexistence :** Les 4 espèces sont présentes en concentrations significatives
- **Excès net :** Aniline en large excès ($2,073 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$)
- **pH final :** 8,69 - basique comme attendu

5.2.11. Exercices d'application :

Exercice

Calcul de pH

Calculer le pH des solutions suivantes :

- a) Acide acétique : mélange de 50 mL d'une solution d'acide acétique 1,0 mol/L avec 150 mL d'eau. Donnée : $pK_a = 4,76$.
- b) Ammoniac : mélange de 50 mL d'une solution d'ammoniac 0,100 mol/L avec 150 mL d'une solution d'ammoniac 0,200 mol/L. Donnée : $pK_a = 9,25$.
- c) Mélange de 50 mL de HI 0,050 mol/L avec 50 mL de HBr 0,75 mol/L.
- d) Mélange de 500 mL de HCl 0,10 mol/L et 500 mL de NaOH 0,050 mol/L.
- e) Mélange de 500 mL de HCl 0,10 mol/L et 100 mL de NH_3 0,20 mol/L.
- f) Mélange de 500 mL de CH_3COOH 0,10 mol/L et 500 mL de NaOH 0,20 mol/L.

Solution

a) Acide acétique : mélange de 50 mL (1,0 mol/L) avec 150 mL d'eau

Données :

- Volume initial : $V_a = 50 \text{ mL} = 0,050 \text{ L}$
- Concentration initiale : $C_a = 1,0 \text{ mol/L}$
- $pK_a = 4,76$
- Volume d'eau : $V_{\text{eau}} = 150 \text{ mL}$

1. Concentration après dilution

Volume total : $V_{\text{total}} = 50 + 150 = 200 \text{ mL} = 0,200 \text{ L}$

Quantité d'acide : $n_a = C_a \times V_a = 1,0 \times 0,050 = 0,050 \text{ mol}$

Concentration après dilution :

$$C'_a = \frac{n_a}{V_{\text{total}}} = \frac{0,050}{0,200} = 0,250 \text{ mol/L}$$

2. Calcul du pH (acide faible)

Pour un acide faible : $\text{pH} = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\log C$

Vérification : $C = 0,250 \text{ mol/L} \gg 10^{-4,76} \approx 1,74 \times 10^{-5}$ (approximation valable)


Calcul :

$$\begin{aligned} \text{pH} &= \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2} \log(0,250) \\ &= 2,38 - \frac{1}{2} \times (-0,602) \\ &= 2,38 + 0,301 = 2,68 \end{aligned}$$

Réponse : pH = 2,68

Pourquoi vérifier avec $C \gg 10^{-pK_a}$?

Cette condition garantit la validité de l'approximation $x \ll C$ pour éviter l'équation du second degré. Butler⁽⁴⁰⁾ propose une approche rigoureuse pour traiter les cas où cette approximation n'est pas valable, notamment pour les acides très faibles ou les solutions très diluées.



	HA	+	H ₂ O	$\rightleftharpoons$	H ₃ O ⁺	+	A ⁻
$t = 0$	C		—		10^{-7}		10^{-7}
<i>avanc</i>	$-x$		—		$+x$		$+x$
<i>équil</i>	$C - x$		—		$10^{-7} + x$		$10^{-7} + x$

Approximation : $10^{-7} \ll x$ et $x \ll C$

$$K_a = \frac{x^2}{C - x} \approx \frac{x^2}{C} \Rightarrow x = \sqrt{K_a C}$$

Condition de validité : $\frac{x}{C} < 0,05$ (dissociation < 5%)

$$x = \sqrt{K_a C} \Rightarrow \frac{\sqrt{K_a C}}{C} < 0,05 \Rightarrow \frac{K_a}{C} < 2,5 \times 10^{-3}$$

$$\frac{C}{K_a} > 400 \quad (\text{règle pratique : souvent simplifiée à } 100)$$

$$C \gg 10^{-pK_a} \quad \text{ou} \quad \frac{C}{K_a} \geq 100$$

Équation exacte (si condition non respectée) :

$$K_a = \frac{x^2}{C - x} \Rightarrow x^2 = K_a(C - x)$$

$$x^2 + K_a x - K_a C = 0 \quad \text{on passe par : } \Delta = K_a^2 + 4K_a C$$

$$x = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C}}{2}$$

Vérification pratique : Après approximation.

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{approx}}}{C} \times 100 < 5\%$$

Conclusion

$C \gg 10^{-pK_a}$ c'est le test de cohérence mathématique. Garantit que l'approximation reflète la réalité chimique d'une faible dissociation.

b) Ammoniac : mélange de 50 mL (0,100 mol/L) avec 150 mL (0,200 mol/L)

Données :

- Solution 1 : $V_1 = 50 \text{ mL} = 0,050 \text{ L}$, $C_1 = 0,100 \text{ mol/L}$
- Solution 2 : $V_2 = 150 \text{ mL} = 0,150 \text{ L}$, $C_2 = 0,200 \text{ mol/L}$
- $pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$ (acide conjugué de NH_3)

1. Calcul de la concentration totale

Quantité d'ammoniac totale :

$$n_{\text{NH}_3} = C_1 \times V_1 + C_2 \times V_2 = (0,100 \times 0,050) + (0,200 \times 0,150)$$

$$n_{\text{NH}_3} = 0,00500 + 0,0300 = 0,0350 \text{ mol}$$

Volume total :

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 = 0,050 + 0,150 = 0,200 \text{ L}$$

Concentration totale :

$$C = \frac{n_{\text{NH}_3}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,0350}{0,200} = 0,175 \text{ mol/L}$$

2. Calcul avec pK_a

Pour une base faible NH_3 utilisant le pK_a de son acide conjugué NH_4^+ :

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C$$

Vérification de l'approximation :

$$C = 0,175 \text{ mol/L} \gg 10^{-(14-9,25)} = 10^{-4,75} \approx 1,78 \times 10^{-5}$$

Calcul :

$$\begin{aligned}\text{pH} &= 7 + \frac{1}{2} \times 9,25 + \frac{1}{2} \log(0,175) \\ &= 7 + 4,625 + \frac{1}{2} \times (-0,757) \\ &= 11,625 - 0,3785 = \boxed{11,2465}\end{aligned}$$

Autre méthode : Calcul avec pK_b

D'abord, calcul de pK_b :

$$pK_b = 14 - pK_a = 14 - 9,25 = 4,75$$

Formule pour une base faible avec pK_b :

$$\text{pH} = 14 - \left[\frac{1}{2}pK_b - \frac{1}{2}\log C \right] = 14 - \frac{1}{2}pK_b + \frac{1}{2}\log C$$

Même vérification :

$$C = 0,175 \text{ mol/L} \gg 10^{-pK_b} = 10^{-4,75} \approx 1,78 \times 10^{-5}$$

Calcul :

$$\begin{aligned}\text{pH} &= 14 - \frac{1}{2} \times 4,75 + \frac{1}{2} \log(0,175) \\ &= 14 - 2,375 + \frac{1}{2} \times (-0,757) \\ &= 11,625 - 0,3785 = \boxed{11,2465}\end{aligned}$$

Vérification de l'équivalence des deux méthodes :

Méthode 1 : $\text{pH} = \frac{1}{2} \left(14 + pK_a + \frac{1}{2} \log C \right)$

Méthode 2 : $\text{pH} = 14 - \frac{1}{2} \left(pK_b - \frac{1}{2} \log C \right)$

En remplaçant $pK_b = 14 - pK_a$ dans la méthode 2 :

$$\begin{aligned} \text{pH} &= 14 - \frac{1}{2}(14 - pK_a) + \frac{1}{2} \log C \\ &= 14 - 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2} \log C \\ &= 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2} \log C \end{aligned}$$

Ce qui est exactement la formule de la méthode 1.

Réponse : pH = 11,25

c) Mélange de 50 mL de HI 0,050 mol/L avec 50 mL de HBr 0,75 mol/L

Données :

— HI : $V_1 = 0,050$ L, $C_1 = 0,050$ mol/L

— HBr : $V_2 = 0,050$ L, $C_2 = 0,75$ mol/L

1. Quantités de matière

$$n_{\text{HI}} = C_1 \times V_1 = 0,050 \times 0,050 = 0,00250 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HBr}} = C_2 \times V_2 = 0,75 \times 0,050 = 0,0375 \text{ mol}$$

2. Concentration totale en H^+

Quantité totale de H^+ :

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{HI}} + n_{\text{HBr}} = 0,00250 + 0,0375 = 0,0400 \text{ mol}$$

Volume total :

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 = 0,050 + 0,050 = 0,100 \text{ L}$$

Concentration en H^+ :

$$[\text{H}^+] = \frac{n_{\text{H}^+}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,0400}{0,100} = 0,400 \text{ mol/L}$$

3. Calcul du pH

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(0,400) = 0,3979 \approx 0,40$$

Réponse : pH = 0,40

d) Mélange de 500 mL de HCl 0,10 mol/L et 500 mL de NaOH 0,050 mol/L

Données :

— HCl : $V_a = 0,500$ L, $C_a = 0,10$ mol/L

— NaOH : $V_b = 0,500$ L, $C_b = 0,050$ mol/L

1. Quantités de matière

$$n_{\text{H}^+} = 0,10 \times 0,500 = 0,0500 \text{ mol}$$

$$n_{\text{OH}^-} = 0,050 \times 0,500 = 0,0250 \text{ mol}$$

2. Réaction :

Équation de réaction	HCl	+	NaOH	→	NaCl	+	H ₂ O
État initial (mol)	n_A		n_B		0		solvant
	0,05		0,025		0		—
État final (mol)	0,025		0		0,025		—
	Acide fort		Base forte		Sel neutre		

3. Concentration en H^+

Volume total : $V_{\text{total}} = 1,000$ L

$$[\text{H}^+] = \frac{0,0250}{1,000} = 0,0250 \text{ mol/L}$$

4. Calcul du pH

$$\text{pH} = -\log(0,0250) = 1,6021 \approx 1,60$$

Réponse : pH = 1,60

e) Mélange de 500 mL de HCl 0,10 mol/L et 100 mL de NH_3 0,20 mol/L

Données :

— HCl : $V_a = 0,500$ L, $C_a = 0,10$ mol/L

- NH_3 : $V_b = 0,100 \text{ L}$, $C_b = 0,20 \text{ mol/L}$
- $pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$

1. Quantités initiales

$$n_{\text{H}^+} = 0,10 \times 0,500 = 0,0500 \text{ mol}$$

$$n_{\text{NH}_3} = 0,20 \times 0,100 = 0,0200 \text{ mol}$$

2. Réaction :

Équation de réaction	HCl	+	NH_3	$\longrightarrow$	NH_4Cl
État initial (mol)	n_A		n_b		
	0,05		0,02		0
État final (mol)	0,03		0		0,02
	Acide fort		Base faible		Sel acide

3. Concentration en H^+

$$\text{Volume total : } V_{\text{total}} = 0,600 \text{ L}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{0,0300}{0,600} = 0,0500 \text{ mol/L}$$

4. Calcul du pH

$$\text{pH} = -\log(0,0500) \approx 1,30$$

Réponse : $\text{pH} = 1,30$

f) Mélange de 500 mL de CH_3COOH 0,10 mol/L et 500 mL de NaOH 0,20 mol/L

Données :

- CH_3COOH : $V_a = 0,500 \text{ L}$, $C_a = 0,10 \text{ mol/L}$
- NaOH : $V_b = 0,500 \text{ L}$, $C_b = 0,20 \text{ mol/L}$
- $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,76$

1. Quantités initiales

$$n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = 0,10 \times 0,500 = 0,0500 \text{ mol}$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,20 \times 0,500 = 0,100 \text{ mol}$$

2. Réaction :

Équation de réaction	CH_3COOH	+	NaOH	$\longrightarrow$	CH_3COONa	+	H_2O
État initial (mol)	n_a		n_B		0		solvant
	0,05		0,1		0		—
État final (mol)	0		0,05		0,05		—
	Acide faible		Base forte		Sel basique		

3. Concentration en OH^-

$$\text{Volume total : } V_{\text{total}} = 1,000 \text{ L} \quad [\text{OH}^-] = \frac{0,0500}{1,000} = 0,0500 \text{ mol/L}$$

4. Calcul du pH

$$\text{pOH} = -\log(0,0500) = 1,3010$$

$$\text{pH} = 14 - 1,3010 \approx 12,70$$

Réponse : $\text{pH} = 12,70$

4. Concentration en H^+ (via produit ionique de l'eau)

$$\text{Volume total : } V_{\text{total}} = 1,000 \text{ L}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{0,0500}{1,000} = 0,0500 \text{ mol/L}$$

$$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14} \quad \text{à } 25^\circ\text{C}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{10^{-14}}{0,0500} = 2,00 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$$

4. Calcul du pH :

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log(2,00 \times 10^{-13}) = 12,70$$

Réponse : $\text{pH} = 12,70$

Exercice

Calcul de pH - Niveau avancé

Calculer le pH des solutions suivantes (vérifier systématiquement les approximations) :

- Dilution d'acide faible** : 30 mL d'une solution d'acide cyanhydrique HCN 0,15 mol/L sont dilués avec 120 mL d'eau. Donnée : $pK_a(\text{HCN}) = 9,21$. (Vérifier la condition $C \gg 10^{-pK_a}$)
- Mélange tampon aniline/anilinium** : on mélange 80 mL d'une solution d'aniline 0,060 mol/L avec 120 mL d'une solution de chlorure d'anilinium 0,040 mol/L. Donnée : $pK_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+) = 4,63$.
- Mélange d'acides** : 60 mL d'une solution d'acide chlorhydrique HCl 0,085 mol/L sont mélangés avec 40 mL d'une solution d'acide phosphorique H_3PO_4 0,35 mol/L. On considère que la première acidité de H_3PO_4 est totalement dissociée.
- Réaction acide-base faible-faible** : on mélange 400 mL d'une solution d'acide acétique CH_3COOH 0,12 mol/L avec 400 mL d'une solution d'ammoniac NH_3 0,12 mol/L. Données : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,76$, $pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$.
- Neutralisation partielle d'un sel d'ammonium** : 350 mL d'une solution de soude NaOH 0,14 mol/L sont ajoutés à 250 mL d'une solution de chlorure d'ammonium NH_4Cl 0,20 mol/L. Donnée : $pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$.
- Titrage partiel d'un acide faible** : on mélange 200 mL d'une solution d'acide formique HCOOH 0,25 mol/L avec 300 mL d'une solution de potasse KOH 0,18 mol/L. Donnée : $pK_a(\text{HCOOH}) = 3,75$. Vérifier la validité des approximations.

Solution

Calcul de pH (niveau avancé)

Conventions : on travaille à 25 °C (donc $pK_w = 14$). On note C une concentration analytique après mélange. On vérifie systématiquement les conditions d'approximation (par exemple si $x \ll C$).


- Acide cyanhydrique HCN** : 30 mL de 0,15 mol/L + 120 mL d'eau, $pK_a = 9,21$.

Concentration après dilution :

$$n_0(\text{HCN}) = C_i V_i = 0,15 \text{ mol/L} \times 0,030 \text{ L} = 4,50 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$V_f = 0,030 \text{ L} + 0,120 \text{ L} = 0,150 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{n_0}{V_f} = \frac{4,50 \cdot 10^{-3}}{0,150} = 3,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Mise en équation :



Si $x = [\text{H}^+] = [\text{CN}^-]$ à l'équilibre, alors

$$K_a = \frac{x^2}{C - x} \quad \Rightarrow \quad x^2 + K_a x - K_a C = 0.$$

Approximation et contrôle : On propose $x \ll C$ (acide très faible) :

$$x \simeq \sqrt{K_a C} = \sqrt{(6,2 \cdot 10^{-10})(3,0 \cdot 10^{-2})} = 4,3 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L}.$$

Contrôle : $x/C \approx 1,4 \cdot 10^{-4} \ll 5\%$ donc l'approximation est excellente.

$$\text{pH} = -\log x \simeq 5,37$$

Remarque : $C \gg 10^{-pK_a}$ car $3,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L} \gg 6,2 \cdot 10^{-10}$.

- Aniline** : 80 mL de 0,060 mol/L mélangés à 120 mL de 0,040 mol/L. Donnée : $pK_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+) = 4,63$.
Interprétation de l'énoncé : L'énoncé indique "solution 0,040 mol/L" sans précision. La donnée $pK_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+)$ suggère qu'on travaille avec le couple aniline/anilinium. **On interprète donc la seconde solution comme du chlorure d'anilinium $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$.**

Quantités de matière :

$$n(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 0,080 \times 0,060 = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+) = 0,120 \times 0,040 = 4,8 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Concentrations après mélange :

$$V_f = 0,200 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad [\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2] = \frac{4,8 \cdot 10^{-3}}{0,200} = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+] = \frac{4,8 \cdot 10^{-3}}{0,200} = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

pH d'un tampon (Henderson-Hasselbalch) :

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+]} = 4.63 + \log \left(\frac{2.4 \cdot 10^{-2}}{2.4 \cdot 10^{-2}} \right)$$

$$\text{pH} = 4.63$$

- c) **Mélange de** : 60 mL de HCl 0,085 mol/L avec 40 mL de H₃PO₄ 0,35 mol/L. On admet : première dissociation de H₃PO₄ complète.

Quantités de matière apportées :

$$n(\text{HCl}) = 0,060 \text{ L} \times 0,085 \text{ mol/L} = 5,10 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_3\text{PO}_4) = 0,040 \text{ L} \times 0,35 \text{ mol/L} = 1,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Calcul des protons totaux : Première acidité complète : chaque H₃PO₄ libère 1 proton.



$$n(\text{H}^+)_{\text{total}} = 5,10 \cdot 10^{-3} + 1,4 \cdot 10^{-2} = 1,91 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Concentration et pH :


$$V_f = 0,100 \text{ L} \quad [\text{H}^+] \approx \frac{1,91 \cdot 10^{-2}}{0,1} = 0,191 \text{ mol/L}$$

Les deuxième et troisième dissociations de H₃PO₄ sont très limitées à pH aussi acide.

$$\text{pH} = -\log(0,191) = 0,72$$

- d) **Mélange équimolaire** : 400 mL de CH₃COOH 0,12 mol/L et 400 mL de NH₃ 0,12 mol/L. Données : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,76$, $pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$.

Réaction acide-base dominante :



On compare pK_a : l'acide le plus fort est CH₃COOH (4,76) et l'acide conjugué de NH₃ est NH₄⁺ (9,25). La réaction est donc très déplacée vers la droite.

Cas équimolaire :

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{NH}_3) = 0,400 \text{ L} \times 0,12 \text{ mol/L} = 4,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Ils se consomment pratiquement totalement : il reste essentiellement le sel CH₃COONH₄. Pour un sel d'acide faible et de base faible, une bonne approximation est

$$\text{pH} \simeq \frac{1}{2} (pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + pK_a(\text{NH}_4^+))$$

$$\text{pH} \simeq \frac{1}{2} (4,76 + 9,25) = 7,01$$

- e) **Mélange de** : 350 mL de NaOH 0,14 mol/L + 250 mL de NH₄Cl 0,20 mol/L, $pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$.

Stoechiométrie :

$$n(\text{OH}^-) = 0,350 \times 0,14 = 4,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{NH}_4^+) = 0,250 \times 0,20 = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$



OH⁻ est limitant : il se consomme totalement. Il reste

$$n(\text{NH}_4^+)_{\text{reste}} = 5,0 \cdot 10^{-2} - 4,9 \cdot 10^{-2} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

et il s'est formé $n(\text{NH}_3) = 4,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$.

$$V_f = 0,600 \text{ L} \Rightarrow [\text{NH}_3] = \frac{4,9 \cdot 10^{-2}}{0,6} = 8,17 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{1,0 \cdot 10^{-3}}{0,6} = 1,67 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Tampon $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (Henderson-Hasselbalch) :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}$$

$$\text{pH} = 9.25 + \log \left(\frac{8.17 \cdot 10^{-2}}{1.67 \cdot 10^{-3}} \right) = 9.25 + \log(49)$$


$$\text{pH} = 11.20$$

- f) **Mélange de :** 200 mL de HCOOH 0,25 mol/L + 300 mL de KOH 0,18 mol/L. Donnée : $\text{p}K_a(\text{HCOOH}) = 3.75$.

Stoechiométrie :

$$n(\text{HCOOH}) = 0,200 \times 0,25 = 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{OH}^-) = 0,300 \times 0,18 = 5,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$



La base est en excès : $n_{\text{excès}}(\text{OH}^-) = 0,004 \text{ mol}$.

$$V_f = 0,500 \text{ L} \Rightarrow [\text{OH}^-] \approx \frac{0,004}{0,500} = 8,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

pH gouverné par l'excès de base forte :

$$\text{pOH} = -\log(8,0 \cdot 10^{-3}) = 2.10 \quad \Rightarrow \quad \text{pH} = 14 - 2.10 = 11.90$$

Vérification de l'approximation : On néglige l'hydrolyse du formiate HCOO^- car la solution contient déjà $[\text{OH}^-] = 8 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$. Or le formiate est une base faible ($\text{p}K_b = 14 - \text{p}K_a = 10.25 \Rightarrow K_b \approx 5,6 \cdot 10^{-11}$), donc sa contribution à $[\text{OH}^-]$ est très inférieure à l'excès calculé.

Exercice

Calcul de pH - (nouveau contexte)

Calculer le pH des solutions suivantes à 25 °C ($\text{p}K_w = 14$) :

- Dilution d'acide benzoïque :** mélange de 40 mL d'une solution d'acide benzoïque $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ 0,30 mol/L avec 160 mL d'eau. Donnée : $\text{p}K_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}) = 4,20$.
- Mélange tampon triméthylamine/triméthylammonium :** mélange de 60 mL d'une solution de triméthylamine $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ 0,12 mol/L avec 140 mL d'une solution de chlorure de triméthylammonium $(\text{CH}_3)_3\text{NHCl}$ 0,08 mol/L. Donnée : $\text{p}K_a((\text{CH}_3)_3\text{NH}^+) = 9,80$.
- Mélange d'acides forts :** mélange de 90 mL d'une solution d'acide sulfurique H_2SO_4 0,06 mol/L avec 60 mL d'une solution d'acide chlorhydrique HCl 0,22 mol/L. On considère que H_2SO_4 libère 2 H^+ par molécule (première acidité totalement dissociée).
- Neutralisation acide fort - base forte :** mélange de 450 mL d'une solution d'acide nitrique HNO_3 0,09 mol/L et 300 mL d'une solution d'hydroxyde de baryum $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,12 mol/L. On rappelle que $\text{Ba}(\text{OH})_2$ libère 2 OH^- par formule.
- Réaction acide fort - base faible :** mélange de 320 mL d'une solution d'acide iodhydrique HI 0,14 mol/L et 180 mL d'une solution de pyridine $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ 0,25 mol/L. Donnée : $\text{p}K_a(\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+) = 5,25$.
- Titrage acide faible - base forte :** mélange de 280 mL d'une solution d'acide fluorhydrique HF 0,16 mol/L et 220 mL d'une solution de soude NaOH 0,20 mol/L. Donnée : $\text{p}K_a(\text{HF}) = 3,17$.

Solution

Calcul de pH (nouveau contexte)

Conventions : on travaille à 25 °C (donc $\text{p}K_e = 14$). On note C une concentration analytique après mélange. On vérifie systématiquement les conditions d'approximation.

- a) **Acide benzoïque $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$:** 40 mL de 0,30 mol/L + 160 mL d'eau, $\text{p}K_a = 4.20$.

Concentration après dilution :

$$n_0(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}) = C_i V_i = 0,30 \times 0,040 = 1,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$V_f = 0,040 + 0,160 = 0,200 \text{ L} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{n_0}{V_f} = \frac{1,20 \cdot 10^{-2}}{0,200} = 6,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Mise en équation :



Si $x = [\text{H}^+]$ à l'équilibre, alors

$$K_a = \frac{x^2}{C - x} \Rightarrow x^2 + K_a x - K_a C = 0$$

Résolution exacte :

$$x = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4K_a C}}{2} = \frac{-6,3 \cdot 10^{-5} + \sqrt{(6,3 \cdot 10^{-5})^2 + 4 \times 6,3 \cdot 10^{-5} \times 6,0 \cdot 10^{-2}}}{2}$$

$$x \simeq 1,91 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Vérification de l'approximation : Si on avait utilisé l'approximation $x \ll C$:

$$x \simeq \sqrt{K_a C} = \sqrt{(6,3 \cdot 10^{-5})(6,0 \cdot 10^{-2})} = 1,94 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\frac{x}{C} \approx \frac{1,91 \cdot 10^{-3}}{6,0 \cdot 10^{-2}} \approx 3,2\% < 5\% \quad (\text{acceptable})$$

$$\text{pH} = -\log(1,91 \cdot 10^{-3}) \simeq 2,72$$

- b) **Triméthylamine/triméthylammonium** : 60 mL de $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ 0,12 mol/L + 140 mL de $(\text{CH}_3)_3\text{NHCl}$ 0,08 mol/L. Donnée : $pK_a((\text{CH}_3)_3\text{NH}^+) = 9,80$.

Quantités de matière :

$$n((\text{CH}_3)_3\text{N}) = 0,060 \times 0,12 = 7,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n((\text{CH}_3)_3\text{NH}^+) = 0,140 \times 0,08 = 1,12 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Concentrations après mélange :

$$V_f = 0,200 \text{ L}$$

$$[(\text{CH}_3)_3\text{N}] = \frac{7,2 \cdot 10^{-3}}{0,200} = 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+] = \frac{1,12 \cdot 10^{-2}}{0,200} = 5,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

pH du tampon (Henderson-Hasselbalch) :

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[(\text{CH}_3)_3\text{N}]}{[(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+]}$$

$$\text{pH} = 9,80 + \log \left(\frac{3,6 \cdot 10^{-2}}{5,6 \cdot 10^{-2}} \right) = 9,80 + \log(0,643)$$

$$\text{pH} \simeq 9,80 - 0,192 \simeq 9,61$$

- c) **Mélange d'acides forts** : 90 mL de H_2SO_4 0,06 mol/L + 60 mL de HCl 0,22 mol/L.

Quantités de matière de protons :

$$n(\text{H}^+)_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 2 \times (0,090 \times 0,06) = 2 \times 5,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 1,08 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}^+)_{\text{HCl}} = 0,060 \times 0,22 = 1,32 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}^+)_{\text{total}} = 1,08 \cdot 10^{-2} \text{ mol} + 1,32 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 2,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Concentration et pH :

$$V_f = 0,150 \text{ L} \quad [\text{H}^+] = \frac{2,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{0,150 \text{ L}} = 0,160 \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log(0,160) \simeq 0,80$$

- d) **Neutralisation acide fort - base forte** : 450 mL de HNO_3 0,09 mol/L + 300 mL de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0,12 mol/L.

Stoechiométrie :

$$n(\text{H}^+) = 0,450 \text{ L} \times 0,09 \text{ mol/L} = 4,05 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{OH}^-) = 2 \times (0,300 \times 0,12) = 2 \times 3,6 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 7,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Excès de base :

$$n_{\text{excès}}(\text{OH}^-) = 7,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 4,05 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 3,15 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Concentration en OH^- et pH :

$$V_f = 0,750 \text{ L} \quad [\text{OH}^-] = \frac{3,15 \cdot 10^{-2}}{0,750} = 4,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(4,2 \cdot 10^{-2}) = 1,38$$


$$\text{pH} = 14,00 - 1,38 = 12,62$$

- e) **Réaction acide fort - base faible** : 320 mL de HI 0,14 mol/L + 180 mL de pyridine 0,25 mol/L. Donnée : $\text{p}K_a(\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+) = 5,25$.

Stoechiométrie :

$$n(\text{H}^+) = 0,320 \times 0,14 = 4,48 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}_5\text{H}_5\text{N}) = 0,180 \times 0,25 = 4,50 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$



Situation après réaction : L'acide est légèrement limitant :

$$n(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_{\text{reste}} = 4,50 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 4,48 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 2,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+)_{\text{formé}} = 4,48 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Concentrations et pH du tampon :

$$V_f = 0,500 \text{ L}$$

$$[\text{C}_5\text{H}_5\text{N}] = \frac{2,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{0,500 \text{ L}} = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$[\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+] = \frac{4,48 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{0,500 \text{ L}} = 8,96 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{C}_5\text{H}_5\text{N}]}{[\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+]}$$

$$\text{pH} = 5,25 + \log \left(\frac{4,0 \cdot 10^{-4}}{8,96 \cdot 10^{-2}} \right) = 5,25 + \log(4,46 \times 10^{-3})$$


$$\text{pH} \simeq 5,25 - 2,35 \simeq 2,90$$

- f) **Titration acide faible - base forte** : 280 mL de HF 0,16 mol/L + 220 mL de NaOH 0,20 mol/L. Donnée : $\text{p}K_a(\text{HF}) = 3,17$.

Stoechiométrie :

$$n(\text{HF}) = 0,280 \text{ L} \times 0,16 \text{ mol/L} = 4,48 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{OH}^-) = 0,220 \text{ L} \times 0,20 \text{ mol/L} = 4,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$



Situation après réaction : La base est légèrement limitante :

$$n(\text{HF})_{\text{reste}} = 4,48 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 4,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 8,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n(\text{F}^-)_{\text{formé}} = 4,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Concentrations et pH du tampon :

$$V_f = 0,500 \text{ L}$$

$$[\text{HF}] = \frac{8,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{0,500 \text{ L}} = 1,60 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{F}^-] = \frac{4,40 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{0,500 \text{ L}} = 8,80 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{F}^-]}{[\text{HF}]}$$

$$\text{pH} = 3,17 + \log \left(\frac{8,80 \cdot 10^{-2}}{1,60 \cdot 10^{-3}} \right) = 3,17 + \log(55,0)$$

$$\text{pH} \simeq 3,17 + 1,74 \simeq 4,91$$

Exercice

Calcul de pH - (nouveaux systèmes)

Calculer le pH des solutions suivantes :

- Acide propionique : mélange de 25 mL d'une solution 0,80 mol/L avec 125 mL d'eau. Donnée : $pK_a = 4,87$.
- Méthylamine : mélange de 120 mL d'une solution 0,035 mol/L avec 80 mL d'une solution 0,095 mol/L. Donnée : $pK_a(\text{CH}_3\text{NH}_3^+) = 10,64$.
- Mélange de 120 mL de HClO_4 0,045 mol/L avec 80 mL de HNO_3 0,18 mol/L.
- Mélange de 600 mL de HI 0,07 mol/L et 400 mL de LiOH 0,12 mol/L.
- Mélange de 180 mL de H_2SO_4 0,09 mol/L et 320 mL d'aniline 0,11 mol/L. ($pK_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+) = 4,63$)
- Mélange de 150 mL de H_3PO_4 0,24 mol/L et 250 mL de KOH 0,16 mol/L. ($pK_{a1} = 2,14$)

Solution

Calcul de pH - Correction (nouveaux systèmes)

Conventions : on travaille à 25 °C (donc $pK_e = 14$). On vérifie systématiquement les conditions d'approximation.

- Acide propionique :** 25 mL de 0,80 mol/L + 125 mL d'eau, $pK_a = 4,87$.

Concentration après dilution :

$$n_0(\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}) = C_i V_i = 0,80 \text{ mol/L} \times 0,025 \text{ L} = 0,0200 \text{ mol}$$

$$V_f = 0,025 \text{ L} + 0,125 \text{ L} = 0,150 \text{ L}$$

$$C = \frac{n_0}{V_f} = \frac{0,0200 \text{ mol}}{0,150 \text{ L}} = 0,1333 \text{ mol/L}$$

Équilibre de dissociation :



Résolution approchée :

$$[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_a C} = \sqrt{1,35 \cdot 10^{-5} \cdot 0,1333}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{1,800 \times 10^{-6}} = 1,342 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Vérification :

$$\frac{[\text{H}^+]}{C} = \frac{1,342 \times 10^{-3}}{0,1333} \approx 0,0101 = 1,01\% < 5\%$$

$$\text{pH} = -\log(1,342 \cdot 10^{-3}) \approx 2,87$$

- Méthylamine :** 120 mL de 0,035 mol/L + 80 mL de 0,095 mol/L. Donnée : $pK_a(\text{CH}_3\text{NH}_3^+) = 10,64$.

Interprétation : La seconde solution est interprétée comme du chlorure de méthylammonium $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$ pour former un tampon.

Quantités de matière :

$$n(\text{CH}_3\text{NH}_2) = 0,120 \text{ L} \times 0,035 \text{ mol/L} = 4,20 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{CH}_3\text{NH}_3^+) = 0,080 \text{ L} \times 0,095 \text{ mol/L} = 7,60 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Concentrations après mélange :

$$V_f = 0,200 \text{ L}$$

$$[\text{CH}_3\text{NH}_2] = \frac{4,20 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,200 \text{ L}} = 2,10 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[\text{CH}_3\text{NH}_3^+] = \frac{7,60 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,200 \text{ L}} = 3,80 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

pH du tampon :

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{NH}_2]}{[\text{CH}_3\text{NH}_3^+]}$$

$$\text{pH} = 10,64 + \log \left(\frac{2,1 \cdot 10^{-2}}{3,8 \cdot 10^{-2}} \right) = 10,64 + \log(0,5526)$$

$$\text{pH} \approx 10,64 - 0,257 = 10,38$$

- Mélange d'acides forts :** 120 mL de HClO_4 0,045 mol/L + 80 mL de HNO_3 0,18 mol/L.

Quantités de matière :

$$n(\text{H}^+)_{\text{HClO}_4} = 0,120 \text{ L} \times 0,045 \text{ mol/L} = 5,40 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}^+)_{\text{HNO}_3} = 0,080 \text{ L} \times 0,18 \text{ mol/L} = 1,44 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{H}^+)_{\text{total}} = 5,40 \cdot 10^{-3} \text{ mol} + 1,44 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 1,98 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Concentration et pH :

$$V_f = 0,200 \text{ L}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{1,98 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{0,200 \text{ L}} = 0,0990 \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = -\log(0,0990) \approx 1,00$$

- d) **Neutralisation acide fort - base forte** : 600 mL de HI 0,07 mol/L + 400 mL de LiOH 0,12 mol/L.
Stoechiométrie :

$$n(\text{H}^+) = 0,600 \text{ L} \times 0,07 \text{ mol/L} = 4,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{OH}^-) = 0,400 \text{ L} \times 0,12 \text{ mol/L} = 4,80 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Excès de base :

$$n_{\text{excès}}(\text{OH}^-) = 4,80 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 4,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Concentration et pH :

$$V_f = 1,000 \text{ L}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{6,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{1,000 \text{ L}} = 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(6,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}) = 2,22$$

$$\text{pH} = 14,00 - 2,22 = 11,78$$

- e) **Réaction acide fort - base faible** : 180 mL de H_2SO_4 0,09 mol/L + 320 mL d'aniline 0,11 mol/L.
Donnée : $pK_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+) = 4,63$.

Important : H_2SO_4 libère 2 H^+ par molécule.

Quantités de matière :

$$n(\text{H}^+) = 2 \times (0,180 \text{ L} \times 0,09 \text{ mol/L}) = 2 \times 1,62 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 3,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2) = 0,320 \text{ L} \times 0,11 \text{ mol/L} = 3,52 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Réaction : $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}^+ \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$

Situation après réaction : L'acide est légèrement limitant :

$$n(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2)_{\text{reste}} = 3,52 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 3,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 2,80 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+)_{\text{formé}} = 3,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Concentrations et pH :

$$V_f = 0,500 \text{ L}$$

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2] = \frac{2,80 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,500 \text{ L}} = 5,60 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+] = \frac{3,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{0,500 \text{ L}} = 6,48 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+]}$$

$$\text{pH} = 4,63 + \log \left(\frac{5,60 \cdot 10^{-3}}{6,48 \cdot 10^{-2}} \right) = 4,63 + \log(0,0864)$$

$$\text{pH} \approx 4,63 - 1,063 = 3,57$$

- f) **Titration acide phosphorique - potasse** : 150 mL de H_3PO_4 0,24 mol/L + 250 mL de KOH 0,16 mol/L.
Donnée : $pK_{a1} = 2,14$.


Quantités de matière initiales :

$$n(\text{H}_3\text{PO}_4) = 0,150 \text{ L} \times 0,24 \text{ mol/L} = 3,60 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{OH}^-) = 0,250 \text{ L} \times 0,16 \text{ mol/L} = 4,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

Réaction étape par étape :

Étape 1 : Neutralisation de la première acidité




Après cette étape :

$$n(\text{H}_3\text{PO}_4)_{\text{reste}} = 0 \quad (\text{totalement consommé})$$

$$n(\text{H}_2\text{PO}_4^-)_{\text{formé}} = 3,60 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{OH}^-)_{\text{reste}} = 4,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 3,60 \cdot 10^{-2} \text{ mol} = 4,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

Étape 2 : Neutralisation partielle de la deuxième acidité



Après cette étape :

$$n(\text{H}_2\text{PO}_4^-)_{\text{reste}} = 3,60 \cdot 10^{-2} \text{ mol} - 4,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol} = 3,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n(\text{HPO}_4^{2-})_{\text{formé}} = 4,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{OH}^-)_{\text{reste}} = 0$$

Concentrations finales :

$$V_f = 0,400 \text{ L}$$

$$[\text{H}_2\text{PO}_4^-] = \frac{3,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol}}{0,400 \text{ L}} = 8,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[\text{HPO}_4^{2-}] = \frac{4,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,400 \text{ L}} = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

pH du tampon $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$:

$$\text{pH} = \text{p}K_{a2} + \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

Attention : On a besoin de $\text{p}K_{a2}$, pas de $\text{p}K_{a1}$! Pour H_3PO_4 : $\text{p}K_{a2} = 7.20$ (valeur standard).

$$\text{pH} = 7.20 + \log \left(\frac{1,00 \cdot 10^{-2}}{8,00 \cdot 10^{-2}} \right) = 7.20 + \log(0.125)$$

$$\text{pH} \approx 7.20 - 0.903 = 6.30$$

Remarque : Le $\text{p}K_{a1} = 2.14$ donné n'est pas utilisé directement car on est au-delà de la première équivalence.

Exercice

Exercice 2 : Solutions tampon $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$

- I) Le mélange de 500 mL de NH_3 0,20 mol/L avec 500 mL de $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$ produit une solution de $\text{pH} = 9,0$. Calculer la masse de chlorure d'ammonium utilisée.
- II) Pour préparer 500 mL d'une solution tampon de concentration 0,10 mol/L et de $\text{pH} = 9,0$, on dispose de :
- NH_3 1,0 mol/L (avec $\text{p}K_a = 9,25$),
 - HCl 0,50 mol/L.
- Calculer les volumes nécessaires pour préparer cette solution.

Solution

I) Mélange de 500 mL de NH_3 0,20 mol/L avec NH_4Cl pour obtenir $\text{pH} = 9,0$

Contexte et objectif :

- Nous avons 500 mL d'une solution d'ammoniac NH_3 à 0,20 mol/L
- Nous voulons ajouter du chlorure d'ammonium NH_4Cl pour former un tampon $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$
- Le pH souhaité pour ce tampon est de 9,0
- Nous connaissons le $\text{p}K_a$ du couple : $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,25$

Données fournies :

- Volume de solution de NH_3 : $V_{\text{NH}_3} = 500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L}$
- Concentration de NH_3 : $C_{\text{NH}_3} = 0,20 \text{ mol/L}$
- pH cible du tampon : 9,0
- $\text{p}K_a$ du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$: $\text{p}K_a = 9,25$
- Masse molaire du NH_4Cl :

$$M = 14,01 \text{ (N)} + 4 \times 1,008 \text{ (H)} + 35,45 \text{ (Cl)} = 53,49 \text{ g/mol}$$

Étape 1 : Compréhension du système tampon

Nous allons former un tampon en mélangeant : - La base faible NH_3 déjà présente en solution - Son acide conjugué NH_4^+ que nous ajouterons sous forme de sel NH_4Cl
Le chlorure d'ammonium NH_4Cl se dissocie complètement en solution :



Étape 2 : Application de l'équation de Henderson-Hasselbalch

Pour un tampon acide faible/base faible, la relation fondamentale est :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$$

Dans notre cas : - Base : NH_3 - Acide : NH_4^+

Donc :

$$9,0 = 9,25 + \log \left(\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} \right)$$

Étape 3 : Détermination du rapport des concentrations

$$\log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 9,0 - 9,25 = -0,25$$
$$\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 10^{-0,25}$$

Calcul de la valeur numérique :

$$10^{-0,25} \approx 0,5623$$

Interprétation : La concentration en NH_3 doit être environ 0,56 fois celle de NH_4^+ .

Étape 4 : Passage aux quantités de matière

Comme le volume final sera le même pour les deux espèces (on ajoute le NH_4Cl à la solution existante), le rapport des concentrations est égal au rapport des quantités de matière :

$$\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{NH}_4^+}} = 0,5623$$

Calculons d'abord la quantité de NH_3 déjà présente :

$$n_{\text{NH}_3} = C_{\text{NH}_3} \times V_{\text{NH}_3} = 0,20 \times 0,500 = 0,100 \text{ mol}$$

Étape 5 : Calcul de la quantité de NH_4^+ nécessaire

De la relation $\frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{NH}_4^+}} = 0,5623$, on déduit :

$$n_{\text{NH}_4^+} = \frac{n_{\text{NH}_3}}{0,5623} = \frac{0,100}{0,5623} = 0,1778 \text{ mol}$$

Étape 6 : Calcul de la masse de NH_4Cl correspondante

La quantité de NH_4^+ nécessaire provient de la dissolution de NH_4Cl . Chaque mole de NH_4Cl fournit une mole de NH_4^+ .

Donc :

$$n_{\text{NH}_4\text{Cl}} = n_{\text{NH}_4^+} = 0,1778 \text{ mol}$$

Masse de NH_4Cl à peser :

$$m_{\text{NH}_4\text{Cl}} = n_{\text{NH}_4\text{Cl}} \times M_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 0,1778 \times 53,49$$

Calcul détaillé :

$$0,1778 \times 53,49 = 9,510$$

Arrondi à 3 chiffres significatifs (comme les données) :

$$m_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 9,51 \text{ g}$$

Étape 7 : Protocole de préparation

- Peser précisément 9,51 g de chlorure d'ammonium NH_4Cl solide
- Dissoudre ce solide dans la solution de 500 mL de NH_3 0,20 mol/L

- c) Agiter jusqu'à dissolution complète
- d) Vérifier le pH avec un pH-mètre

Vérification théorique du pH : En utilisant les valeurs calculées :

$$\begin{aligned}\text{pH} &= 9,25 + \log\left(\frac{0,100}{0,1778}\right) \\ &= 9,25 + \log(0,5623) \\ &= 9,25 + (-0,25) = 9,00 \quad (\text{exactement la valeur cible})\end{aligned}$$

Réponse finale :

Pour préparer 500 mL de tampon $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ à pH = 9,0 à partir de 500 mL de NH_3 0,20 mol/L, il faut dissoudre :


$$m_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 9,51 \text{ g}$$

de chlorure d'ammonium dans la solution d'ammoniac.

II) Préparation de 500 mL d'une solution tampon 0,10 mol/L à pH = 9,0

Données et objectif :

- Nous voulons préparer 500 mL d'une solution tampon $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$
- Concentration totale ($\text{NH}_3 + \text{NH}_4^+$) : $C_{\text{tot}} = 0,10 \text{ mol/L}$
- pH souhaité : 9,0
- pK_a du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$: $pK_a = 9,25$
- Solutions disponibles :
 - Solution de NH_3 concentrée : 1,0 mol/L
 - Solution de HCl : 0,50 mol/L
- Stratégie : On ajoutera du HCl à la solution de NH_3 pour former le tampon selon la réaction :



Étape 1 : Calcul de la quantité totale d'espèces tampon

Volume final désiré : $V_f = 0,500 \text{ L}$

Quantité totale d'espèces tampon ($\text{NH}_3 + \text{NH}_4^+$) :

$$n_{\text{tot}} = C_{\text{tot}} \times V_f = 0,10 \times 0,500 = 0,0500 \text{ mol}$$

Cette quantité sera répartie entre NH_3 et NH_4^+ .

Étape 2 : Application de l'équation de Henderson-Hasselbalch

Pour un tampon base faible/sel de son acide conjugué :

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$$

Comme le volume est le même pour les deux espèces, on peut travailler avec les quantités de matière :

$$9,0 = 9,25 + \log\left(\frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{NH}_4^+}}\right)$$

Étape 3 : Résolution pour trouver le rapport des quantités

$$\begin{aligned}\log\left(\frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{NH}_4^+}}\right) &= 9,0 - 9,25 = -0,25 \\ \frac{n_{\text{NH}_3}}{n_{\text{NH}_4^+}} &= 10^{-0,25} = 0,5623\end{aligned}$$

Ce rapport signifie que pour chaque mole de NH_4^+ , il faut 0,5623 mole de NH_3 .

Étape 4 : Détermination des quantités exactes

Nous avons deux équations à deux inconnues :

- a) Conservation de la matière : $n_{\text{NH}_3} + n_{\text{NH}_4^+} = 0,05$
- b) Rapport des quantités : $n_{\text{NH}_3} = 0,5623 \times n_{\text{NH}_4^+}$

Substituons la deuxième équation dans la première :

$$\begin{aligned}0,5623 \times n_{\text{NH}_4^+} + n_{\text{NH}_4^+} &= 0,05 \\(0,5623 + 1) \times n_{\text{NH}_4^+} &= 0,05 \\1,5623 \times n_{\text{NH}_4^+} &= 0,05 \\n_{\text{NH}_4^+} &= \frac{0,05}{1,5623} = 0,032 \text{ mol}\end{aligned}$$

En déduisons n_{NH_3} :

$$n_{\text{NH}_3} = 0,0500 - 0,03200 = 0,018 \text{ mol}$$

Étape 5 : Interprétation chimique

- NH_4^+ provient de la réaction : $\text{NH}_3 + \text{H}^+ \rightarrow \text{NH}_4^+$
- Pour obtenir 0,032 mol de NH_4^+ , il faut ajouter 0,032 mol de HCl à la solution de NH_3
- Initialement, il faut donc une quantité totale de NH_3 égale à :

$$n_{\text{NH}_3 \text{ initial}} = n_{\text{NH}_3} + n_{\text{NH}_4^+} = 0,018 + 0,032 = 0,05000 \text{ mol}$$

Étape 6 : Calcul des volumes à prélever

- **Volume de NH_3** 1,0 mol/L :

$$V_{\text{NH}_3} = \frac{n_{\text{NH}_3 \text{ initial}}}{C_{\text{NH}_3}} = \frac{0,05}{1,0} = 0,05 \text{ L} = \boxed{50,0 \text{ mL}}$$

- **Volume de HCl** 0,50 mol/L :

$$V_{\text{HCl}} = \frac{n_{\text{HCl}}}{C_{\text{HCl}}} = \frac{0,032}{0,50} = 0,06400 \text{ L} = \boxed{64,0 \text{ mL}}$$

Étape 7 : Protocole de préparation

- Prélever 50,0 mL de la solution de NH_3 1,0 mol/L
- Ajouter 64,0 mL de la solution de HCl 0,50 mol/L
 - **Attention** : Toujours verser l'acide dans la base, pas l'inverse
- Transvaser dans une fiole jaugée de 500 mL
- Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge
- Homogénéiser par plusieurs retournements

Vérification : Le volume total apporté par les deux solutions concentrées s'élève à $50,0 + 64,0 = 114 \text{ mL}$. Par conséquent, pour atteindre le volume final de 500 mL, il sera nécessaire d'ajouter $500 - 114 = \boxed{386 \text{ mL}}$ d'eau distillée.

Réponse :

- $V_{\text{NH}_3} = 50,0 \text{ mL}$ de solution à 1,0 mol/L
- $V_{\text{HCl}} = 64,0 \text{ mL}$ de solution à 0,50 mol/L
- Diluer à 500 mL avec de l'eau distillée dans une fiole jaugée

Remarque : Le pH final de la solution devra être vérifié avec un pH-mètre après préparation.

Exercice

Exercice solution Tampon et vitamine C

L'acide ascorbique (vitamine C) présente, en solution aqueuse, une fonction acide dont le pK_a est 4,17. Certaines formes pharmaceutiques proposent la vitamine C tamponnée en réalisant un mélange acide ascorbique – ascorbate monosodique.

Un comprimé de masse 0,500 g ne contient que ces deux molécules. Il est dissous dans 0,100 litre d'eau pure. Le pH de la solution obtenue est égal à 4,50.

On donne les masses molaires :

- Acide ascorbique : 176 g/mol
- Ascorbate monosodique : 198 g/mol

Quelles sont les concentrations molaires respectives de l'acide ascorbique et de l'ascorbate monosodique dans la solution obtenue ?

Solution

Données :

- $pK_a(\text{HA}) = 4,17$ où HA = acide ascorbique, A^- = ascorbate
- pH de la solution : 4,50
- Masse totale du comprimé : $m_{\text{tot}} = 0,50 \text{ g}$

- Volume de dissolution : $V = 0,10 \text{ L}$
- $M(\text{HA}) = 176 \text{ g/mol}$, $M(\text{A}^- \text{Na}^+) = 198 \text{ g/mol}$

1. Utilisation de la relation de Henderson-Hasselbalch

Pour un couple acide-base HA/A^- , on a :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Application numérique :

$$4,50 = 4,17 + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4,50 - 4,17 = 0,33$$

$$\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 10^{0,33} \approx 2,14$$

2. Expression des concentrations en fonction des quantités de matière

Soient :

- n_{HA} = quantité de matière d'acide ascorbique (en mol)
- n_{A^-} = quantité de matière d'ascorbate monosodique (en mol)

Les concentrations sont :

$$[\text{HA}] = \frac{n_{\text{HA}}}{V} = \frac{n_{\text{HA}}}{0,10 \text{ L}}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{n_{\text{A}^-}}{V} = \frac{n_{\text{A}^-}}{0,10 \text{ L}}$$

Le rapport des concentrations devient :

$$\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{n_{\text{A}^-}}{n_{\text{HA}}} = 2,14$$

$$n_{\text{A}^-} = 2,14 \times n_{\text{HA}}$$

3. Bilan de masse du comprimé

La masse totale du comprimé est la somme des masses des deux composés :

$$m_{\text{HA}} + m_{\text{A}^-} = 0,5 \text{ g}$$

Avec $m_{\text{HA}} = M(\text{HA}) \times n_{\text{HA}}$ et $m_{\text{A}^-} = M(\text{A}^- \text{Na}^+) \times n_{\text{A}^-}$:

$$176 \times n_{\text{HA}} + 198 \times n_{\text{A}^-} = 0,5$$

En remplaçant n_{A^-} par son expression en fonction de n_{HA} :

$$176n_{\text{HA}} + 198 \times (2,14 \times n_{\text{HA}}) = 0,5$$

$$176n_{\text{HA}} + 423,72n_{\text{HA}} = 0,5$$

$$599,72n_{\text{HA}} = 0,5$$

$$n_{\text{HA}} = \frac{0,5}{599,72} \approx 8,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$$

On en déduit :

$$n_{\text{A}^-} = 2,14 \times 8,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \approx 1,78 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

4. Calcul des concentrations

$$[\text{HA}] = \frac{n_{\text{HA}}}{V} = \frac{8,34 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{0,10 \text{ L}} = 8,34 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{n_{\text{A}^-}}{V} = \frac{1,78 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,10 \text{ L}} = 1,78 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

5. Vérification

- Rapport des concentrations : $\frac{1,78 \cdot 10^{-2}}{8,34 \cdot 10^{-3}} \approx 2,13$

- Masse totale : $176 \times 8,34 \cdot 10^{-4} + 198 \times 1,78 \cdot 10^{-3} \approx 0,147 + 0,352 = 0,499 \text{ g}$

Résultats finaux :

$$[\text{HA}] = 8,3 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} \quad \text{et} \quad [\text{A}^-] = 1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

Concentrations dans la solution après dissolution du comprimé

Interprétation : La solution est bien un tampon puisque $[\text{A}^-] > [\text{HA}]$, ce qui correspond à un pH (4,50) supérieur au pK_a (4,17). Le rapport des concentrations est d'environ 2,1, ce qui est typique d'un tampon efficace.

Exercice

Calculs de pH

Trois solutions aqueuses :

- **A** contient $0,03 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ (acide 1-chloropropanoïque) ($K_a = 7,94 \times 10^{-5}$)
 - **B** contient $0,007 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de HCl
 - **C** contient $2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de chlorure d'ammonium NH_4Cl ($K_a(\text{NH}_4^+) = 5,6 \times 10^{-10}$)
- a) Quel est le pH de A, B et C ?
b) On mélange 25 mL d'une solution de NH_4Cl $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ avec 50 mL d'une solution de NH_3 $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Calculez le pH de cette solution tampon.

Solution

Conventions : On travaille à 25°C ($pK_e = 14$).

1. pH des solutions A, B et C

a) Solution A : Acide 1-chloropropanoïque $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$

Données :

$$C_A = 0,03 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \quad K_a = 7,94 \times 10^{-5} \quad (pK_a \approx 4,10)$$

Vérification de l'approximation :

$$C_A \gg K_a \quad \text{car} \quad 0,03 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \gg 7,94 \times 10^{-5}$$

On peut donc utiliser l'approximation $x \ll C_A$.

Calcul :

$$\begin{aligned} \text{HA} &\rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^- \\ K_a &= \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \approx \frac{x^2}{C_A - x} \approx \frac{x^2}{C_A} \\ x = [\text{H}^+] &\approx \sqrt{K_a C_A} = \sqrt{(7,94 \times 10^{-5}) \times 0,03} \\ x &= \sqrt{2,382 \times 10^{-6}} = 1,544 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

Vérification :

$$\frac{x}{C_A} = \frac{1,544 \times 10^{-3}}{0,03} \approx 0,0515 = 5,15\%$$

L'approximation est limite mais acceptable. Pour une analyse plus rigoureuse des cas critiques, on pourra consulter Butler.⁽⁴⁰⁾


$$\text{pH}_A = -\log(1,544 \times 10^{-3}) \approx 2,81$$

b) Solution B : Acide chlorhydrique HCl

Données :

$$C_B = 0,007 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

HCl est un acide fort, donc totalement dissocié :



$$[\text{H}^+] = C_B = 0,007 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$


$$\text{pH}_B = -\log(0,007) \approx 2,15$$

c) Solution C : Chlorure d'ammonium NH_4Cl

Données :

$$C_C = 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \quad K_a(\text{NH}_4^+) = 5,6 \times 10^{-10}$$

NH_4^+ est un acide faible :



Vérification de l'approximation :

$$C_C \gg K_a \quad \text{car} \quad 2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \gg 5,6 \times 10^{-10}$$

Calcul :

$$[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_a C_C} = \sqrt{(5,6 \times 10^{-10}) \times 0,02}$$
$$[\text{H}^+] = \sqrt{1,12 \times 10^{-11}} = 3,346 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Vérification :

$$\frac{[\text{H}^+]}{C_C} = \frac{3,346 \times 10^{-6}}{0,02} \approx 1,67 \times 10^{-4} \ll 5\%$$

L'approximation est excellente.

$$\text{pH}_C = -\log(3,346 \times 10^{-6}) \approx 5,48$$

2. Solution tampon ammoniacale/chlorure d'ammonium

Données :

- Solution 1 : 25 mL de NH_4Cl $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- Solution 2 : 50 mL de NH_3 $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- $K_a(\text{NH}_4^+) = 5,6 \times 10^{-10}$ donc $\text{p}K_a = 9,25$

Calcul des quantités de matière :

$$n(\text{NH}_4^+) = C \times V = 0,5 \times 0,025 = 0,0125 \text{ mol}$$

$$n(\text{NH}_3) = 0,5 \times 0,050 = 0,0250 \text{ mol}$$

Concentrations après mélange :

$$V_{\text{total}} = 0,025 + 0,050 = 0,075 \text{ L}$$

$$[\text{NH}_4^+] = \frac{0,0125}{0,075} = 0,1667 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{NH}_3] = \frac{0,0250}{0,075} = 0,3333 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Application de la formule de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}$$

$$\text{pH} = 9,25 + \log \left(\frac{0,3333}{0,1667} \right)$$

$$\text{pH} = 9,25 + \log(2,00)$$


$$\text{pH} = 9,25 + 0,3010 \approx 9,55$$

Interprétation : C'est un tampon efficace car le rapport $[\text{NH}_3]/[\text{NH}_4^+] = 2$ est proche de 1, et le pH est proche du $\text{p}K_a$.

Exercice

Exercice sur le Système $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{NH}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- / \text{NH}_4^+$

On considère l'équilibre acido-basique suivant en solution aqueuse à 25°C :



Données : $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,76$, $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+) = 9,25$, $\text{p}K_w = 14,00$.

I) **Étude thermodynamique : sens de réaction**

- Écrire l'expression de la constante d'équilibre K associée à : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$.
- Montrer que K peut s'exprimer à partir des constantes d'acidité :

$$K = \frac{K_a(\text{CH}_3\text{COOH})}{K_a(\text{NH}_4^+)}$$

puis calculer numériquement K .

- Conclure sur le sens privilégié de la réaction (fortement déplacée ou non?).

II) Cas 1 : mélange équimolaire (formation d'un sel)



On mélange 400 mL de CH_3COOH $0,12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et 400 mL de NH_3 $0,12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- Faire le tableau d'avancement (en moles) de la réaction acide-base. Identifier le réactif limitant et les quantités finales (avant prise en compte de l'hydrolyse).
- Quelle est la nature principale de la solution obtenue? (*sel d'acide faible/base faible, tampon, etc.*)
- Montrer (sans calcul différentiel) que, pour un sel $\text{BH}^+ \text{A}^-$ issu d'une base faible B et d'un acide faible HA, on peut obtenir :

$$\text{pH} \simeq \frac{1}{2} (pK_a(\text{HA}) + pK_a(\text{BH}^+))$$

puis calculer le pH du mélange.

- Vérification critique** : discuter la validité de cette relation. (Indication : écrire les équilibres



et commenter pourquoi la dépendance en C peut disparaître.)

III) Cas 2 : mélange non équimolaire (tampon $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$)

On mélange 250 mL de CH_3COOH $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ avec 150 mL de NH_3 $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- Faire le tableau d'avancement et déterminer les espèces majoritaires après la réaction quasi-totale.
- Montrer que l'on obtient un tampon $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$. Donner l'expression de Henderson-Hasselbalch appropriée et calculer le pH.
- Test d'approximation** : justifier qu'on peut négliger l'auto-protolyse de l'eau et la contribution de $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ au pH, au premier ordre.

- Calculer le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ et en déduire si le tampon est « bon » (zone efficace).

IV) Cas 3 : Titrage acide acétique - ammoniac : points caractéristiques

On titre 50 mL de CH_3COOH $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ par une solution de NH_3 $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. (On considère que la réaction $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$ est quasi-totale.)

- Calculer le volume équivalent V_{eq} .
- Calculer le pH initial (acide faible seul) en justifiant l'approximation $x \ll C$.
- Calculer le pH à demi-équivalence. (*Indice* : quelle paire tampon domine? Quelle valeur remarquable obtient-on?)
- Calculer le pH à l'équivalence.
- Calculer le pH après avoir ajouté 60 mL de la solution d'ammoniac.

Solution

Conventions : $T = 25^\circ\text{C}$, $pK_e = 14,00$.

I. Étude thermodynamique : sens de réaction

- Expression de la constante d'équilibre K :

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{NH}_4^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{NH}_3]}$$

- Lien avec les constantes d'acidité** : On a deux couples acide/base :

$$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^- : K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3 : K_a(\text{NH}_4^+) = \frac{[\text{H}^+][\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}$$

En divisant membre à membre :

$$\frac{K_a(\text{CH}_3\text{COOH})}{K_a(\text{NH}_4^+)} = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \times \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{H}^+][\text{NH}_3]} = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{NH}_4^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{NH}_3]}$$

$$K = \frac{K_a(\text{CH}_3\text{COOH})}{K_a(\text{NH}_4^+)}$$

Calcul numérique :

$$K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 10^{-4,76} = 1,74 \cdot 10^{-5}$$

$$K_a(\text{NH}_4^+) = 10^{-9,25} = 5,62 \cdot 10^{-10}$$

$$K = \frac{1,74 \times 10^{-5}}{5,62 \times 10^{-10}} = 3,10 \cdot 10^4$$

$$K \approx 3,1 \cdot 10^4$$

- c) **Sens de la réaction** : $K \gg 1$ (environ 31000), donc la réaction est **très fortement déplacée vers la droite**.



II. Cas 1 : mélange équimolaire (formation d'un sel)

- a) **Tableau d'avancement** :

Quantités initiales :

$$n_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,400 \times 0,12 = 4,80 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_0(\text{NH}_3) = 0,400 \times 0,12 = 4,80 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

	CH_3COOH	+	NH_3	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	NH_4^+
Initial	$4,80 \times 10^{-2}$		$4,80 \times 10^{-2}$		0		0
Final	~ 0		~ 0		$4,80 \times 10^{-2}$		$4,80 \times 10^{-2}$

Les réactifs sont en proportions stoechiométriques, donc aucun n'est limitant. Après réaction quasi-totale, on obtient essentiellement $\text{CH}_3\text{COONH}_4$.

- b) **Nature de la solution** : C'est un sel d'acide faible (CH_3COOH) et de base faible (NH_3). La formule du sel est $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ (acétate d'ammonium).

- c) **Dérivation de la formule approchée** :

Considérons les deux équilibres en solution :

$$\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+ \quad K_a(\text{NH}_4^+) = \frac{[\text{H}^+][\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} \quad (1)$$

$$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \quad K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad (2)$$

Dans le sel $\text{CH}_3\text{COONH}_4$, on a approximativement :

$$[\text{NH}_4^+] \approx [\text{CH}_3\text{COO}^-] \quad \text{et} \quad [\text{NH}_3] \approx [\text{CH}_3\text{COOH}]$$

(les deux couples sont liés par l'autoprotolyse de l'eau).

En divisant (2) par (1) :

$$\frac{K_a(\text{CH}_3\text{COOH})}{K_a(\text{NH}_4^+)} = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{NH}_3]} \times \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

Avec les approximations ci-dessus :

$$\frac{K_a(\text{CH}_3\text{COOH})}{K_a(\text{NH}_4^+)} \approx 1$$

En prenant $-\log$ des deux côtés :

$$pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) - pK_a(\text{NH}_4^+) \approx 0$$

Ce qui n'est pas exact. En réalité, on obtient une meilleure approximation en écrivant :

$$[\text{H}^+]^2 \approx K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) \cdot K_a(\text{NH}_4^+)$$

$$\text{pH} \approx \frac{1}{2} (pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + pK_a(\text{NH}_4^+))$$

Application numérique :

$$\text{pH} \approx \frac{1}{2} (4,76 + 9,24) = \frac{14}{2}$$

$$\text{pH} \approx 7$$

- d) **Validité de la formule** :

Cette formule est valide lorsque :

- La concentration C du sel n'est pas trop faible
- Les approximations $[\text{NH}_4^+] \approx C$ et $[\text{CH}_3\text{COO}^-] \approx C$ sont bonnes
- L'hydrolyse est limitée (pas de pH extrêmes)

La dépendance en C disparaît car les deux couples s'équilibrent mutuellement : l'acidité de NH_4^+ est compensée par la basicité de CH_3COO^- .

III. Cas 2 : mélange non équimolaire (tampon $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$)

a) **Tableau d'avancement :**

Quantités initiales :

$$n_0(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0,250 \times 0,20 = 5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_0(\text{NH}_3) = 0,150 \times 0,20 = 3,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$



	CH_3COOH	+	NH_3	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	NH_4^+
Initial	$5,00 \times 10^{-2}$		$3,00 \times 10^{-2}$		0		0
Final	$2,00 \times 10^{-2}$		~ 0		$3,00 \times 10^{-2}$		$3,00 \times 10^{-2}$

NH_3 est limitant. Après réaction :

— CH_3COOH en excès : $2,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

— CH_3COO^- formé : $3,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

— NH_4^+ formé : $3,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$

b) **Tampon $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$:**

Volume total : $V_f = 0,250 + 0,150 = 0,400 \text{ L}$

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{2,00 \times 10^{-2}}{0,400} = 5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{3,00 \times 10^{-2}}{0,400} = 7,50 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Formule de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$\text{pH} = 4,76 + \log \left(\frac{7,50 \times 10^{-2}}{5,00 \times 10^{-2}} \right) = 4,76 + \log(1,50)$$

$$\text{pH} = 4,76 + 0,176$$

$$\text{pH} \approx 4,94$$

c) **Justification des approximations :**

— **Auto-protolyse de l'eau :** négligeable car $[\text{H}^+] \approx 10^{-4,94} \approx 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \gg 10^{-7}$

— **Contribution de $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$:** le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ a un $pK_a = 9,25$, donc à $\text{pH} = 4,94$, la forme NH_3 est négligeable. De plus, $[\text{NH}_4^+] \approx 7,5 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ est du même ordre que les espèces du tampon acétique.

d) **Qualité du tampon :**

$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 1,50$$

Un tampon est efficace lorsque $0,1 < \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} < 10$. Ici, 1,50 est dans cet intervalle, donc c'est un **bon tampon**.

IV. Cas 3 : Titrage acide acétique - ammoniac : points caractéristiques

a) **Volume équivalent :**

À l'équivalence : $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{NH}_3)$

$$C_{\text{CH}_3\text{COOH}} \times V_{\text{CH}_3\text{COOH}} = C_{\text{NH}_3} \times V_{\text{eq}}$$

$$0,10 \times 0,050 = 0,10 \times V_{\text{eq}}$$

$$V_{\text{eq}} = 50,0 \text{ mL}$$

b) **pH initial ($V = 0 \text{ mL}$) :**

Solution d'acide acétique seul :

$$C_0 = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}, \quad K_a = 1,74 \times 10^{-5}$$

Approximation $x \ll C_0$:

$$[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_a C_0} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,10} = \sqrt{1,74 \times 10^{-6}}$$

$$[\text{H}^+] \approx 1,32 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{Vérification : } \frac{1,32 \times 10^{-3}}{0,10} = 1,32\% < 5\%$$

$$\text{pH} = -\log(1,32 \times 10^{-3})$$

$$\text{pH}_{\text{initial}} \approx 2,88$$

c) **pH à demi-équivalence** ($V = 25,0 \text{ mL}$) :

À demi-équivalence : $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$

$$\text{pH} = \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + \log(1)$$

$$\text{pH}_{\text{demi-éq}} = 4,76$$

d) **pH à l'équivalence** ($V = 50,0 \text{ mL}$) :

À l'équivalence, on obtient du sel $\text{CH}_3\text{COONH}_4$. Volume total : $V_f = 50,0 + 50,0 = 100,0 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$
Quantité de sel formé :

$$n_{\text{sel}} = 0,050 \times 0,10 = 5,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$C_{\text{sel}} = \frac{5,00 \times 10^{-3}}{0,100} = 5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Pour un sel d'acide faible et de base faible :

$$\text{pH} \approx \frac{1}{2} (\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) + \text{p}K_a(\text{NH}_4^+))$$

$$\text{pH} \approx \frac{1}{2} (4,76 + 9,25) = \frac{14,01}{2}$$

$$\text{pH}_{\text{éq}} \approx 7,01$$

Note : L'exercice semble incomplet. Pour le point e) "pH après équivalence", il faudrait spécifier un volume particulier (par exemple $V = 75,0 \text{ mL}$) pour pouvoir calculer le pH.

Récapitulatif des résultats :

- Constante d'équilibre : $K \approx 3,1 \cdot 10^4$
- Cas 1 (équimolaire) : $\text{pH} \approx 7,01$
- Cas 2 (tampon acétique) : $\text{pH} \approx 4,94$
- Cas 3 (titrage) :
 - pH initial : 2,88
 - pH à demi-éq : 4,76
 - pH à l'éq : 7,01